





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.467





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.467





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.467



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.467

1.6.467





**CHRONICA HER-
BARVM, FLORVM, SEMINVM, FRV-
CTVVM, RADICVM, SVCCORVM, ANIMALIVM,
atq; eorundem partium, quo nimirum tempore singu-
la eorum colligenda, atq; in vsum adferenda sint**

**Medicum, res ut scitu pharmacopœis
dignissima, ita reipublicæ ma-
ximè necessaria :**

**Authore,
NICOLAO VVINCKLERO FOR-
chemio, Medico, & Halæ Saxuorum
physico ordinario.**

**Cum gratia & priuilegio Imperiali,
ad decennium.**

**AVGVSTÆ VINDELICO-
rum, in officina Typographica
Michaëlis Mangeri.**

Anno M. D. LXXI.



IN LIBELLVM D. NICOLAI

V Vinckleri Medici. Epigramma D.

Ioan: Postij, German: Medici,

R Adices, herbas, flores, cum femine fructus
Et Medicus vsus, quæ requirit amplius
Temporibus certis debent, qui pharmaca miscent
Legere: vigorem cum suum diuinitus
Accepere suum: quod quo sub sidere fiat,
V Vincklerus hoc paruo docet volumine:
Assidue ante oculos quod pharmacopœus habebit,
Consulat ut agris melius, & famæ suæ.

REVERENDO

GENERE ET VIRTUTE NOBI-

LI, ET MAGNIFICO VIRO DOMINO ERAS-

mo Newlterero, dicto Sturmer à Schonfeldt, Bambergensis

ac VVirtzburgensis Ecclesiarum Canonico. D.D. Io-

annis Baptistæ in Haugis, & Gangolffibidem

præposito, & Decano Collegij Com-

burgensis, Dignissimo Domino

suo obſervando.

S. D.



Onſcriptus ex varijs historijs herba-
rum, fruticum & arborum insignium
Chronicon libellum, hoc est, foliorum,
florum, seminum, fructuum, radicum,
atq; succorum, quo tempore ad vsum medicum ma-
ximè illa colligi, non quod popularis auræ studio
susceperimus, aut aliam quasi normam constituere,
eamq; accuratius enucleare velimus, & veluti Lernæ
capita, in dies magis, atque magis inualescentes erro-
res, sævientia adulteria, dissolvere, edocere, emunctius,
atque exactius absolvere, quum præsertim id eruditif-
simus Hermolaus, acutissimus Leonicens, doctissi-
mus Marcellus, præstantissimus Ruellius, versatissi-
mus Manardus, alijsque de re medica bene meriti, sin-
gulari eruditione viri clarissimi, Brassauolus, Fuchsius,
Syluius, Matthiolus, & Franciscus Alexander Ver-
cellensis, temporis diuturnitate, longaq; experientia,
gravitate, sapientia, providentia & iuditio hac de re

A 2 verbo-

verbosissimè differuerint, turpeq; esset & temerarium
si ingeniosum in alienis libris præstaremus, aliorumq;
labores vendicarem, & veluti post defectam mes-
sem spicilegium facere, aut post restinctam sitim noua
adferre pocula, sed potius ut pharmacopœis gratifica-
remur, alijsq; bonis amicis ad obliuionem senij (ut
Plato inquit) commentarios offerremus, qui in me-
moriâ reuocarent, quo ordine & successione annua,
singula ex viridario essent reponenda, idq; non nisi
maxima necessitate urgente, propter oscitantiam &
negligentiam pharmacopœorum quorundam, qui si-
ne doctrina, sine delectu, sine censura, absq; denique
omni metu & pudore medicorum capiunt, & pro salu-
te inexpectatam mortem interdum offerunt, pleraque
aut omnia ad fraudem & auaritiam contaminant, cor-
rumpant & peruertant, diuitias honori ante ponunt,
liberum alijs negotijs delegant, atq; relinquunt: quum
à fraudulentis sibi non caueant, exotica ignorent, sac-
culos nominatenus sectentur & conquirant, vitiosis-
que potius consuetudinibus, quàm veritati acquie-
scant: ideoq; non modò segnitiam, sed etiam oppro-
brium illorum accusamus. Quanta enim quæso errata
& incommoda, cæteraq; omnia in medicamentorum
mixture afferunt, si in colligendis simplicibus ipsi ab-
errent: an non spe sua frustrabitur medicus doctus,
qui medicamentis morbum expellere instituit, cum
medicamenta sunt imperfecta aut immatura, aut nimis
vetusta siue exoleta, senioq; squalida: an non vnus
simplici-


11
simplicis improbitas totam saepenumero compositionem vitiat, vires minuit, abolet, ac novas acquirit: quae omnia fieri experimur, cum nec loci situm, coeli statum, qualitatem regionis, bonam educationem, in primis quo tempore matura sint, respicimus: Quae incommoda animaduertens Galenus lib. 1. antitid: in compositione Theriaces, ubi quaerit Chamepityn, Chamedryn, Thlaspi, centaurium, polium montanum Hypericum, aliaque florida non sole aestiuo siccata, neque dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt: idem continua speculatione lib. 1. & 3. comp. phar. part. & generalium obseruat, quando eduntur, quando augentur, quando denique vigent, quo tempore potissimum eos commodè decerpas & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radijs vrantur, neque humiditate à tecto vel muris madefiant. & hoc quidem non temerè. Etenim si sanitatem, qua nihil optatius homini esse potest, tueri debemus, varia innumeraque genera morborum expellere, ferarum virus euincere, venenorum lethaliū vim demoliri & ad vitam reuocare constituimus, nihil certè erit vtilius, nihil memoratu dignius, nihilque laudabilius, quam in defesso studio, huiusmodi negotia excolere, iisdem insudare, quibus aut hominum vafrimonia, aut artis & scientiae inopia indies periclitamur, magna enim laus & grata hominibus, vnum hominem laborare in ea scientia, quae sit multis profutura, quae inquam suum opus illorum

A 3

pericu-

periculis sublevandis imparciantur, gloriam enim
concitat magnitudo negotij gratiam & splendorem,
animi ingenuitas & candor. Qua de causa cum hæc
pars Medicinæ *φαρμακευτική*, utpote saluberrima & præ-
stantissima, nunc à præstigiatoribus publicis & ne-
pharijs corruptoribus obscuretur & dehonestetur, po-
lita loquacitate, inexpiabili scelere, intolerabiliq; di-
scrimine, hortor & admoneo pharmacopœos, qui
Christianam religionem colunt, ut pro salute commu-
ni, pro artis medicæ dignitate, pro omnium statu, &
pro operibus commodi publici, probè sanctèq; pro
viribus suis simplicia medicamenta quærant, videant,
audiant, locisq; proprijs indagent, quum vnaquæq;
stirps natali solo exultet, vigeat, fertilis, efficaxq; pro-
betur, secus verò imbecillis, languida ac sterilis redda-
tur, quum telluris qualitate, cœli constitutione, nutri-
mento, cultura meliora deterioraue non minus eua-
dant, aliosq; cultores moneant instentq;, ne radices,
fructus, semina, flores, herbas, germina & succos ex-
tra annum & menses carpant, imò quod reliquum est
labores sibi commendatos habeant. Edidimus autem
hoc Chronicôn, addita tui nominis mentione Reue-
rende atq; magnifice vir, quia scimus te sapienter &
grauiter de studijs doctrinarum omnium iudicare, ne-
que verò id solum, sed & honesta cogitatio, hanc no-
stram vehementer auxit, tum singularis tua, & cum o-
mnium rerum bonarum cōiuncta sapientia, prudentia,
& dex-

IV
& dexteritas, tum incredibilis in omnes literarum stu-
diosos familiaritas & liberalitas, quo in cursu DEVS
æternus, qui est pater domini nostri Iesu Christi, te
vnà cum inclyta tua familia conseruet atq; regat, &
quod reliquum est, me totis viribus ama, & inter cæ-
tera scriptoris animum in te maximè propensum am-
plexere, æqui bonicq; consule, illi aspira, qui sub tua
clientela, sub tuo patrocinio ad longè maiora promo-
tus, virili, atq; intrepido corde digniora indies magis
aggredi audeat. Vale in Christo. Halæ Suæuorum,
primo die mensis Ianuarij, M. D. LXXI.



QVOTEMPORE FIAT CONCEPTVS TER- RÆ NASCENTIVM.

IANVARIO,
Sol in Aquario,

FEBRVARIO,
Sol in Piscibus.

PRIMUM CON-
ceptum terræ na-
scentium, flare
incipiente vento
Fauonio fieri sta-
tuit antiquitas Romana, Pli-
nio teste lib. 2. cap. 47. & lib.
18. cap. 26. quod tempus cir-
citer. 6. Idus Februarij acci-
dit, hoc est, 8. die mensis Fe-
bruarij, ab eo tempore, quo
spirat & flat per nouem dies,
cœlestis quædam aura, ceu
vitalis calor terræ nascenti-
bus inspiratur, à quo reuiui-
scunt et respirant viuescentia
è terra omnia, hunc genita-
lem spiritum mundi græci
Ζεφυρον, quasi *fenix porta*,
quod satis & plantis vitam
adferat, vocant Agricola ve-
rò catulitionem, à verbo ca-
tulire, quod est gestire, & coi-
tum maris appettere, nomi-
nant, sic Plautus, cum meam
uxorem vidi catulientem, &
Laberius ille, catulientem su-
pam scripsit. Mouetur autem
is spiritus mundi siue ventus
Fauonius per 9. fere dies, ab
B æqui-

aquinoctiali occasu, et signis, Cancro, Scorpione & piscibus, item à coniunctione Lunæ cum Marte, ideoq; hic item ac Aquilonaris turba frigore boreali riger, et similiter atq; Austrina cohors australi humiditate madet, hoc est, humidus ac frigidus, tepidus autem respectu Austri, qui est æstuosus, sicciior autem Subsolano, quemadmodum in totum omnes à Septentrione & occidente sicciiores sunt, quàm à meridie & Oriente. Ab eo tempore licet mari tantum viuescentia è terra, concipiunt tamen varijs diebus, pro cuiusq; natura. Alia protinus ut animalia q; sæpius in anno pariunt, aliqua tardius, quæ semel duntaxat partum gerunt, estq; ut pariendi, sic & concipiendi tempus varium.

Sed quærat quis, quomodo fiat conceptus terræ nascentium, an eadem sit ratio, quemadmodum in conceptione hominis, in qua solers et prouida natura rerum prospexit sexum, ut nimirum marem & fœminam cõstitueret, et ad tempus separaret, ut eos quandoq; ad generis propagationem inuitaret, ne vniuersum genus intercideret, libidinem præterea quasi stimulum ex seminis ardore utriq; iniecit ut sua semina in

vnũ conferrent? Respondeo, Sexum propriè dictum stirpibus natura non tribuit, ut per coniunctionem maris & fœminæ generarent, sed in se habent rationem seminalem promiscuam ac confusam, ratione cuius in eis inest potentia & libido ad producendum sibi simile, pro conseruatione suæ speciei, quæ potentia non reducitur in actum, nisi adiutorie extrinseci adiuuantis, videlicet, cœlesti influentia, siue Sole & terra, ex quibus notandum duplicia esse plantarum principia, scilicet, Materialia & Effectiua. Materialia sunt ex quibus immediatè generantur, ut sunt vapores terrei & aquei calore coagulati in loco generationis, ut in terra, q; impura est, & plena occultis seminibus, seu viribus seminalibus in principio suæ conditionis sibi à creatore inditis, iuxta illud Genesis primo. Germinet terra herbam virentem, & facientem semen suum, & lignum pomiferum, faciens fructum iuxta genus suum, cuius semen sit in semetipso super terram. Effectiua sunt quæ sua actione transmutant dictos vapores in substantiam plantarum, sicut sunt qualitates primæ in vaporibus istis adiutæ cœlesti influentia, & maximè calor connaturalis vapo-

vapo-

vapori adiutas calore solis. Hæc duo principia si debito modo concurrant fit conceptio, nō sanē quando semen ipsum per propagationem (qua planta nascitur seminatione prævia) attrahitur & retinetur à terra, sed cum seminis potestas exuscitatur, et insitum sibi munus reipsa obit, & ad parturiendum impellit, quæ vera dicitur conceptio. Non raro enim fit, quando terra semen attraxit diu continere non potest, sed biduo aut triduo perit, aut in aliam naturam degenerat, veluti in vtero mola, quæ nec conceptio vera est, huius enim mole opprimitur & laborat natura, perinde ut ventriculus cibo graui & crudo. Quemadmodum igitur vterus fœcundus ingenita ui, q̄ alteri nulli parti, est concessa, sopitam seminis uim & delitescentem in eo potestatem excitat, & adagendum extimulat, ut energia fiat & dicatur: ita etiam terra ferax & fœcunda exceptum semen suo calore foue, deinde excitat et ad parturiendum impellit, tum temporis semen opus agreditur & suscipit, quod ante nusquā agere potuisset, alioqui enim principium vñum per se in seipso generaret, quod est natura absurdum.

Quæ cum se ita habeant, querere visum est, quo pacto duo principia, nempe influentia cœlestis siue Sol, & terra, quæ longissimè distant, concurrant, & quo pacto influentia illa cœlestis ad terræ nascentia descendat. Respondeo per viam quandam mediam tanquam per aërem, quemadmodum in visione accidit, vbi spiritus visorius, qui est lucidus & fulgidus (etenim ab anima, quæ ipsa est lucida & fulgida, autore Aristi. lib. de sensu & sensato, procedit) aërem attingat, & lumen ipsius cum lumine aëris vniatur, qui aër recipit aliam illuminationem, ob quam redditur aptum instrumentum ad visionem: ita fulgor seu cœlestis influentia, quàm primum supremū aëris terminum contactu afficit, statim vim suam fulgidam & ætheream in aërem tā diu dispergit, & longè lateq; diffundit, donec totum illustrant calorem, excitant, cognatumq; corpus seu instrumentū proprium fecerit ad res tangendas, hunc aërem sic illustratum & fulgore plenum, terre nascentia statim sentiunt, & cōcipiunt proprietatē quandā de essentia etherij luminis. Et quemadmodū ē pfundis cuniculis ceruus serpentem

narium inspiratu allicit, aut
 uterus viri semen, è sua cerui-
 ce attrahit, ita etiam terra, in-
 fluentia coelesti ista gaudet,
 quam ad se attrahit, itaquam
 uterus genitale semen, aut ut
 quidam volunt, vaporem
 quendam ex terra mitti ad
 occulta foramina terræ, qui
 deinceps intro trahitur, tanta
 vis ergo est huius aeris coele-
 stis, tantaq; necessitas, ut quæ-
 admodum animus non sine
 anima, ita nec anima sine coe-
 lesti aere seu influentia viue-
 re potest, quod copiosius in
 physicis demonstratur, tan-
 tum de conceptione terræ
 nascentium dixisse sufficiat.

MARTIO, SOL in Ariete.

AGE verò iam terram
 senten fecundum ita
 concepisse, ut consen-
 tanea quadam moderatione,
 mutua amicitia et complexu
 amborū, vis vnica eademq;
 natura iā facta sit, restat ipsa
 conformatio seu Germina-
 tio. Vis illa in semine latens,
 materiam variè distrahit, ei-
 usq; partes secesnit (non e-
 nim est exquisitè vnum, et ex
 omni parte consimile) certis
 diebus partes seminis tenuio-
 res calidiores, & spiritus ma-
 gis participes intro & in me-
 dium totius molis se recipi-
 unt, crassæ verò & magister-
 renæ ambiunt, & circumcir-
 ca obuallant, ex quibus du-
 rioribus factis, atq; coactis
 incipiunt germinare, foetūq;
 proferre, habita tamen ratio-
 ne seminis prout cuiusq; na-
 tura est. Etenim celerrimè in
 horto satorum germinant, et
 nascuntur ocymum, blitum,
 Napus, Eruca, quæ tertio
 die à satione erumpunt,
 Anethum quarto, Lactuca
 quinto, Raphanus sexto,
 Hyeme decimo, Cucumeres
 sexto, uel septimo die à satio-
 ne, Hordeum septimo, Atri-
 plex octauo. Legumina om-
 nia erumpunt quarto die, vel
 cum tardissimè septimo, Le-
 gumina

SEV CONFORMATIO FIAT.

gumina in aegypto tertio die,
raba à decimo quinto ad vi-
gesimum, Cepæ 19. aut 20.
Gethium decimo aut 12.
Contumacius coriandrum.
Cunila quidem & Origanū
post trigessimū diem, om-
nium autem difficillimè A-
pium, quadragesimo enim
die celerimè aut 50. maiori
ex parte emergit. Et quod
mirum de colutea, quæ post
Arcturi occasum germinat,
primo vnicaulis triennio ma-
ximè, spargitur deinde in ra-
mos, quartoq; anno arbore-
scit. Similiter & Lotus & æ-
gilops herbæ, quæ non nisi
post annum è semine suo na-
scuntur. Aliquid præterea ad
II. germinationem, & seminum
ætas confert, quoniam recen-
tiora maturius gignuntur in
porro, Gethio, Cucumere,
Cucurbita. Ex vetere autem
celerius proueniunt Apium,
beta, cardanum, cunila, ori-
ganum, Coriandrum. Mi-
rum in betæ semine: non e-
nim totum eodem anno gi-
gnit, sed aliquid sequente,
aliquid tertio, itaq; ex copia
seminis modicè nascitur: Se-
men optimum aniculum, bi-
num deterius, trinum pessi-
mum, ultra sterile, Plinio lib.
18. cap. 24. attestante,

Hæc quæ diximus cau-
sam potissimum intrinsecā
respiciunt. Quæ uerò extrin-

Qualitas
terræ.

secus Germinationem pro-
mouent, primò est qualitas
terræ, deinde Stercoratio, ter-
tiò repporis ratio, quod ma-
gna ex parte syderibus est
connexum.

Quod ad solum itaq; per-
tinet, sciant studiosi haud mi-
nimū interesse, semina, ut læ-
torem germinationem, fru-
ctumq; uberiolem, deterio-
remq; faciant, cuiusmodi so-
lo mandentur. ceu enim ute-
rus fœcundus ingenta ui so-
pitam seminis uim & delite-
scentem in eo potestatem ex-
citât, et ad agendum extimu-
lat: ita etiam terra ferax &
fœcunda exceptum semen
suo calore fouet, excitât &
ad germinandum impellit,
ea autem est quæ mediocrem
ex omnibus temperaturam
obtinēt, nempe, quæ nec im-
modico frigore, ut in hyeme
densior facta, nec humoris
affluentia, extinguit nec sic-
cior alimenti ubertatem in-
hibet, nec calidior semen
ipsum ardore torret & exu-
rit. In summa omnis im-
moderata ablit intemperies præ-
sertim fuge terrā cariosam,
ut Cato uno verbo vitia de-
terminauit, quam neq; plau-
stro, neq; pecore impellas, ea
enim nihil differt à ligni ca-
rie, quæ est arida, fistulosa,
scabra, canescens, exesa &
pumicosa, quæ siue atate, siue

B 3 natu

QVO TEMPORE GERMINATIO

natura ita est, infœcunda ad omnia & imbecilla habetur. Quæ verò modicè intemperata terra est, optimè commodeq; generat ac conformat, si coeant cum intemperatîs pari exuperantia in contrarium vergentibus, sese enim temperant, & certa ratione moderantur. Cum similibus autem commiscetur, ne quicquam valent producere. Terram teneram, quæ vocatur pulla optima erit, & operi satior, illa enim temperatæ vbertatis, illa mollis facilisq; culturæ est, nec madida nec sitiens, illa post vomerem nitescent. & ut Cicero lux doctrinarum altera, scribit, eam terram, quæ vnguenta potius, quàm quæ Crocum sapiat, optimam esse, qualis est in noualibus caesa vetere sylua, quæ consensu laudatur. Et in frugibus quidem ferendis eadem terra ytilior intelligitur esse, quoties intermissa cultura quieuit: quod in vineis non fit. Illa certè odorem sic refert, veluti cum à siccitate continua terra immaduit imbre, halitum diuinum, seu vnguentosum è sole conceptum emittit, felix igitur hæc terra quæ

succi plena est, & veluti exubere alit omnia, vnumquodlibet tamen iuxta seminis aut plantæ naturam, ut Hippocrates in libro de natura hominis scribit. Semina & stirpes terram vbi subierint, id quod in terra secundum ipsorum naturam est, sibi attrahunt, siue acidum, siue dulce, siue amarum, siue salsum, siue aliud quippiam diuersum, primum autem quod sibi naturali humiditate, siue similitudine coniunctum est, attrahunt, tum cætera deinceps arripiunt.

Hunc igitur modum semina nedum, plantæ in terra cum feruent, operepræitium est, ut genera terrarum addiscantur, hoc est, quibus qualitatibus maxime redundant, ut quælibet planta in locum proprium, & sibi familiarem reponatur, quo liberius vita fruatur, siquidem constat non eadem omnibus conuenire, nec vbique optima prouenire. In agro calido & lecto frumentum seri iubet Cato. Si verò nebulosus sit ager idem, Raphanum, milium, panicum in frigido & aquoso prius ferendum, postea

itea in calido. In solo autem rubricoso, vel pullo, vel arenoso, si non sit aquosum, Lupinum. In creta & rubrica & aquosiore agro Adoreum. In Sicco et non herbofo, nec umbrofo triticum. In solo valido fabam. Vitium verò quàm minime in aquoso herbidoq; Siliginem & triticum in loco aperto aditoq; qui sole quàm diutissime torreatur. Lentem in fruticoso, & rubricoso, qui non sit herbidofo. Hordeum in nouali, & in aruo quod restibile possit fieri. Cytisus & Cicer in tenuiore terra, quæ non multò indigent succo. In pingui autem terra, quæ cibi sunt maioris, ut olus, triticum, siligo, linum: Et sic de reliquis, quam terram quod liuet amat, studiosis cognoscendi relinquimus.

Est & stercoratio subinde agricolis non negligenda, quæ suscipitur, ut terra terra emendetur, fertilisque fruge campus reddatur. Sic Milium, Panicum, Rapa, Napus, nisi in stercorato agro non se-

rantur. Non stercorato frumentum potius quàm hordeum serito. Item in noualibus, tamen in illis fabam seriri volunt, eandem vbiunque quàm recentissime stercorato solo.

De Stercoratione præceptum hoc erit obseruandum. Ager si non stercoratur, alget. Si nimium stercoratus est, adurit: satiusque est id sæpe quàm supra modum facere. Quo calidius solum est, eo minus stercoris ratio est. Plura de Stercoratione lege Plinium lib. 17. & 18.

Hæc etsi legitime omnia se habeant, ut promptius in proprio solo quam alieno germinet, attamen nisi etiam tempus respiciant, quod maxime syderibus est connexum, pleraque infœcunda aut sterilia videntur, licet terra semen attraxit, diuque continuit, mole tamen opprimitur & laborat natura, præsertim quando influenza cœlestis, quam plato frequentius ignem, ut interdum calorem appellauit, ab Aristotele Spiritus dictus, vel

QVO TEMPORE GERMINATIO

vel naturalis calor, non accesserit. hac enim influenza vnà cum spiritu & calore omnia continentur ac fouentur, quorum appulsu vita inest, quorum excessu mors irruit. Quanquam uerò in stirpibus minus aperta & euidentis est spiritus & caloris inspectio, eas tamen non minus quam animantes hoc saluari calore et influenza cōseruari, omnemq; omnium salutem hinc oriri perspicuū fiet, qui naturæ opera effectusque existimabit. Hac influenza uiuit papauer, cicuta, mandragora, & vniuersum stirpium genus frigidarum.

Cæterum hoc non ignorandum, quod influenza illa cœlestis seu calor naturalis ratione temporis sit mutabilis. alia enim influenza Veris tempore, alia æstate, alia Autumno, alia deniq; hyeme influit, ut id Hippocrates ex commutatione calidi nostri demonstrauit. Quæ influenza cū aut maior aut minor, firmiter aut infirmior esse appareat, non mirum etiam si opera naturæ aliquando manifestiora aut obscuriora videntur. Hyeme etenim ob frigus corpora contingens, calorem cum sanguine & spiritu in animantibus, et terræ nascentibus intrò repellit in profundum, forisq; cutis

Hyems.

& terræ spiracula adstringens, caloris substantiam cogit & ita coërcet, ut nihil eius aut minimum possit effluere & germinare: nisi si quæ sua natura ita fortia sint ut suo germinatu sæpe nives perforent, ut de Elleboro Herophilus antiquissimus medicus scribit, qui fortissimo duci adæquabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsum in primis exire dicebat Plinio lib. 25. cap. 5. attestante.

Æstas.

Æstate contra, quoniam ambientis feruor corporum spiramenta laxat, & interiores spiritus tum humores foras elicit, necesse est substantiæ caloris plurimum in confinem aërem diffluere, atque dissipari, exiguum uerò intus contineri, hoc tempus licet magis sit commodum ad germinationem, quā hyems, præsertim post Canis ortum qui fit nostro Hemisphærio 30. aut 31. Iulij mensis, minus tamen cōmodum quā Ver & autumnus, quæ tempora moderationem quandam inuehunt, hoc est, non offendunt, nec temperaturam excedunt, proinde ad germinationem omnia tunc terræ nascentia properant, magis tamen uere, quā autumno, siquidē Ver omnium partium anni pars est longè salu-

Ver.

SEV CONFORMATIO FIAT.

saluberrima & beatissima, si
natiua modò rationem in-
tuearis. Neq; frigidius a quo
humidiusq; licet bruma, ne-
que calidius siccusq; ut a-
stas, neq; in æqualitate mole-
stum quemadmodum au-
tumnus, sed temperatione &
summè clementia aptissimū
tempus ad germinationem,
quod incipit die Martij de-
cimo, ad pleiadum vsq; ex-
ortum sub 20. diem Aprilis,
si Solarem ortum capias: sin
eum quum à sole emicat, sub
Maij diem sextum, quo tem-
pore incipiunt germinare
(inquam) & reuircere mō-
tes, prata, segetes, campi, vi-
næ, horti, syluæ, collium fle-
xus, valles, planicies, opaca,
& luci. Eo tamen discrimi-
ne, ut quæ ex eodem sint ge-
nere, siue ea calida, siue frigi-
da, siue humida, siue sicca,
prius in palustribus, mox in
campestribus, nouissimè in
syluis germinant, per se au-
tem pyri syluestres quàm ce-
tera. Præterea notandum
quod syluestria satius tar-
dissimè erumpere solēt. ete-
nim omnis cura fertilitatem
adijcit, fertilitas senectam,
ideoq; præfloreant talia &
prægerminant, atq; in totum
præcotta sunt, quoniam om-
nis infirmitas cælo magis est
obnoxia. verum quo ordine

hortentia omnia germinant
id ex natura seminis cogno-
scendum, de qua paulò su-
pra monuimus.

Inter Arbores syluestres
primo Fauonio germinat
Cornus, proximè Laurus,
pauloq; ante æquinoctium
Tilia, Acer, Ornus, Carpi-
nus, Cotinus, qui frutex tan-
tum est in Apennino monte.

Inter palustria primas te-
net populus, Ulmus, Salix,
Alnus, Platanus, Myrica,
siue Tamarix, Nuces.

Campestria & quæ mon-
tes amant, sunt ceteræ arbo-
res uere cepturo, ut Aquifo-
lium, Terebinthus, Paliurus,
Castanea, Glandes, Buxus,
Iuniperus, Cedrus, Larix,
Teda, Abies: serotino au-
tem germine malus, tardissi-
mè suber.

Autum-
nus.

Autumno cum pauca re-
stat substantia caloris, ob
eam quæ æstate fit disper-
sionem, & inæqualitatem in-
fluentia, pleraq; ad ruinam
defluunt, & in perniciem ve-
niunt, exhausto enim pabu-
lo, calor unà restinguitur,
non quidem per se, sed per
accidens, & alterius interie-
ctu. Nempè humidi primo-
geniti, nihil enim quod ge-
nitum est, & natura constat,
primum & per se sui exitum
molitur, sed quam longissi-
mè

C me

QVO TEMPORE GERMINATIO

me prorogari, & in rerum natura consistere peroptat. Quo circa non alia est ortus nostri, alia interitus causa, sed quaecunq; nos genuit, & moderatur, ea tandem extremum vitae diem morte conficit. Hic annuus ordo cum seruetur, non mirum cur autumnus pauca germinent, & adulescant, & eo magis quæ ad finem autumnus hyemisq; ingressum, ante Brumam fata sunt: hacq; de causa præcipiunt, quod circa Brumam non sit serendum: quoniam hyberna semina, cum ante Brumam fata sint septimo die germinant. Si post brumam uix 40. die. Sunt qui tempus unum serendi præscribunt, ut Hesiodus, à Vergiliarum occasu. Vergilius autem triticum & far à Vergiliarum occasu seri iubet. Hordeum inter æquinoctium autumnus & Brumam: Vitiam uerè, fæculos & lentem Boote occidente, quod sydus Romæ occidit circa 7. Decembris. Sunt qui ante Vergiliarum occasum seri iubent, uidelicet in arida terra, & calidis prouintijs. Aliqui in frigidis locis, ab æquinoctio autumnus, in calidis serius, ne ante hyemem luxurient. Et cum hoc tempus Autumnus valde sit laboriosum & cu-

riosum, quidam uere potius serendum esse putant, quàm malè in autumnus, atque ubi fuerit necessum inter ventum Fauonium & æquinoctium vernale.

Hactenus de germinatione, qua parte nimirum anni ea sit aptissima & commodissima. Restat ut de partu pauca dicamus,

APRILI

APRILI, SOL in Tauro.

Veluti cæteris animantibus, statutum partus gerendi & pariendi tempus est, idem & plantis & arboribus lege naturæ decretū, ut post germinationem aut conformationem (quæ specie atq; forma est adornata) pariant. pariunt verò cum flos erumpit, qui ruptis constat vtriculis, veluti in rosa videre licet, quæ primò inclusa granoso cortice germinat, quo mox intumescente, & in virides alabastros fastigiato, paulatim rubescens, dehiscit ac sese pandit, donec expellam solidamq; perfectionem consequitur, & in actum erumpit, non aliter quàm ex seminis materia in vterum emissa, homo tandem procreatur, cuius species quædam & forma præcellerat in semine.

Et quemadmodum animalibus non idem imprægnationis cursus, quædam enim omni tempore coeunt & pariunt, ut gallinæ (præterquam duobus mensibus hyemis brumalibus) Columbe decies anno pariunt, quædam & undecies, Hirundines &, merula & palumbi, & turtures bis anno pariunt.

Cæteræ aues fere semel: ita et plantæ frutices et arbores, fecunditate aut sterilitate gaudent. Etenim sunt quæ toto anno flore exhilarantur, ut Condrylla et Aphace, quæ ambo picæ nominantur à Plin. lib. 21. cap. 16. Quædam bis & ter florem ostendunt, ut apium, poerum, gethyum, & Scylla quæ tria tempora sationū monitrat. Plin. lib. 21. cap. 13. autore. Quædam semel tantum, & florēt, aut per mensem aut longius. Sunt quæ vere tantum florent, quædam æstate, quædam Autumno, quædam hyeme, quo tempore parturire dicuntur.

Porro notandum inter ea quæ florent, quædam statim in germinatione florere, proferatq; in eo, sed maturescunt tardè, ut vites. Quædam serotino germinatu florent maturantq; celeriter, sicuti morus, quæ nouissima urbanarum arborum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum, sed cū incœpit in tantum vniuersa germinatio erumpit, ut vna nocte peragat, unā cum strepitu. Quædam floribus duntaxat coronantur, ut Genista, Spartū, Rhododendron & zizipha, quæ & Cappadocia, Plinio vocatur.

C 2

Que

QVO TEMPORE PARTVS FIAT.

Quædam intra se pariunt aut florent, ut Lappa, in qua flos nascitur non euidens, sed intus occultus, Plinio attestante lib. 21. cap. 17. ceu animalia quædam quæ in se pariunt, ut idem autor scribit, de conceptu & partu vipera. Similiter quæ oua pariunt: Multa verò sunt quæ non pariunt, sed duntaxat germinant, ceu inter arbores Ilex, picea, pinus, quæ nullo flore exhilarantur, natalesque pomorum recursum annuos uerli colore nuntio promittunt. Inter herbas nec florent Dryopteris, Filix, tam mas quam fœmina. Hemionitis tam mas, quam fœmina, nec semen, nec caulem gignit, similiter & asplenon, nec caulem, nec semen, nec florem, habet. Præterea Epimedium, quod nec florem nec fructum fert, Adiantum & Nardus montanus, nec flores, nec caules, neque fructus ferunt. Nunquam floret Acinon herba, quam alio nomine Plinius Epipetron vocat.

Quædam folijs duntaxat coronantur & perpetuo vident, de quibus infra monēbimus.

Hactenus annum ordinem ut pulcherrimum paucis ostendimus, quem in plantæ, frutices, Arbores, &

earum semina, quæ in hortis proueniunt & crescunt, seruant immutabilem, nisi quod subinde etiam morbos sentiant, & in aliam naturam degenerent. Sic ocimum senecta degenerat in Serpyllum, & Sisymbrium in calamintham. Et ex semine Brassicæ veteris rapa fiunt, atque inuicem. Et necatur Cuminum ab imodorfo, nisi repurgetur. Et ocimum sub canis ortu pallescit: Omnia verò acellu mulieris flauescunt. Bestiolarum quoque genera innascuntur. Napis Culices, Raphano erucæ. & vericilli, item Lactucis & oleri utrisque hoc amplius limaces & cochliæ. Sic de similibus, de quibus omnibus eadem est ratio, ceu in animalibus, quæ propter morbum naturali cursu impediuntur, ut non meliora grandioraque fiant, sed citò ut imbecilla pereant. Quæ contemplatio licet ad medicos etiam spectet ut delectum medicamentorum habeant, attamen ne limites transgrediar ad institutum me nunc conuertam. Estque hoc, ut simplicia medicamenta quo tempore nimirum colligenda sint, explicem rem veluti magis necessariam & utilem, ad usum communis vitæ, siquidem instru

QVO TEMPORE PARTVS FIAT.

instrumenta ea sunt, sine quibus nemo tutò aut rectè mederi potest, si viribus destituantur, hoc est, si aut nimis recentia, aut vetusta fuerint, de quibus alijs in locis studiosi admonébuntur.

Locus natalis.

APRILI, SOL in Tauro.

C 3

MAIO

LOCVS
Natalis.MAIO, SOL
in Geminis.In vm-
brosis &
opacis.Syluis &
iuxta ar-
bores ve-
tustas.Sepibus
et dume-
tis.Parietib⁹Vineis et
aruis.Vineis &
aruis.

A Grostis siue gramen,
Germani, Graß/ ex
Dioscoridelib.4. cap.
26. multiplex est, ut etiam
ex Plinio lib.29. cap.19. ge-
niculatis serpit ramulis, à
quibus radices spargit dul-
ces, articulis præcinctas.

Alleluia, quibusdam Oxy-
triphylon, latinis trifolium
acetosum, Germanis, sawer-
flee / oder buchampffer / non-
nullis panis cuculis appel-
latur, idq; eò quod quum
Coccyx cuculat erumpit,
nèpè Aprili & Maio mense.

Alliaria, germani ab odo-
re quem refert, knoblochfraut/
vocant, folia cum primum
erumpunt rotunda spectan-
tur violæ similitudine, post-
quam verò adoleuerint, per
ambitum in serræ modum
lancinata visuntur.

Alfene, quibusdam anthyl-
lion, nonnullis Myosota vo-
catur, quoniam folia muscu-
lorum aures imitantur, plu-
ra eius reperiuntur genera,
germani, Hünederdeim vocat.

Anagallis mas florem ha-
bet phaniceum, Germani,
gauchheyl das mendein vo-
cât: officinis Morsus Gallinæ.

Anagallis fœmina florem
habet caruleum, Germani,
gauchheyl das weible.

LOCVS
Natalis.MAIO, SOL
in Geminis.Agris co-
litur.Nascitur
in collib⁹ & sa-
bulosis.Inter len-
tes et iux-
ta sepes.Montib⁹
præcipue
in Creta
insula.Pratis sic-
cis & in-
cultis.Pratis.
Hortis.Incultis
iuxta se-
mitas.

Anemone, ut græcis ita la-
tinis pariter & Italis, nomen
à flore habet, qui nunq se a-
perit, nisi vento spirante. plu-
ra Anemonis obseruatur ge-
nera, vnum satium, cuius
multæ species, quæ floribus
distinguuntur, alia enim phœ-
niceum florem profert, alia
candidum, aut lacteum, aut
purpureum, quæ oēs ut flori-
bus distinctæ sint, ita etiã fo-
syluestre, quod longè differt
à papauere erratico, præterea
à pulsatilla: Omnia genera
Maio mense florent.

Aparine, germanis flebfraut/
nusquã non prouenit, sed præ-
sertim ut Theophrast. scribit.

Apios q̄ & Ischas appella-
tur, radicem vomitoriam ha-
bet, ut testatur Dioscorides
lib.4. cap.170. longè distas à
pseudapio, de quo postea in
Iunio mense dicemus.

Betonica purpurea, germa-
ni, braun betonien, nascitur
in pratis.

Bellidis plura quanq̄ nu-
merentur genera, tria tamen
communiter obseruantur.

Bellis maior, Germanis,
Gens blümen.

Bellis minor hortensis,
monat blüme.

Bellis minor sylvestris,
flein zeytlosen.

Bulbus

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.	LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.
In syluis & vm- brosis.	Bulbus syluestris, Fuchfio feldtzweibel/nascitur nō pro- cul à Tubinga iuxta mona- sterium Bebenhusen.	In paries tibus la- pidū cu- mulis ru- derib⁹q; nascitur.	Chelidonium maius alijs hirundinaria, quod aduentu hyrundium exurgat & eo- rum discessu emarcescat: vel quia suorum pulloꝝ affe- ctibus tali succurrant hyrun- dines, Germani vocant schel- fraut.
Colitur fistilibus	Caltha siue Calendula, Germani, <i>Bim gelbblumen</i> / floribus speciosis, croceis sin- gulis ferè mensium calendis Maio incipiente, vsq; in au- tumnū florida est.	Pratis & in vijs v- biq; sca- turiens.	Consolida media herba triuialis est, flore purpureo, capitulis penè Stachados, ra- mulis humi repentibus, Ger- mani, <i>gulden gunzel</i> .
Hortis plātatur. Montib⁹ opacis et iuxta se- pes.	Caryophyllata à Caryo- phylli odore, quem manife- stum eius radices spirāt, duo eius genera, vnum satium siue hortense, alterum sylue- stre, Germani, <i>Benedict wurz</i> vocat.	Pasim in hortis colitur.	Cerofolium, planta fragi- lis ac tenera, senis ab vno pe- diculo emergentibus folijs, vulgaris petro selini modo p ambitum incisus, vmbellā in summo caule gerit albis flosculis ornata, tota plan- ta dulcis est, Germani, <i>fersfel</i> fraut.
Propeop- pida na- scitur, & agris nūc colitur.	Chrysanthemon, aut cal- tha nonnullis bupthalmos, herba est tenera, fruticosa læ- ues proferens caules, & mul- tifida folia. nec est ranunculi species Fuchfij, flore luteo, vehementer splendens.	Syluis & vmbros- sis.	Cynocrambe, id est, brassi- ca canina, Germani, <i>Hunde</i> feel.
Pingui solo pro- uenit, iu- xta sepes in vm- brosis.	Clematides daphnoidis, nonnullis vinca peruinca di- citur, folia exeunt per inter- ualla pari vtrinq; exortu lau- ri minora flore caruleo, & nunquā folijs exuta specta- tur, Germani vocant, <i>Win- tergrün oder Syngrün</i> .	In plani- tie et col- libus.	Elleborum seu veratrum nigrū ex Dios. lib. 4. ca. 134. Melampodion appellatur, ob pastore Melampum, qui eo primum vsus est. triplex in flore varietas conspicitur, primum purpureo, alterum candido, tertium herbaceo. Vniuersa genera veratri ni- gri, Martio & Aprili mensi- bus florent, legenda Maio & initio æstatis.
Solo vli- ginoso frequens est.	Chelidonium minus, alijs Scrofularia minor quibusdā testiculus sacerdotis, Fuch- sius ad Malacocissi speciem retilit, Germanis, <i>Pfaffen- hödle oder seygwartz</i> .		Quan-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.	LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.
In Colli- bus & a- peris lo- cis iuxta Halam Sua uorū plurimū reperitur	Quamquam non desunt, qui Veratrum herbaceum Confiliginem esse opinan- tur, eo argumento ducti, qd omnem morbi uim, si in au- riculam quadrupedum inse- ratur radix perforata ferro prius aure, eximat, quæ ta- men opinio falsa est cum ea- dem radix Veratri, id quod Confiligo, præstare potest, autor est Plin. lib. 25. cap. 5.	Iuxta se- pes.	Geranium quartum flori- bus purpureis, ex quibus ca- pitella rostrata gruini capi- tis instar prodeunt.
Arido so- lo gau- det.	Eruca syluestris vulgaris admodum planta est Germa- ni widen senfft / incipit flore- re Maio, & durat per integrū ferè mensem.	Pratis mōtosīs & saxo- sis.	Geranium quintum flori- bus caeruleis: hæc & aliæ spe- cies officinis gruaria herba, autacus moschata, siue ro- strum gruis & Cyconia di- cuntur.
In mace- rijs & se- pibus.	Erigeron gracè, Senecio alijs. Germanis, grindtfraut oder Creutzwurtz / virescit to- to anno & quolibet ferè mē- se floret. Est & aliud genus Senecionis, quod germani florem Sancti Iacobi appel- lant, quod non nisi Iulio & Augusto colligimus,	Monto- sis locis. Colligen- da hæc herba est Maio, Iu- nio & Iu- lio men- sibus.	Herba paris vno 'constat caule, rotundo duorum pal- morum altitudine, e cuius medio erumpunt folia, eo- dem ambitu, crucis instar patentia, sanguineæ virgæ si- millima, Germani vocant Wolfsbeer. longè differens ab Aconito pardalianchi Dio- scoridis, quæ radicem habet effigie Scorpionis.
Segetib⁹.	Fumaria prima, germani, Erdtrauch.	Pratis a- menis & vligino- sis.	Hediopnois maior, non- nullis Dens Leonis, alijs Dēs Caninus, quibusdam caput Monachi, aliquibus Rostrū porcinum, plerisque Ambu- beia vocatur, nec non Tara- xicon, Germani, Groß reile- fraut / folijs Cichoraceis fre- quenter lanciniatis in sagit- tæ modum, caule palmari, rotundo, glabro, cancauo, lacteō succo pragnante, na- scitur.
Syluis.	Fumaria altera, quam pro pistolochia quidam pingūt.	Locis hu- midis & sylvosis.	Lilium conuallium, Ger- mani Mayenblumen.
Campe- stribus.	Geranium floribus pur- pureis, germanis, Storcken- schnabel.		Myr-
Vmbro- sis.	Geranium floribus sub purpureis.		
Dumetis locis.	Geranium tenuifolium purpureis floribus.		

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.	LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.
In hortis & pratis nonnullis	Myrrhis, Germanis, Wilderforfel appellatur, caule, folijsq; simillima est cicuta. radix odorata cibo non insuavis, nascitur passim.		et radicibus, nihil aut parum discriminis habeant, tamen in floribus manifestè differre videntur, flores habet diuersi coloris, videlicet purpureum, candidum viridè, ac nigricatè inferiori parte planè fuci effigiem exhibent.
Hortis colitur.	Nasturtium herba hortis familiaris & frequens, Maio & Iunio florida.	Inter legumina nasci constat, nèpè canna-bimlinū, & in vijs secus agrorum sepes.	Orobanchis, à strangulando legumina cognomètum habet. cauliculus est sububer, hirsutus tener sine folio, pinguis, flore sub albedo, aut in luteum vergente, quibusdam hæc Herba tora vocatur, quod vacca ea degustata, statim taurum adeant.
Nascitur in cultis locis circa tinera & prata.	Nasturtium sylvestre, Galeno alio nomine lepidium. Iberis appellatur, officina non agnoscunt, Germani, Gauch vlumen / oder Wildersfress.	Agris in cultis & inter segetes Maio mense requiruntur	Ornithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum se pandunt, lactei visuntur.
In pratis luxuriat in petrosis & sabulosis frequens	Orchis, alijs Cynosorchis, latinis testiculus caninus mas: folijs latioribus, Germani, Knaben fraut/ puerulis ob florem in ceruleo purpureum exepitatus, Orchis mas, angustifolijs, & maculosis, floribusq; purpureis constat.	Pratensis est herba.	Ophioglosson aut lingua serpentina, herba arietina, folio vnico, pingui, digiti longitudine, paruo, plantagini aquaticæ vocatæ non dissimile, pediculo herbaceo, ex huius inferiore sinu prodeunte. Maio mense irrumpit, & statim post fugax euanescit.
Pratis & campis.	Orchis femina maior. Orchis femina minor, omnia hæc genera Maio & Iunij principio carpuntur.	Montes amat.	Ophris, Germanis, durch wach / oder zwey blat.
	Orchis serapias mas, siue Triorchis, à tribus testiculis denominationem habet, Germani, Ragwurtz / florem habet purpureum, & parum peralbicantem.		D Prunel-
	Triorchis femina, in fine Maij mensis, & initio Iunij hoc genus apparet, deinde nusquam inueniri potest. duo hæc genera, etsi in folijs		

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.	LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.
Pratis gaudet.	Prunella, germani praun- elln/Matthiolus consolidam minorem petasitis Fuchsj, quam Matthiolus pro Tus- silagine maiori pingit ger- mani vocant, pestilenzwurtz.	Incultis & pratis.	Sanguisorba maior & mi- nor, germani, Trachenblut fraut vocant.
Monto- sa herba.	Polygonatum, officinis sigillum sanctae Mariae vel Solomonis. Germanis weiß wurtz / folijs laurilatoribus & lauioribus, sapore mali cotonei, aut punici, cū qua- dam adstrictione.	Pratis a- menis.	Tragopopus, siue barba hir- ci, duorum est generum, v- num floribus luteis quod na- scitur.
Limitib ⁹ humidis	Ranunculus luteus, Ger- manis, gelber hanensfuß. Gra- cis Βαργαξιον dicitur.	Campe- stribus & incultis.	Alterum floribus purpu- reis, quod non nisi mense Iu- nio incipit florere. Colitur apud nos in hortis & fictili- bus. primo anno cum seris- tur non floret, sed sequenti.
Montib ⁹ et asperis locis.	Ranunculus purpureus. Ranunculus lanuginosus, gefülter hanensfuß.	Palustri- b ⁹ & cā- pis nasci- tur.	Verbasum odoratum, Schlüsselblumen.
Syluis.	Ranunculus aureus, wilder goldgelber hanensfuß.		Verbasum non odoratum.
Humidis locis.	Ranunculus candidus, weiß- ser hanensfuß.		Vitex, quam vulgus agnū castum appellat, duplex est, vna candida, quod videlicet florem candidum cum pur- pureo mixtum habeat, altera nigra, quae tantum purpu- reum habet florem, Germani Schaffmullen.
Pratis fa- bulosis et montib ⁹ soli ex- positis.	Satyrium, officinis testis vulpinus aliqui trifolium, Germani, Stendelwurtz / of- ficinae non agnoscunt. Satyrium Erythronium siue Erithracion, siue rub- rum. Satyrium Basilicum fe- mina, alij palmam cristi Ger- mani Creutzblumen.		
Nemori- bus.	Scordium vrsinum, Ger- mani, waldknobloch. Saxifraga maior & alba, Germani, weißen steindrech.		

IVNIO

LOCVS
Natalis.

IVNIO, SOL
in Cancro.

In hortis
petrosi
& riguis

A Canthus vel Acantha
vera, quam Romani
pederotam vocant,
Germani, Welsch bern flaw/
officinis non agnoscitur, fo-
lia habet multò laetucaceis la-
tiora & longiora, erucæ diui-
sura, nigricantia pinguis le-
uia, caulem binum cubito-
rum digitali crassitudine,
florem album nascitur.

Incultis
ac petro-
lis.

Acanthus sylvestris, autor
est Diosco. & Plinius, folijs
spinosis, angustioribus ta-
men vero, longè distans à
sphondilio sylvestri.

Anemonis quinq; obser-
uantur genera.

Collibus
& sabu-
losis.

Primum provenit folio
coriandro simili, sed frequen-
tioribus incisuris, lanugino-
sis caulibus, floribus sylue-
stris papaveris magnitudine,
senis circum distinctis folijs
purpurascens, capitulo
umbilicotenue emergente,
nigro colore, nigrisq; capil-
lamenti stipato, perinde ac
in papauere.

Arvis &
segetib⁹.

Secundum folijs assurgit
maioribus & frequentius
lanciniatis, flores purpura di-
lutius nitescentes.

Tertium folijs crescit ra-
nunculo primo æmulis, cau-
libus. tenuibus, rotundis, in
quorum cacumine flores al-
bi. quinq; tantum folijs di-

LOCVS
Natalis.

IVNIO, SOL
in Cancro.

Campe-
stribus.

Stincti rosarū magnitudine.

Quartum folijs lancinia-
tis floribus purpureis.

Quintum folijs lancinia-
tis floribus aureis.

Omnia hæc genera, Maio
mense & principio Iunij flo-
rent: obseruandum prætere-
ne pro papauere erratico col-
ligantur, quæ inter se longè
differunt, ut testatur Diosco.
qui diuersis capitibus de ijs
scribit.

Pratis a-
menis &
vmbro-
sis.

Aquilegia Germanis, Agas-
ley/ non desunt qui pro spe-
cie chelidonix maioris po-
nunt, caulescit mense Iunio,
numerosa caulium sobole
gracili tamen ac tenui.

Inter se-
getes &
prope se-
pes.

Aphace, germ. Wilde wi-
esen/oder vogels wicken, folio
germinat vitæ maiore, cras-
sioriq; , flore subrubeo, sili-
quis inde de pendentibus pi-
sorum instar, nascitur.

Hortis
colitur.

Aristolochia triplex, longa
germ. ostelucey/ Rotunda,
Germ. holwurcz, q̄ longè ta-
men differt à pistolochia Fu-
chsi, siue fumaria altera. Ter-
tia est Aristolochia clematidis

Montib⁹

Asphodelus verus, vel ha-
stula regia, folijs est maioris
porri, caule leui, floribus albi-
cantibus, numerosis in stellæ
modū sese pendentibus, offi-
cinæ nostræ carent, nascitur.

D 2 Althea

LOCVS
Natalis.IUNIO, SOL
in Cancro.Hortis
colitur.

Althea, quam alij Ibisum
vocant officinis bis malua.
Germanis, *Ibis*/ oder *heyl-*
wurtz/ in syluestrium malua-
rum genere est, cui folia ut
Cyclamino rotunda lanugi-
ne canescunt.

Hortis &
campe-
stribus.

Attriplex ex Dios. lib. 2.
ca. 3. aliqui chrysolochanon
vocant, germani *möiten*. duo
eius genera satium & syl-
uestre, vtrumq; olus cogni-
tum.

Campe-
stribus &
ruderib⁹.

Bursa pastoris, Germani,
Sirtenstab.

In sepib⁹

Bryonia & ampello leuie
grace, vitis alba latine, fescer
ra arabice vulgo nostro,
Stuckwurtz/ tota estate flore-
scit, & in sublimis ita attolli-
tur ut vniuersos tegat, arbo-
res scandit, et sepes tanquam
itragula vestis exornet.

scobium
margine,
nusq; ra-
men nos
copioflo-
rem na-
sci vidi-
mus qua
Tubinge

Bupthalthmon, quida ca-
chlon vocant, germani *Kins-*
aug/ caules emittit tenues
mollesq; : folia foeniculi, lu-
teum florem, anthemide
maioris oculi similitudine,
vnde nomen traxit, ex hac
descriptione Diosco: errant
hi qui Bellem maiorem pro
Bupthalthmo ponunt, errant
& officina, si cotulam non
foetidam pro eo rapiunt &
colligunt.

Circa op-
pida et in
campe-
stribus
nascitur,

LOCVS
Natalis.IUNIO, SOL
in Cancro.In obscu-
ris syluis
& valli-
bus.

Pratishu-
midis, &
vmbro-
sis locis.

Asperis
& petro-
lis.

Iuxta se-
pes.

Pratis.

Vineis
nascitur.

Barba capri Fuchsi, Ger-
manice, *Wald geißbart*.

Bistorta, germani, *Watter-*
wurtz/ quam aliqui Britanni-
cam herbam esse contendit,
duplex est, mas & foemina,
officinae vtramque plantam
serpentariam falso appellat,
cu ea sit Dracunculus, Dios.

Chamaedrys gravis, alijs
chamedrops, officinis cha-
medryos, genituo pro recto
ventibus, ut in Stochade,
vulgo calamandrina, ex Dio-
sc. lib. 3. cap. 94. latinis
Trifago. Sunt qui eam Teu-
crion appellauere, propter si-
militudinem quam seruat
cum teucro, Germani, *flein*
Bathengel. Iunio & Iulio
mensibus colligenda.

Caryophyllata sylvestris,
floribus luteis, vulgo *Benes*
dict wurtz.

Careum, siue Carum, Ara-
bistis Caruum, Germ. *Fumel*.

Cynoglossum, latinis lin-
gua canina, Germ. *Hundts-*
zung/ herba est caule vacans,
lanuginosa. nec est ea herba,
e solo elata passim circa iti-
nera, caule hispido, furculo-
so, folijs hirsutis, arctis, pra-
longis flore ex purpura ca-
ruleo, qui aliquibus pilo-
sella maior dicitur.

Cyanus

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IVNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IVNIO, SOL in Cancro.
Inter fru- menta- ceas sege- tes mi- nor ap- paret.	Cyanus, alijs Baptifecula, duplex maior et minor. Ger- mani, foin blumen / Maio & Iunio mense, ad contexen- das rusticarum puellarum coronas expetita est minor. Cyanus maior nascitur non procul ab Hala sueuorum in monte dicto, einform.	Montib ⁹ et collib ⁹ Maio & Iunio mense vberri- ma est.	ex qua de descriptione apparet lōge differre Chamecyssum ab Hedera terrestri, quā quidam chamecyssum affir- mant.
Copiose nascitur indume- tis, & pra- tis siccis.	Campanula Fuchsi, Ger- mani, balsfraut / quod vide- licet ad oris, cervicis fau- ciumq; mala conferat dicta est.		Chamepitys, siue aiuga uel abiga, siue ibiga & iba ex b. mutatione, vulgo Iua arthe- tica. ex Dios. lib. 3. triplex est, omnes odorem piniredo- lent, ex Marcello picea à quo chamepitys nomen dedu- ctum esse credunt, quasi par- ua picea, uel parua pinus. Quæ verò in officinis mon- stratur, viginem potius resi- pit quā pinum, vix amare- scit, minusq; densa.
Inter fru- menta & segetes sponte prouenit	Chamamelum, officinis Camomilla grecis anthemis, trium est generum flore tan- tum distantium, de quibus infra de floribus dicemus.	Agris macris.	Consolida regalis, Germ: Kitterspoin / species chamo- miæ.
Herba nō nisi sa- ta in ger- mania nostra crescit.	Coronopus, Germ. Bräen- fiss / dicitur & sanguinaria, officinis iucognita herba est oblonga per terram strata, folijs tcissis, radice gracili & adstringente.	Asperis & incul- tis locis.	Echion, quod à viperis no- men omnino adinuenit, vel quod semen proferat capiti- bus viperinis simile, appella- tur etiam ut autor est Nican- der Alcibiicum. folia habet prælonga, aspera, aliquan- tum tenuia, anchusæ proxi- ma minora tamen, subrubra & pingua, spinulis tenuibus horridula, flores purpureos nascitur.
Nascitur in cultis.	Est & Cornopus syluestris herba, q̄folia pfert longa, an- gusta, per interualla cornicu- lata, humi accubantia, & in stellæ modum radiantia, cau- lem, spicam, florem & semen gerit, per omnia plantagini similia.	Hortis colitur.	Erucæ duæ species ex Dios. lib. 2. vna hortensis quæ flo- ret tota æstate, colligenda ea Augusto, alia syluestris ma- ximè
	Chamecyssus Diosco: fo- lio est hedera, tenuiore, lon- giore flore violæ albæ, simili gustu amaro supra modum,		

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IVNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IVNIO, SOL in Cancro.
Campe- stribus et incultis nascitur.	ximè in Iberia quæ occiden- tem spectat, ea circa calendas Iunij potissimum erumpit, alio enim tempore vix repe- ritur.	Montib ⁹	Filix foemina folijs est fi- licis surculosis, altioribusq; & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciatur: vtramq; plantam Germani, Waldfar- ren/ vocant.
Campe- stribus & motosis.	Eringeon, Germ. mans- trew/ oder raddisteln / legitur cum sol est in cancro, nasci- tur copiosissimè iuxta ar- cem Lympurg prope Ha- lam Sueuorum.	Nascitur propè se- pes & se- cus uia.	Galion, nomen ex eo tra- xit, quod in contrahendo lacte coaguli vicem impleat, germanis, vnser fraren weg- stroß vocant, folium habet aparinæ simillimum, minus rem tamen.
Hortis vbi Thy- mus, co- litur, cre- scit.	Epithymum, flos est è Thymo duriore satyreia si- mili capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas quasi capillamenta. Colligi- tur eo tempore, quo thy- mum largè floret, quod acci- dit circa iollitium cancri.	Circa se- pes & edi- ficiorum, areas ac semitas vbiq;.	Galeopsis, græcis pariter ac latinis, quibusdam vrtica foetida nominatur, longè distans à scrophularia maio- re.
In mon- tibus & saxosis.	Filix mas, folia habet sine caule, sine flore, ex vno pe- diculo cubitali longitudine exeunt, multifida & lateri- bus pinnata sub graui odore Ethi Diosco. lib. 4. cap. 178. sine fructu scribit, constat ta- men, semen ferre filicem, a- uersis folijs inhærens, sed minutum. colligitur planta Iunio, semen vero circa fi- nem Iunij mensis, legitur au- tem abscissis, propè radicem folijs & in domo suspensis, substracto linteolo, aut pa- pyro.	Nascitur in monti- b ⁹ , copio- siore nō vidi q̄ in mōte di- cto Her- berg/nō procul à Balinga.	Gentiana à Rege Illirico inuenta, cognitu facillima, folijs iuglandi, plantagini- ue similibus, iuxta cacumen paulum dissectis, Germani, Enzian vocant. Sunt & aliæ species Gentianæ, inter quas Cruciata vna dicitur.
			Gnaphalium tormentosa planta & incana, quibus- dam herba Sancti Christo- phori, vel filius ante patrem, alijs impia herba dicitur, Germanis, Rburfraut / folijs albis ramulis capitatis, ros- marini, ut scribitur, effi- gie.
			Genesta, falsò quibusdam spar

IUNIO, SOL
in Cancro.

LOCVS
Natalis.

Pratis
motosis
& saxo-
sis.

In riguis
pratis &
conual-
libus

In vineis
cultisq;
locis ac
femitib;
copiosis-
sima.

Pasim
iuxta iti-
nera na-
scitur.

IUNIO, SOL
in Cancro.

spartion appellatur, ad sco-
pas obsequiosissima pluri-
mis turget foliolis, floribus
luteis, pisi modò lunatis,
Germani, Genesi.

Gratiola quibusdam gra-
tia Dei folijs lini, vel Hyllo-
pi æmulis, latiusculis, caule
rotundo, anguloso nonnun-
quam floribus oblongis, ex
foliorum sinu flavescenti-
bus, aut purpurascensibus.
Germani, vocant *firschtraut*/
oder firsch byssop.

Hedera terrestris, longè ab
Asclepiade herba distans,
longis tenuibusq; funiculis
hedera illa in terra proserpit,
folijs violaceis, asperis, gra-
uiter odoratis, in ambitu di-
scissis, floribus in purpura
albicantibus, Fuchsius Cha-
mecissum Dioscoridis esse
credit, Matthioli negat.

Intybus latinè, Seris græcè,
ex Dios. lib. 2. cap. 125. diui-
ditur in sylvestre, picris & ci-
choriū appellatū, latinis aut
Ambubeia, officinæ Cicho-
ream, Germani, *Wegwarten*
vocant, hæc cū Iunio incipit
florere, in autumnum usq;
durat ab eo tēpore donec flo-
ret colligenda erit, altera syl-
vestris, Seris siue Intybus He-
diopnois nominatur, latio-
re folio constat, quibusdam

Dens

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

IVNIO, SOL
in Cancro.

Pratis
spōte sua
crescit.

Dens Leonis, quod folium
sinuatim per lacinias denti-
culatum sit. officinis Ta-
raxicon aut Altaraxicon, ger-
manis, Korkkraut/ oder praf-
sen rōrle. colligendum Iunio
mense.

Hortis
puenit
cult.

Satiuus Intybus, quem pri-
uatim, Plinio teste lib. 20.
cap. 8. Serin nominarunt, in
duas distinguitur species, v-
na latiore folio, quam vul-
gus Endiuam vocat, lactuce
similior, nostratibus mensis
Iunio & Iulio mense, in ace-
tarijs frequentissima, trans-
lata hęc, terraq; sepius obru-
ta cādorem, teneritudinemq;
acquirat, & maiorem amari-
tudinis partem exuit. Altera
angustiora folia habet, &
subamara est, Germani Sca-
riolam vocant.

Montib⁹

Imperatoria, herba no-
men acquisiuit, propter in-
gentes facultates quas ha-
bet, contra nimirum mor-
bos venenatos, folijs Sphon-
dylio minoribus, solo accu-
bantibus, robustis hirsutis ac
asperis constat, in cacumine
floribus candidis.

Lapathum officinis, vel
lapacium acutum, vulgò Rü-
mex, græcis Oxylapathum.
ex Dios. quadrifariam distri-
buitur, Galeno trifariam,

LOCVS
Natalis.

IVNIO, SOL
in Cancro.

In palu-
strib⁹ &
circa fos-
sas.

Hortis
plātatur.

In arcis
sepib⁹ &
sec⁹ vias.

Partim
seritur,
partim in
pratis at-
que in-
cultis na-
scitur.

Nascitur
in pratis
& palu-
stribus.

Nascitur
montib⁹
pserim

primum palustre, Germanis,
Wildtampffer / oder streiff-
wurz.

Alterum satium priori
non dissimile, at minoribus
folijs pluribusq; cauliculis,
hoc genus creditur esse Rha-
barbarum Monachorum.

Tertium genus sylvestre
est, paruum plantagini pro-
ximum humile & molle,
germani, gūten heinrich vo-
cant, nascitur.

Quartum Oxalis vulgo
acetola dicitur, quia gratum
acorem palato repræsentat,
Germani, Sowerampffer /
caule non magno semine
rubente, subacuto, hanc Ro-
mani propriè appellarunt
Rumicem, ad vsus medicos
expetita forsitan, quod ab ea
succus non aliter, atq; mam-
ma (quam Rumen veteres
dixerunt) sitientibus exugi
soleat.

Limonium folia habet
betæ, tenuiora & longiora,
decem & sepe plura, caulem
tenuem rectum lilio æqua-
lem seminibus rubris scatentem,
quæ gustata adstringunt
Germani, Waldt mangoit / vo-
cant.

Lunaria minor, germanis,
flein monatfraut / planta est
breuis, dodrantali fere altitu-
dine

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
mōte Au- striaco ppè Tu- bingam.	dine caule constat simplici, rotundo, lento ac gracili, è cuius medio in latus exit ra- musculus, cui folia sūt vtrin- que septem annexa, lunata, crassa, firmaq;.	Pratishu midisiu/ xta alue- orū mar- gines, & montib ⁹ saxosis reperitur	tur, duum est generum, al- terum flore luteo, Germani, gelb wederich / caule iunceo, longo, nodoso, folijs saligi- ginis, ut plurimum ternis, gustu valde adstringentibus, alterum flore purpureo Ger- mani, braun wederich / haec- nus nobis incognita, quam verò officinæ pro Lysima- chia ostendunt, vera Diosco- ridis non est, ut ex gustu ap- paret quæ non adstringit, sed potius illegittima Lysima- chia.
In segeti- bus & cultis a- gris.	Lolium, Germani Trepse oder walchtrepse / floret hoc mense, Iulio semen profert & cum frumento colligitur, in mea patria vulgò For- scheim plurimum reperitur.	In palu- stribus & locis hu- midis.	Laserpitium germani- cum. Germani, Maister- wurg / alijs Magistrantia, Iu- nio mense florida est.
Nascitur in cultis locis cir- caitnera & prata.	Lepidium siue Iberis, Na- sturtium agreste, Germanis, gauchblum / oder wilder fress / licet his nominib ⁹ Fuchsis & Matthiolo, res eadem signi- ficetur, quod & Damocrates lepidium, Iberim appellavit, Gal. lib. 19. cap. med. loc. te- ste, attamen Appollinari Ver- cellensi medico, sanè doctis- simo, plantæ, diuersæ sunt.	Montib ⁹ & hortis plátatur.	Laserpitium verum Dio- scoridis nascitur in Syria Ar- menia Media & Lybia. Caus- le ferulaceo, quem Masperu vocant, folijs apio simili- bus lato semine.
Hortis plátatur. Nascitur in aspe- ris & edi- tis locis.	Lepidum piperitis, Ger- mani, pfefferfraut. Lithospermon, officinis miliū solis vel soler. ex Diosco. lib. 3. cap. 141. à se- minis duritie nomen acce- pit, folijs est oleæ longiori- bus, Germani Meerbirich & Steinsamen vocant, officinæ maius & minus ostendunt, Iunio & Iulio mense semine turgent.	Syluis fa- bulosis et in vijs locis pfer- tim inter muscos fos lapi- des. Hortis plátatur.	Muscus terrestris, Germa- ni, mosig / vocant, planta est longis viticulis, ubiq; & ob- longis, foliolis numerosissi- mis vestita.
	Lysimachia, quibusdam Corneola, alijs salicaria dici		Melissa quam melisso- phyllon siue melitena, id est, apiastrum vocant, voce dā nata ab Hermolao secundo sui corollarij cap. 310. etsi ab Ignio viro eruditissimo in- E uecta,

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
	<p>uecta, Dioscoridi ac Varro ni vsitata alijs citrigo siue citraria ab odore citri, de qua Diosco. lib. 3. cap. 99. est porro duorum generum, vnum luteum, alterum pur- pureum, Iunio & Iulio colli- genda.</p> <p>Melilotus, siue fertula cā- pana, alijs Regia corona, Germanis, vnser frawen schū- lein/in tria fastigia diuiditur.</p> <p>Primum verum Melilo- tum, simile fœnu græco est, folio raro, flore luteo, odoris eiusdem cuius & herba, nem- pè suauis.</p> <p>Secundum aspectu cano- croci odore ac flore pinguis- simis ac breuissimis folijs, Plin. teste lib. 21. cap. 9.</p> <p>Tertium ab radice frutico- sum, cubitale, flagellis exi- libus, coma trifolij minuta, ac lente fimbriata, flosculo melino, odoris eiusdem cui- & herba, nempe suauis om- nia eiusmodi genera melilo- ti in fine Mēsis Iunij & Iulio dū florent colligenda sunt.</p> <p>Melilotum syluestre, quod accedit ferè ad formam ge- nestella, Germani, vnser frau- wen schūlein.</p> <p>Nymphaea, officinis Ne- nuphar, folijs fabæ ægyptiæ. Est & altera Nymphaea cuius</p>		<p>flos blephara dicitur, folijs antedictæ radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosæ simi- li, nobis in pallidam flore cā- dido, lilio simili radice nigra aspera, clauæ figura. & cro- ceam offi. citrinam diuidi- tur, flore luteo, splendēte ro- sæ simili, radice alba aspera. quæ candida est radice po- tentior existimatur.</p> <p>Orminū, satium, Germa- ni, garten scharlach / herba est folijs marrubio similis, caule semicubitali, quadrangulo circa, quem eminentiæ sili- quis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, hæc planta plurimū distat à Gal- litrico, uel centro galli, alijs sclarea.</p> <p>Orminū syluestre, wilder scharlach / vulgò dicitur, folio est saluæ fere simili, gallitri- co passim vocato haud lon- gè ab simile.</p> <p>Plantago maior, Breyte wegerich.</p> <p>Plantago minor, spitzig wegerich.</p> <p>Plantago aquatica folijs est ceteris crassiore robustio- re; ac leuiore, ex lata origi- ne in acutum desinente; lan- ceæ cuspidis modo flosculis, cādidis, græci Alisina vocāt, Germ. wasser wegerich.</p> <p>Paxconia</p>
		Paludib ⁹ & stagna- tibus a- quas.	
		Colitur.	
Hortisin Germani- a, plan- tari cepit			
		Pratis & sponte nascitur.	
		Pratis.	
		Humidis	
		Lacunis.	
Pratis & aridis lo- cis.			

LOCVS Natalis.	IVNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IVNIO, SOL in Cancro.
Hortis colitur.	Paania, siue glycyfide ex Diosc. lib. 3. cap. 134. græcis aliquibus penthoron dici- tur, sunt qui Idæas dactylos radicem paconix vocent, duplex est, mas & fœmina, Germa: gichtraut.	In pratis asperisq; & saxo- lis.	Philipendula, à tuberosis radiculis, quasi ex filo pen- dentibus, græcis znanthe, Germanis, Steinbrech. folijs staphilini, floribus candidis.
Aquosis.	Pentaphyllon, maius can- didum, weiß gras fûnffinger, traut.	Petrosis & aridis locis.	Pilosella maior, Germani, Nagelstrauch, herba est è solo elata, caule interdum cubita- li, hispido, surculoso folijs arctis, pralongis, hirsutis, non venosis mollibus, hanc herbam officinae magno er- rore, pro cynoglossio vero v- surparunt.
Incultis.	Pentaphyllon maius luteu, gelb fûnffinger traut.		Pilosella minor Germani, Nagelstrauch/oder hasen pfedle/ differt tamen ab auricula muris, quam Germani, Hû- nerderm vocant.
Aridis locis.	Pentaphyllon minus. Papauer: ex Diosc. lib. 4. cap. 54. aliud est erraticum, quod rhæada vocant, recen- tes papauer rubrum, flore protinus deciduo puniceo, interdum albo oblongo ca- pite, pueri eiusmodi folijs concauo pugno impositis ludunt, altera palma incus- sa, strepitum edunt, Ger- mani fœn rosen vocant.	Aridis.	Pes anserinus, à Domino Fuchfio præceptore meo ob- seruantissimo herba sic di- cta, quod folia planè formâ anserini pedis habeant, vul- gò Gens fûß.
In sege- tibus ca- pis et ma- cerijs.	Aliud papauer satium est, quod Thilacitem vocant se- mine est candido. colligen- dum id Augusto mense. Parthenium, de quo Dio- sc. lib. 3. cap. 132. aliqui a- maracon vocant, vulgo ma- tricaria Germani, Niertram/ estq; hoc parthenium.	Hortis si- mosis.	Periclymenon vulgo ma- ter sylua, quibusdam capri- folio, siue vincibosco, aut li- lium interspinas, Germani, Wald lilien/cuius fructus po- ma equina vocantur.
Hortis.	Domesticum siue hortenfe: alterum est campestre, quod Germani, wild familln vo- cant, oder frotten dill.	Hortis et sepibus colitur.	Pyrola Germani, Winter- grün / folia pyri arboris in- star habet.
Campe- stribus & segetib.		Montib. ymbro- sis.	Rubia tinctorum officinis, græcè Erithrodanum, radix rubra est, qua tinguntur lanae.
		Seritur in Italia & Ger	E 2 vna

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

IUNIO, SOL
in Cancro.

mania
quibus
dā locis.
Vmbro-
sis & se-
pibus.

vna est fatiua, Germ: Garten
röt/altera syluestris, alias stel-
laria dicta, nec est pediculus
Lupinus vulgi) folijs & cau-
libus asperis ac rudibus, hæc
& Alchymilla aut pes Leo-
nis dicitur, folijs oc tangulis
maluam penè referentibus,
circum ferratis, flosculis stel-
latis. Iunio dum florescit
colligenda.

Incultis
& aridis.
feritur.

Sanguisorba maior & mi-
nor, Drachenbaur fraut.

Spinachia, folio triangu-
lari, Germ: Binesch.

Invinetis
ruribus
virida-
rijs vtra-
que ge-
nera fa-
miliaria.

Sonchus, vulgo cicerbita,
aut rostrum porcinum, siue
crispium, ex Dios. triplex est,
lib. 2. cap. 123. quidam syl-
uestrior & spinis magis hor-
rens, Germ. Gens diitel. alter
tenerior sonchus arboris in-
star latis constans folijs, cau-
lem in ramos exeuntem fo-
lia distinguunt. Tertium ar-
borescit non multis est cog-
nitum: alij in candidum &
nigrum, alij edendo, alij nō
edendo, alij in asperam, alij
in leuem, esse dixerunt, ea-
dem rei diuisione & signifi-
catione.

Pratis.

Satyrium trifolium ve-
rum, siue testiculus vulpis,
vulgo Stendelwurz / trifo-
lium nomen habet propter
tria folia. Satyrion autem,

LOCVS
Natalis.

IUNIO, SOL
in Cancro.

Pratisvli-
ginolis.

Pratis af-
fatim lu-
xurat.

Pratis fa-
bulosis.

quod Dij colludentes, Nym-
phis ad firmiorem venerem
hanc herbam inuenerunt.

Sphondilium folijs qua-
dantenus platani, at panacis
caule fœniculato.

Satyrium Basilicum mas,
Germani, freuzbümen das
mendle.

Satyricum basilicum fœ-
mina, freuzbümen das
weyble.

Scabiosa maior & minor,
Germani, apostem fraut. vtra-
que p'anta nota. veteribus
indicta Maio & Iunio ad O-
ctobrim usq; florescit. Est &
pseudoscabiosa legitima &
adeo persimilis ut primo in-
tuitu peritissimos etiam fal-
lat, verum crassior tota est,
nec amarescit, nec adeo hir-
suta, plures alias species sca-
biofa ostendit. D. Fuchsius
in postrema editione.

In petris
et asperis
locis na-
scitur.

Saxifraga, quam Romani
sic vocant, ex Diosco. lib. 4.
cap. 15. Saxiphagon, alij
Saxiphagon, quidam em-
petron vocant, Germ: stains-
brech: herba epithymo simi-
lis, hætenus Medicis non-
dum est cognita, quam enim
autores ostendunt, figura E-
pithymi non respondet, pro
ea itaq; uti licet, vel pimpi-
nella hircina, vel tormentil-
la, aut

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
	la, aut herba S. Petri sic dicta, alij vtuntur radice raphani, vel nasturtij, aut raphani femine, siue aspleno, aut filipendula rubea. donec uera sese offerat.		bus spicati exeunt flores ex purpura albicantes. Et si inquam Horminum non sit, posset tamen quis pro odorato Hormino vti Mathiolo placet, comode uti.
Pratis & aridis locis.	Serpillum duorum generum est. Dios. lib. 3. cap. 37. hortense odore samisicum imitatur, atq; in coronas ad di solet, legendum Iulio & Augusto mense, alterum est syluestre zigis appellatum, Germani, Felsdr quendel vocant. floret fere tota aestate, legendum itaq; dum floret.	Integulis secusque parietes.	Semperuiuum siue sedum ex Dios. lib. 4. cap. 77. triplex est. Primum sedum maius, quibusdam Barba lovis (quae Alcudem ex Plinio) dicitur, Germani, grofß haufwurtz vocant.
Syluis & aquosis.	Stellaria, quam Fuchsius aliquando Leonis pedem vocauit, Germa: Synaw oder Leontropfen / folijs octangulis, quam supra pro Rubia tinctorum syluestri posuimus.	In Macerijs parietibusq;	Minus vulgo vermiculare, Germani, Klein haufwurtz / quibusdam crassula minor, distinguitur in marem & foeminam. Mas florem gerit croceum, Maio & Iunio mensibus. Foemina albo flore spectatur.
Syluis.	Sanicula mas & foemina, Germani, Sanickeln vocant, mas folia habet vitis simillima, cum rubentibus maculis, foemina, eiusmodi maculis caret.	Parietibus	Tertium sedum gustu acerrimum est. omnia haec genera donec florent colligenda sunt praecipue Iunio & Iulio mensibus.
Campestribus & incultis.	Scarlea folijs hormino quadruplo maioribus & latioribus, subasperis crispis, humi accubantibus caule sesquicubitali, & quandoq; citato lamaiore hirsuto firmo quod dranguloq; a cuius medio plures oriuntur rami, in qui-	Aridis et fabulosis	Spartion, falso quibusdam Genesta vocatur, Germani, pfrimen / colligitur circa Idus Iunij, frutex est sine folijs, & floribus constat alba viola similibus.
		In aquis	Sion, Lauer & anagallis, aquatica latinis dicitur, officinis herba ignota, Germani, Wasserpungen / Bachpungen.
			E 3 Trifo-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
Pratisa- menis.	Trifolium odoratum, wotrichender flec. Trifolium pratense flori- bus, tam a bis quam purpu- reis Germ: wifen flec. Tragopus, siue barba hir- ci, floribus purpureis, Germ: bochsbart / officinis pleriq; incognita herba. Primò il- lam vidimus in horto illu- strissimi comitis Ludouici Casimiri, de Hohenloe, pij defuncti.	Asperis & incul- tis.	ciarijs duplex, Mas profer- pens, & si caule sit dodranta- li, subrubro hirsutis folijs longiusculis, cum lanugine ad nigrum inclinantibus, flo- ribus purpurascens. Fœ- mina folijs rotundis lanugi- noso, similiter caule flore melino ad purpuram vers- gente. Iunio mense colligen- da vtraq;.
Colitur apud nos in fœtili- bus & hortis.	Tussilago latinis, Βίχιον græcè, vel Chamaleuce ex Myrepsò, officinis farsara, si- ue vngula caballina, flores Martio mense apud nos ap- parent, folia & radix ultra æstatem licet durant, colligi- mus tamen circa tropicum canceri.	Seruntur	Viciæ germinant, folio mi- nore quam aphace, & tenui- ore quoq; caule, Germani, wicken vocant, flore in pur- puram rubescens.
Iname- nis & in- cultis a- gris.	Tormentilla, Heptaphyl- lon, vocata à septenis folio- rum diuisuris, in quinq; fo- lij specie reponitur.		
Aridis & siccis lo- cis.	Thlaspi alijs capsella, siue scandulaceum, vulgò sina- pis syluatica, duorum est ge- nerum, latifolium, & angusti folium, Germani, Bawern: senfft / vocant præsertim pri- us, posterius autem Besem- frant / quod scoparum vices suppleat.		
In fossis & iuxta sapes.	Veronica, Germani, Ehen- preyß / recentioribus simpli-		

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

Hortis.

A Sparagus officinis spa-
ragus, Germanis, spar-
gen, duplex hortensis
& spontaneus, solonatali dif-
ferentes, sylvestrem alij Cor-
rudam, Attici Orminum ap-
pellant, cuius meminit Di-
osco. lib. 2. cap. 117. quan-
& de altili verba fecisse con-
stat.

Montib.

Hortis v-
biq; col-
latur.

Apium hortense, erudito-
rum ferè omnium consensu
vulgare est petroselinum, id-
que probant ex Plinio lib.
20. cap. 11. & Gal. lib. 2.
alim. facul. cap. 52.

Palustri-
bus locis
gaudet.

Apium palustre & rusticū
latinis, Eleoselinon Diosco-
ridi, Germanis wasser epff/
der epich / alij paludapium,
quod apud aquæ ductus &
in palustribus pueniat, folio
raro, nec hirsuto consistit,
sed simile quodammodo A-
pio est, odore, sapore, figura-
q; qd & officinæ hætenus,
pro vero apio usurparunt,
sed malè.

Hortis,
locisq;
hume-
tis pin-
guinis
busq;
gaugès.

Alcea, latinis Ibisus,
vulgò maluanisco, aut bo-
nausisco, siue bis malua, con-
stat folio malua, maiori ta-
men, pilosioreq; caule molli
flore melino, fructu malua,
radice nervosa albaq; gustu
malua, caulibus proxima,
Iulio & Augusto colligenda.

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

Campe-
stribus &
hortis.

Asperis
sabulosi-
siccis &
conual-
libus.

Vmbro-
sis parie-
tibus.

In Ponto
& Cap-
padocia.

Alcea sylvestrium maluarū
generi assignata, quibusdam
herba Simeonis, Germani,
Sigmaræfraut.

Amarantus, Helicrisus, si-
ue luteus, Germ. floramor od-
tausentschön / Iulio floret, quo
tempore & colligendus.

Adiantum, cuius duo ge-
nera ex Theoph. 7. de hilito.
plant. cap. 13. candidum vi-
delicet & nigrum ex Diosco.
lib. 4. cap. 120. adianthon, si-
ne adiectione polytrichon
vocatur, nigro colore nitens:
officinæ adiantum, capillum
Veneris, polytrichon. calli-
trichon diuersis nominibus,
distinctas esse plantas putat,
cum tamen in vnum coinci-
dant, idemq; denotent. Diosc.
in Adiantum, quod plinius
candidū, alijs polytrichon
quidam capillum Veneris
distinguunt, & Trichoma-
nen, quod Plinius nigrum
vocat, Germani candidum
vocant Jungfrawhar / Ni-
grum autem Steinbrech.

Absintheum, quibusdam
Batypricon. Germani Wer-
muth / sunt verò tria præci-
pue genera, ponticum, Ma-
rinum, quod alio nomine
Seriphium vocant, est &
tertium

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
In fanto- nia Gal- lia.	tertium quod Santonicum, à regione in qua nascitur, vo- catur optimum est Pōticum ob maiorem adstringendi vim. Est & vulgare absinthium nostrum, Matthiolus à Pon- tico alio discrimine differre non censuit, quàm quod pro- prio clymatis munere, no- strate minus est, adstrictori- um autem magis: In fine Iu- lij mensis legendum.		Buglossum vulgare folio est boragine longiore, hirsu- to aspero, minutissimis acu- leis scatente, flores edit pur- pureos Boragine minores. huius species aliquot obser- uantur, vnum hortense, & duo sylvestria.
Iuxta se- pes pas- sim na- scitur.	Anchusa, quam rurales Buglossum sylvestre vocant, alijs Calyx aut Onoclea, Germanis, rot ochsenzungen appellatur, æstate florida. Matthiolus aliquot species ostendit.	Hortis colitur.	Botris, Germanis, Trau- ben fraut. Botrys à semine qd racematim ramulis ad nasci- tur. Amathus Botrym ac Ar- themisiam vnicaulem, vnā & eandem plantam esse exi- stimat, Apollo Franciscus negat.
Campe- stribus & lato solo nascitur	Anethum Dioscoridis, fo- lio & flore vsq; adeo fœnicu- li æmulo, ut oculis illudis, gustu atq; odoratu interno- scatur, semine tamen mino- re, in fine mensis Iulij colli- gendum.	Campe- stribus.	Blattearia, passim hæc na- scitur folijs oblongis p am- bitum serratis, floribus lu- teis, & similis est Verbasco, quæ sæpe fallit pro ea capta.
Hortis se- ritur & spontè fœniculi modò puenit.	Buglossum ex Dioscori- dis historia lib. 4. cap. 112. nihil aliud est quàm vulga- ris & hortensis borago, Ger- manis, Borretsch / a boum linguis, quas folia eius imi- tantur lingua bubula voca- ta, longitudine, asperitate, latitudine uè. Iulio mense col- ligitur.	In Aruis & mon- tibus.	Cnicus officinis Cartha- mus, vulgo crocus Saraceni- cus, duo genera ex Theopha- sto notantur, 6. de historia plant. cap. 4. sylvestre nimi- rum & vrbānum. Sylvestre duplex, vnum mitius, & Cnico satiuo similis, hoc proprie græci Attractylida, latini verò fusum agrestem, aut colum rusticam, nomi- narunt, hæc Attractylis Au- gusto mense legenda. alte- rum sylvestre genus densum est, caulesq; soncheos pro- fert, quod officinis omnibus &
Hortis fa- miliaris- simum, cæpestri- bus & sa- bulosis.		Hortis passim colitur.	

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
	& vulgo Cardo benedictus nuncupatur, Germani, Besseghener distel/ oder Bomwurz. In fine Iulij mensis maturum, nisi quod eius semen Augusto ad maturitatem peruenit.		bos est magnitudine praestans, folio non absimili fanu graeco, ut testatur Theoph. lib. 3. de hist. plant. cap. 7. cultam aliquoties vidimus in horto Illustrissimi comitis Ludouici Casimiri de Hohenloe, principio Iulij ad maturitatem peruenit.
Inter linum & Epithymum crescit.	Castutha vel cuscutha, germani, flachs seyden/filtzfrant/ herba est in modum capillamenti, spinis ac plantis inuoluta, sine folijs, paruo tamen ac albo flore.	Scrobiu aggeribus & lecus vias.	Chondrylla, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, ex Dios. lib. 2. cap. 25. caulem flores & folia cichorio similia habet, verum tenuior tota est, Germani, vocant flein sonnen wirbele/ aliud Chondrilla genus habetur, folium ferens longum circumrosum humi ipsarum, caulem succo madentem lacteo, radice tenui rotunda, leui, vegeta flauescente. Germ. hasenstrauch.
Humidis circa fluentia.	Centum morbia, sine numularia, Germanis. pfennigfrant.	Nascitur in letis & cultis.	Calamintha, officinis calamentum, ex Dios. lib. 3. cap. 24. quadam montibus familiaris, altera pulegio similis est, Nepeta à latinis vocitata. Tertia menthastro cognata, huius omne genus à latinis Nepeta confusa appellatur: officina nostra videntur, tertio genere mentastro propinquo. vbi verò vtriusq; scribitur, herbam gattariam secundam speciem addunt.
Inglabre montium, & in syluis puenit.	Chamaleon albus, Germani, Eberwurz vocant, folia habet silybo, aut scolymosimilia, asperiora acutiora, nigroq; chameleone validiora, caulem non promittunt, verum ex medio spinas echini marini, aut Cinaræ modo erigit, flores purpureos. Iulio & Augusto mense colligenda.	Secus vias semitasq; capestres agrorum & fossarum margines.	
In caepitibus siccis & cliuosis tractibus & maritimis.	Chamaleon niger, Germani schwarz Garten distel/ folio ferè scolymo similis, minora tamē, tenuioraq; ac rubro distincta videntur, caule dodrantali, in vmbella flores spinosos, versicolores, hyacinthi amulos.		
Hortis colitur.	Coluthea, siue colythea, Germani, Welsch linsen. ar-		

F Cala-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
Solo inculto nascitur: & circa piscinas stagna, aquarum scatibras & labra eorum exurgunt. Prope urbium & oppidorum montia.	Calamintha aquatica alijs silymbrium, officinis Bala-mita dicitur, German. Bach-mintz/est & silymbrium Cardamine officinis, Nasturtium aquaticum, Germani Brun-na fress/ colliguntur Iulio & Augusto mensibus, haec & aliae species silymbrij.	Altis montibus, inuenimus non procul ab Hala Sueuorum.	Tertium assignatur genus folijs Coriandri, Germanis, schwarz hirtzwurz/ probatissimum creticum: idque in myropolijs omnibus, vulgate syluestris pastinacae nomine, Dauci omnis usum obtinuit, idem tamen non sunt Daucum & pastinaca syluestris.
Montibus et incultis.	Cicuta latinis & officinis, Conion graece, Germanis, schirling oder wutterich, vulgaris notitia est planta, Iulio flores & semen profert, quo tempore legenda.	Creta Infula herba haec propria est.	Dicamnum cretense ali-quibus syluestre pulegium, leuis pulegio similis, sed maioribus folijs, quae tomento quodam, spissaque lanugine pubescunt. Dioscor. metitestate & autumnus. vsus foliorum, non ramorum nec fructus. Est & pseudodicamnium, de quibus lege Dioscor. lib. 3. cap. 32.
Montibus umbratis & saxosis locis.	Cruciata a D. Fuchsis sic appellata, quod eius radix in modum crucis transfossa sit Germani, Creutzwurz/ vocant, haec magnam cognationem cum gentiana habet.	Humidis iuxta riuos aquarum & fontes.	Dipsacus, alijs Galedragon siue labrum Veneris de quo Dioscor. lib. 3. cap. 12, Germanis farten distel/ duum est generum, vnum satium, quod a villonibus in hortis plantatur. Germ. Weberfarten/ alterum sponte passim nascitur, floribus purpureis, Iunio & Iulio potissimum carpitur.
Petrosis et apricis locis.	Digitalis Fuchsis, Germani fingerhut/ duum est generum, vnum floribus purpureis, alterum, floribus luteis, vtraque genera vidimus florere in sylua non procul a Thermis cellensibus mense Iulio, quo tempore colligenda sunt.		Dracunculus maior & minor: maior habet caulem rectum lauem, duum cubitorum, baculi crassitudine, versicoloribus draconum maculis, purpureis tamen euidentibus folia rumicis sibi inui-
	Daucus ex Dioscor. lib. 3. cap. 67. aliqui Daucium vocant: triplex est creticum folijs foeniculo simile, Germani, Berzwurz/ aut Bermutter/ aliud genus syluestri apio simile, Germani, weiß hirtzwurz/		

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IVLIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IVLIO, SOL in Leone.
Nascitur in sepib ⁹ vmbro- sis vterq;	inuicem implicita: minor folio constat haderaceo, ma- gno, candidis notis insigni caule recto bicubitali, verli- colore, maculis resperfo pur- pureis, ita ut anguem planè referat. Colligitur vtraque mefsis tempore, ex quibus succus exprimitur.	Campe- stribus inculto solo.	noribus multò, luteis floris bus. Est & Erigeron maius, à quibusdam flos Sancti Ia- cobi dictus. floret Iulio & Augusto mensibus.
Hortisut etiã vm- brosis lo- cis pro- uenit.	Enula campana vulgo, a- lijs Helenium, duplex ex Dio- scor. lib. 1. cap. 26. vna habe folia verbasci angustioris fo- lij, asperiora, oblonga. alte- ra aegyptia quæ nobis incog- nita est. Germani Enulam vocat alar wurz.	In riguis et scrobi- bus.	Equisetum, officinis cau- da equina duplex est ex Dio- scor. lib. 4. ca. 42. vna longior, asprella vulgò dicta, aspera sanè, ad tergendà vasa vilita- tissima, altera breuior, huic negotio minus apta.
Circa vi- neta scrobiu- q; mar- gines, lo- cis etiam motosis copiosif- sima.	Eupatorium, ex Diosc. lib. 4. cap. 33. fruticosà herba est. Germani, Odermenig / Italis Agrimonia.	Iuxta vr- bes rude- ra hor- tosq; na- scitur.	Erysimon latini Irionem vocant, Germani Hederich oder wilden senfft / vulgò ra- pistrum, folijs erucz sylue- stris. per integram æstatem floret, legendum in fine mē- sis & principio Augusti.
Campe- stribus.	Est & Eupatorium vulga- re, quo hætenus officinæ pro Dioscoridis Eupatorio vsur- parunt, verum haud rectè, estq; meo iudicio Ageratum, potius Dioscoridis, quamuis à nobis dissentia Andreas Marinus, ut de eo latius in libro, de delectu purgatiuum medicamentorum nostro, supra Mesuem scripsimus.	Nascitur sepibus, parietib ⁹ et vinetis	Elxine, officinis parietaria, Germanis tag vnd nacht/ oder S. Peters kraut / in fine Iulij mensis colligenda.
In mace- rijs circa oppida.	Erigeron sine Senecion, Germanis grindt kraut / folijs continuis per extremitates erucz modo dissectis, sed mi-	Seritura- liquando spote in- ter sege- tes nasci- tur.	Eruum latine, Orobum græcè ex Diosc. lib. 2. cap. 191 angusto folio, tenuis, semen in valuulis habens, hodie ab officinis nō cognoscitur, olim erat vulgaris hæc plan- ta in boum saginæ, quidam cicerulam. Galeno Lathy- rum, alij eruiolam, non- nulli vitiam, plures semen quoddam ab Alexandria al- latum vitia simile putarunt, quidam lolium, alij alia

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
	somniarunt. Est porro aliud satiuum quod album dici- tur, alterum sylvestre, idque rustum, Iulio mense matu- rum.		floris seminisq; , estq; hoc mitissimum.
Hortis feritur.	Foeniculus latinè, græcè <i>μαγελον</i> , Germanicè, <i>Sen- chel</i> / colligitur caule turgē- scente, salua vitali, Iulio præsertim mense.	Hortis et fistilibus	Hysopus, duum est gene- rum montanum et hortense, Germani <i>3spen</i> / floret Iulio & Augusto mensibus, quo tempore etiam colligenda.
Campe- stribus.	Geranium sextum, cuius flores sint purpurei, radix in- trinsecus, & extrinsecus ruf- sa, Germanis, <i>Storch schna- bel</i> .	In hortis iucundū spica & lauanda spirant odorem.	Lauandula, alij Lauanda, etsi sub genere Nardi repo- nitur, longè tamen distat vi- ribus à spica, siue Nardo cel- tica, Romana etiā dicta, quā Germani <i>Spicanardi</i> vocāt, ea enim iucundi odoris, est radice numerosa, coharens, plena, nec fragilis est. Lauen- dula autem grauis est odoris, balneis & lauacris expetita, floribus potissimum, ramis, folijs, cauli, & radicibus nul- lus vsus, folio est crassiore robustiore, colore in cano, flosculis cæruleis vel purpu- reis, ideo hæc pseudo nardus dicta est.
Gignitur incultis & aspe- ris locis.	Hypericum vulgò perfo- rata, alij herba S. Iohannis, Iunio & Iulio mensibus au- reis floribus ornata, ex Dios- alij androsomon, alij ca- chion, alij chamepitum ap- pellant.		Lactucarum, variae sunt species ex Theophrast. 7. de hist. plant. cap. 4. varijs etiam nominibus insignitæ, alia e- nim crispa, rotunda, quæ Iu- lio & Augusto mensibus magnam habet gratiam, tam in acetarijs, quam infer- culis. Alia est capitata à fo- lijs suis, quæ ubi à terra pa- rum attolluntur, mali cuius- dam
Interrui- nas an- tiquis muribus	Hyosciamus siue Apolli- naris herba, quibusdam Al- tercus, officinis barbarè Ius- quiamus, ut & pleraq; alia nomina, ignorantia græci & latini sermonis corrumpūt. ex Dios. lib. 4. cap. 59. trium est differentiarum, primum floribus purpureis ferè, se- mine nigro, alterum semen subflauum flore luteo. ter- tium genus, quod in vsum medicum venit, pingue la- nuginosum molle, candidi	Hortis et agris cul- tis.	

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
	dam speciem rotundam ob- tinent, instar Brassicae capita- tae, Germani, grosser lattich oder weisser lattich / & hac Iulio mense floret & semen profert.	Saxis & aspergis nos pe- tris adhe- ret ut mu- scus.	Lichen, græcis pariter atq; latinis, Hepatica officinis, Germanis, stein oder braunn leberfraut / aliquibus Bryon appellatur. Iulio mense ea est decerpenda.
In aruis & vinea- rum hor- torumq; macerijs nascitur.	Lactuca sylvestris, germa- ni, wilder lattich / spinulis in- horrescit, folijs laciniatim ferratis, & per oras aculea- tis, hacq; non citra errorem, pro officinarum endivia v/ surpatur, succo enim acri ac medicato abundat.	Incultis asperis et editis lo- cis.	Lithospermon, officinae Miliū solis, aliquibus Mi- lium soler, à loco quo nasci- tur rectius denominatur, Li- thospermon à seminis duri- cia nomen accepit. Est & a- liud milium solis minus à seplasiarijs appellatū, quod pro iuero Lithospermo non erit vtendum.
Montib; asperis et incultis.	Lonchitis prima, ex Dios- lib. 3. cap. 144. folia habet porri latoria, rubentia, plu- rima ad radicem circumfra- cta, veluti in terram procum- bentia, pauca in caule, in quo flores ceu galericuli, &c.	In sege- tibus.	Lagopus, Germani, hasen/ fuß / oder hasen pfödle / nasci- tur.
Syluis ac mōtosis locis.	Lonchitis altera, quam a- lij asperam lonchitin appel- lant, folia scolopendrij emit- tit, sed asperiora maioraq; ac multò magis diuisa. hanc primò mihi ostendit doctus adolescens Ioannes Hesch ^{us} , medicinae ac rei herbariae stu- diosus Tubingæ, quam ex Martiana sylua secum attu- lerat.	In cam- pestribus cultis vi- netisq;.	Mercurialis ex Dios. lib. 4. ca. 169. Linozostis, quibusdā parthenion, alijs hermisbo- tanion appellatur, eo quod à Mercurio inuenta sit, cre- ditur, est autem duplex mas & foemina. In fine Iulij col- ligenda, aut principio Au- gusti.
Campe- stribus.	Linaria officinis, Osyris græcis, flachsfraut oder barn- craut Germanis, Iulio, Augu- sto & Septembri mensibus floret.	Nascitur propè æ- dificia, ruinas & rudera.	Marrubium, cuius duo genera Theophrast. 6. de hist. plant. cap. 11. cōstituit, aliud folio herbido, ferratiori, in- cisurisq; profundioribus, al- terum rotundius, squalensq; vehementer, incisuras habes obscuriores, minusq; ferra- tum, estq; hoc aliud nihil, F 3 quàm

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

Colitur
fistilibus
& virida-
rijs.

quam Ballote siue Marrubiū
nigrum Dioscoridis quod
Germani *schwarzen andorn*
vocant, alterum verò *Mar-*
rubium candidum, Germ:
weissen andorn / colliguntur
Iulio potissimum mēse am-
bo genera.

Maiorana vulgò. *Sampsu-*
cus & *Amaracus* grecis, exi-
mia odoris gratia supra aedi-
um fenestras in atrijs, cēna-
culis, ac viridarijs passim co-
litur, perpetua uiret coma, à
frigoris inclementia asserua-
ta, per terram non repit, etsi
ita statuatur Dioscorides, colli-
gitur circa finem Iulij men-
sis, & principio Augusti.

Malua ex Diosc. lib. 2. cap.
110. duplex est, satiuā, esui
longè aptior & sylvestris,
Germani *pappeln* vocant,
quæ in fine Iulij mensis &
Augusti principio colligen-
dæ, quo tempore etiam flo-
rent.

Hortis
colitur,

Malua arborea, quibus-
dam Romana appellata, ea-
que Coburgi in horto Des-
cani, ac alibi arboris instar
visitur, dicitur enim arbore-
scere, mensibus senis aut se-
ptenis. Aëtius deindramala-
chen, Galenus anadendro-

In aruis
sponte
nascitur.

Inter fru-
menta.

malachen vocat, 14. metho.
floribus quàm maximè Iu-
nio & Iulio abundat.

Melanthium, quæ & Gi-
thon. officin. *Nigella*, quod
à semine nomen nactum est,
dicitur. duum est generum,
Satium & *sylvestre*. *Sati-*
um exilibus surculis fruti-
cat, sæpe binos dodrantes
excedens, folijs ut fenetio-
nis minutis, sed multò te-
nuioribus capitulo in cacu-
mine tenui paruo, ceu *papa-*
ueris, oblongo intercuran-
tibus intus membranis. *Fu-*
chsius tria *hortensia* ostendit,
quorum duo habent se-
mina nigra, vnum Germani
schwarz kömich / alterum,
schwarz Coriander vocant.
tercium *Melanthium citri-*
num, quod semen eius sit
subflauum.

Sylvestre *Melanthium*,
Germani *wild schwarz Cori-*
ander / quod *Fuchsius* videtur
potius esse tertium genus
Cumini sylvestris, *Matthio-*
lus duo sylvestria pingit.

Est & *pseudomelanthium*,
quod olim pro *Lolio Fuch-*
sii signauerat.

Origanum ex Diosc. lib. 3
cap. 28. triplex est, aliud
Hera-

QVO TEMPORÈ HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
	Heracleoticum, quod & Cunilam vocant, Brassauolus id commune Origanum, in campestribus passim oborietur, heracleoticum esse re- tulit. Matthiolus negat & sylvestre facit, Franciscus A- pollo Alexander vir doctissi- mus, neque folijs Hyssopi, neque sylvestre Dioscoridis, esse scribit, sed pro secunda spe- cie, ex tribus à Plinio depi- ctis lib. 20. cap. 17. ponit, & pro legitimo statuit origa- num.		rum, mittel basilien / pri- mum, groß basilien.
	Origanum alterum est oz- nitis. Tertium est Tragoriga- num.		Phyllitis, falso scolopen- dria, siue lingua ceruina, di- citur Germani Hirtzunga / folia promit rumici similia, longiora & viridiora, sena aut ieptena, recta, quaz parte anteriore laeua cernuntur, à tergo autem pensiles, quasi vermiculos tenues ollen- dunt: ex quibus apparet phyllitim longè differre à Scolopendria, siue aspleno, quam aliqui Hemionium vocant, folijs est multis sco- lopendriae animali, similibus ab radice vna prodeunti- bus, folia polypodij mo- do diuiduntur. subter fla- uescentia, hirsutaque, sus- perne viridia. vtraque plan- ta Iulio & Augusto colligi- genda.
Propè ve- pres, sen- tes, colles et fossarū margi- nes penè vbiq; na- scitur Cōmune Origanū	Ocymum triplici habetur differentia, primum folijs mercurialis, helxine, aut a- maranthi emulis, crassis, la- tis, longiusculus, vulgò rus- ticum basilicum dicitur. Se- rapioni, non Caryophylla- tum. Dioscoridi lib. 2. cap. 134. Ocymum simpliciter. Secundum, folijs exit à ra- mulis dicto longè minori- bus. Tertium folijs minu- tioribus atque angustiori- bus, ceteris iucundiores ef- flans odorem. Germani hoc vocant, Flein basilien / alte-	Parietib ⁹ saxis sili- ceis & opacis.	Peucedanum, alijs fœni- culum porcinum, Germani Harstrang.
Seritur et colitur in hortis & facili- bus.		Montib ⁹ opacis et pratis hu- midis In vligi- nosis lo- cis et pro- pè semi- tas.	Potentilla, Germani Gen- serich / herba agrimonia non dissimilis, cauliculos pro- fert qui humi repunt, pilo- sellæ modo, floribus au- reis.
			Perz

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
Arenosis & aruis.	Perfoliata, Germ. durch- wachs.		tam maior, quàm minor Bi- penella: maiorem siue san- guisorbam maiorem, mino- rem, sanguisorbam mino- rem vocat Matthiolus, vtra- que hirci odorem præfert Est & Bipenella Saxifra- ga.
Palustri- bus & a- quosis.	Potamogeton, foliū habet betæ simile, hirsutum paulu- lum supereminens, extra a- quam Germani, saum frant.		Petroselinum Macedoni- cum ex Diosc. lib. 3. cap. 62. prouenit folio apio aquatico simili, sed minoribus, caule crasso, ramoso, floribus al- bis, semine ammi, odoratio- re, sapore acri, aroma olente, errant itaq; plurimum qui vulgare petroselinum à Ma- cedonico nihil differre scri- bunt. Est & Hipposelinon herba ea quam Fuchsius fal- so Smyrnion vocauit, Ger- mani libstüchel.
Inter se- pta fre- quens.	Phu, vulgo Valeriana, quibusdam Amantila, aut herba Benedicta, aliqui syl- uestre Nardum vocant, Ger- mani Baldrian / Est verò a- liud magnum, aliud minus, tertium exiguum.	Hortis plātatur ac seritur	
Collibus & monti- bus abun- dat pos- simum.	Polium ex Diosc. lib. 3. cap. 105. duplex est. montanum cui Teuthrion nomen est, alij polium maius, cuius est v- sus, alterum fruticosius, non vsq; adeo valens, odore & viribus infirmius, hoc ab a- lijs polium syluestre dicitur.		Polygonum, vel sangui- naria quibusdam centum- nodia, nomen equiseti tri- butum. ex Auicenna 5. col- lect. vulgò Corregiola, ex Diosco. in marem & fœmi- nam distinguitur. Germani Wegdrit gras / vtuntur mare- duntaxat, utpote viribus effi- caciore.
In hortis et vineis.	Portulaca officinis, An- drachne græcis, Germ. Bur- zelfrant / est verò alia hor- tensis, alia syluestris. Iulio potissimum mense carpen- da sunt, folia portulacæ.	Mas in cæpstris b ^o cōmu- nib ^o vijs aditio- rū areis vbq; sca- tet. fami- na pau- cis agnos- citur.	
Petrosis & incu- tis.	Papauer satium, græcis μῆλον ἡμερῶν, Germ. mag sa- men / duplex est, candidum & nigrum, Iulio & Augusto colligendum.		Persicaria, quibusdam hy- dropiper, Dioscoridis. Ger- manis, flosfrant / à recentio- ribus in duas species distin- guitur, in non lituratam & alteram
In hortis satū pro- uenit.	Pimpinella, rectius Bipi- nella, quibusdam Solbastrel- la, alijs sanguisorba dicitur, Germanis pineln / æstate vs- que in autumnum florescit,		
Montib ^o saxosis et opacis.			

21
QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
	altera cui folia infunt pullo colore signata, quafi oculi pupillam praeferentia, flore purpureo. Iulio & Augufto menfibus colligenda.	Capeftri b ^o et fub urbijs. In locis ficciffimis calidis diffimis que.	quo tunc femen erit demetendum, herba vero ad vsum medicum dum floret. Eft & Ruta fylueftris, Germani Maurrauten vocant. Tertio habetur Ruta montana, provenit.
Montibus & hortis platur.	Pyrethrum ex Diof. lib. 3. cap. 69. Romani faluarem vocant, floribus eft chamaemelines non anethi umbellae, ut fcriptum reliquit Diofcoridis. Germani Bertram vocant, herba colligenda circa finem ferè Iulij. Radix autumnò quibusdam effoditur, nos verò Iulio cum adhuc eft fucco plena.	In montibus & paluftribus ne dum etiã pratishumidis.	Scordium folijs triflaginis maioribus, non fic in ambitu diuifis, aliquantulum alia redolentibus quadrangulis caulibus, fubrubro flore, vifitur hac planta & apud nos non procul ab Hala Sueuorum, propè Geyslinge montem.
In montibus alxis & faxosis.	Parmica graecis, Sternutamentaria latinis, Germanis wilder Bertram. Rufficis oliueta vocatur, à fimilitudine foliorum, frutice ferculaceo, abrotani æmulo flore, capitulo chamamelidefloreſcentis inftar.	Campeſtribus.	Spina alba, graecis Acanthaleuce apud Dio. li. 3. cap. 12. hodie plerique pharmacopoeis incognita herba eft, vti pro ea hodie non incommodè quis poſſet, quã ab alijs lactaria herba, ſive Carduus Mariae, Germ. ſechdiſtel appellatur, ſiquidem ea ad omnia praefat, quæ in Acanthaleuci à Dioſcoride deſcribuntur, non dicam quod notis quibusdam huic accedat.
Gignitur in muſcoſis petris & in agrestibus quercu truncis.	Polypodium, ſive filicula quibusdam glycyrrhiza fylueſtris dicitur, praefantius eft, quod arboribus glandiferis innafcitur. herba eft filicis ſimilis ſubhirsuta, incifuris diuiſa, non tamen adeo tenuibus.	Nafcitur in montibus & fyluis.	Alba ſpina latinis, Graecis Leucacantha, & hac quæ nafcit, hoc eft quibus folijs, quocaulè, flore, ac ſemine proueniat, ne hodie quidem conſtat inter medicos.
Hortis ſegetur & platur.	Ruta hortenfis, Germani Rauten / floret Iulio, cognitu hac facillima eft. Autumno matureſcit ſemen,		Symphiton, quibusdam G Alo,

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
Petrus na- scitur.	Alo, officinis consolida ex Dios. duplex est, primum pe- treum, nascitur ramis tenui- bus, Origanosimilibus capi- tulis thymi, lignosum, totum odoratum, gultu dulce, sali- nam ciens. Alterum Sym- phiton, pecton alij vocant Germani groß waltwurz / id caulem emittit bicubitalem, colligenda circa finem men- sis.	Nascitur in monti- bus & asperis.	Thymelea, ex qua granum Cnidium, quod est semen i- psum colligitur, huius folia, quæ peculiariter Cneoron appellatur, per menses colligi deben, & siccata in vmbra recondi. Caterum obiter hic notandum, quod Arabes, Thymeleam & Chameleam confuse Mezereon appella- runt, Germani, chameleam vocant Seytlandt / Thymelea autem fert granum siue se- men, quod officina Coccum Cnidium appellant.
vmbro- sis et opa- cis.	Smilax aspera, alijs hedera spinosa, siue Rubus ceruinus nominatur, folia habet peri- clymeni aculeata, arbores- candit, Germani Scharpff winden.	In tenui solo & a- speris lo- cis hor- tis siue na- scitur ac feritur.	Thymbra græcis, Satureia, vel cunila latinis, ex Diosc. lib. 3. ca. 36. vulgaris notitia est. duum est generum, hor- tensis & sylvestris. primum Germani saturon, Hünersül- oder Joseplen vocant, alte- rum feldt quendel oder fänle / ad Columelle gustu acrius & odoratior est.
Sepibus.	Smilax Ixuris, folia hede- ra similitudinem habent, molliora, leuiora, tenuiora, nullis horret spinis, colligi- tur folia in fine Iulij, & prin- cipio Augusti, folia enim per autumnum decidua sunt.	Nascitur in Aman- to Cilitie monte et in multis etiã Ger- manie monti- bus as- peris et petrosis.	Tordylon siue Tordylion, latinis Sefeli creticum, Pau- lus agineta Gordylion, Ger- mani Berwurz vocant, her- ba est surculosa, semine du- plici, rotundo, scutorum ef- figie, odorato, subacri, ad- fertur ad nos hodie Malsi- liense odoratum, amarum, oblongum, cum latitudine carnolum, Iulio mense Tor- dylon
Petrus.	Saxifraga lutea, Germani gelb steinbrech.		
Saxosis & petris.	Strutium, siue saponaria, Germani seyffen kraut / in fi- ne Iulij mensis.		
Hortis nascitur, & vine- tis.	Salvia, siue elelisphacos, Germani Salney / duum est generum, maior & minor, vtraq; fruticosa, spicato flore Iunio & Iulio mensibus ap- paret.		

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

dylon floret, ac semen subinde profert.

Telephium, vulgò crassula maior, quidam fabariam vei fabam græcam, à foliorum, quam cum faba habent, similitudine nominat, Germani roud fraut / oder knaben fraut / Dios. lib. 2. cap. ultimo, duo genera facit vnum floribus candidis, alterum luteis. Fuchsius tertium ostendit floribus purpureis. Matthiolus pro Thelephio, Chelidonium minus ostendit, quod videlicet in Telephio illo, Dioscoridis non inest facultas illa exiccandi & detergendi, Franciscus Appollo, Matthioli sententiam negat, & eiusmodi vires Telephio tribuit.

In mace-
rijs ac
septis.

Vrtica nulli non cognita solo tactu, suoq; igneo pruritu. non modo interdiu, sed etiam noctu, vellicat enim, pungit, & suo morsu sensum lacelsit, Germani vocant kleffel / ex Diosco. lib. 4. cap. 79. duo genera describuntur. vnum satium, quod Romanam vel græcam vrticam nominant, caule rotundo, asperrima, nigricantibus folijs, semine limi æmulo alterum genus sylvestre est,

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

cuius tres obseruantur species, vna aspera vrtica appellatur nigrioribus, folijs hirsutiore caule, semine limi, sed minore, altera, minus aspera, minuto semine, vulgaris est hæc. tertia Canina nominatur, minor licet cæteris sit, acrior tamen & mordacior est, cuius semen accipiat, non refert, Iulio mense ad maturitatem perueniunt.

Vrtica Cardiaca dicta, Germani herzgspar vocant, floribus galioplis, folijs vrticæ non dissimilibus, officinarum quædam Brancham vrsinam vocant.

Verbenaca græcis, ex Dios. lib. 4. cap. 51. peristereon, latinis columbaria vocatur, alijs sacra herba, quoniam multum ad amuleta expiationesq; commendatur, diuisitur in rectam & supinam, Maremq; & fœminam. Rectam Fuchsius marem vocat tribuit, huic flores luteos, supinam fœminam esse scribit, floribus purpureis, Germani vtrinq; plantam cysen fraut nominant. colligi debent potissimum fœmina, circa canis ortum, hoc est mense Iulij, quo tempore florent.

G 2

Ver-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

In subur
bijsvbiq;
& circa
parietes.

Verbascum, vulgo Tapfus
barbatus ex Diosc. lib. 4. cap.
89. differentias summias du-
as habet, nigrum & album,
in quibus mas & foemina in-
telliguntur. Mas candidum
weiß wullefraut/ das mende/
Germani vocant, Foemina,
nigrum appellant, schwarz
wullefraut/ das weible / cuius
aliquot numerantur species,
distinguunt quidam in do-
mestica & sylvestria. legenda
genera Verbasci Iulio, quo
tempore florent.

LOCVS
Natalis.

AUGVSTO,
Sol in Virgine.

In aquo-
sis incul-
tis aspe-
risq; lo-
cis.

In hortis
siccis &
lapidosis

In aqua-
ru ripis
vinearu
aggerib.

Salvia
passim
feritur ac
platatur
in hortis
germa-
niae.

Sylvis &
vmbro-
sis.

Nascitur
ac feritur
in hortis.

ARthemisia, Germani
beyß/ duplex est, vna
latior habitiorq; fo-
lijs, siue ramosa & fruticosa,
quæ hodie nomen in offici-
nis retinet. altera ramosa
quidem, sed non fruticosa,
quæ Fuchsius Matricariam
appellat, cuius sententiam
Matthiolus refutat hac, ut
scribit Dios. lib. 3. cap. 110.
constat flore paruo, tenui,
candido graueolente, æstate
flore. Est & tertium genus
tenui folium, quod Fuchsius
Tanacetum esse putat, huius
opinio ab eodem Matthio-
lo improbat.

Angelica, Germani pesti-
lantz wurtz / vna hortensis,
quæ cubitalem altitudinem
excedit, caule geniculato,
inani, multis alarum cauis
referto, folia profert oblon-
ga, per ambitum serrata, in
nigrum virescentia. Sylue-
stris pumilior est, sed viribus
omnium præstantissima, Ger-
mani vocant Angelik / oder
des heyligen geist wurtz / oder
brustwurtz.

Ami, cuius genituo am-
meos, officinae vtiur, æthio-
picum cuminum appellant,
Germani Amey, vulgo no-
tum.

Ama-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS	AVGVSTO,	LOCVS	AVGVSTO,
Natalis.	Sol in Virgine.	Natalis.	Sol in Virgine.
Hortis et fagilibus	Amarantus purpureus, Germani florumor.	cat, Germani holzmangolt/ de quo supra diximus in mente lunio.	
Incultis et asperis locis.	Ascyron siue ascyroides hyperici genus est magnitu- dine distans fruticosius mai- ores habens ramos surculo- siores, rubentesq; folia te- nuia, Germani hart herb vo- cant.	Campe- stribus.	Blitum, fatuum & insipi- dum olus, quod Gale. lib. 2. alimēt: facul sic vocat. Ger- mani Mäyer / floret æstate & autumno, Augusto mense carpitur.
In mon- tibus sa- xosis,	Asclepias, germ. Schwal- ben wurz / ramos emittit lon- gos: folia hedera longa, er- rant hi, qui pro ea Hedera terrestri vtuntur. pro Ascle- piade Fuchsius Vincetoxi- cum ostendit, cui Franciscus Apollo vir doctissimus as- sentitur.	Hortis passim pueniūt.	Brassica vel caulis ex Dios- lib. 2. cap. 1. & 2. diuiditur in satiuam et syluestrem, satia que æstate propter amaritu- dinem non æstur, acris enim est, à Plinio lib. 9. cap. 8. & ante ipsum Theophr. lib. 7. hist. plant. cap. 4. in tres spe- cies diuiditur, nempe primò lauem, quam germani brey- ten oder grossen feel vocant, alteram Crispam, germani trausen feel / tertia crambe, germani fleinen feel.
In colli- bus mon- tibus al- tis & syl- uis.	Aster Atticus, Bubonium, græcis, Inguinalis latinis, of- ficinis ignota herba, Stern- fraut germanis, Augusto & Septembri mensibus colli- genda.	Mariti- mis præ- rūptisq; locis fre- quens.	Brassica syluestris, candi- dior hirsutior & amarior, q̃ satiua de qua Theophr. 7. hi- sto. plant. cap. 6.
Hortis seritur.	Beta ex Dios. lib. 2. ca. 1. 5 in candidam & nigram di- stinguitur. Candida in om- nibus efficacior quàm nigra, hanc ficulam, vel ficlan, Theophr. autore lib. 7. de hist. plant. cap. 4. appellarunt, Germani mangolt / colligen- da Augusto.	Mariti- mis locis	Brassica Marina, officinae soldanella, folijs Aristolo- chie rotundæ prælongis, ut Dioscoridis textus habet, o- mnia hæc genera Augusto mense potissimum florent.
Syluis.	Beta syluestris, inter acu- leata numerat Theophr. 6. de hist. plant. cap. 3. Plin. lib. 20 cap. 8. hanc Limonium vo-	Seritur et plātatur in hortis.	Balsamina siue viticella, planta prælongis tenuibusq; viticulis est, vltro citroq; re- ptantibus, praximas tū plan- tas,

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO,
Sol in Virgine.

Amat so-
lum pin-
gue & a-
pricu ac
tyluas &
colles.

Montib⁹
ac aspe-
ris locis.

Pratis &
campe-
stribus.

tas, tum arbusculas compre-
hendit, Germ. Balsamtraut/
alijs Hierosolimitanum po-
mum vocatur, Franciscus
Apollo inter genus Halica-
cabi secundi ponit, qd idem
Matthioli facit.

Centaurium duplex, ex
Diosc. lib. 3. cap. 6. & 7. maius
& minus, Magnum folia ha-
bet iuglandis, oblonga viri-
di bratsicarum colore sepra-
ta in ambitu, &c. est nihil ali-
ud quam illustis illa radix,
quam antiqui erroris secta-
rij Rheuponticum vocave-
runt. Centaurium minus,
vulgo biondella, ex Diosco.
lib. 1. limnesion aliqui vocave-
runt, quoniam rigua amet
loca, Germani gulde / oder
siebertraut / Iulio, Augusto,
& Septembri colligitur, eo
tempore, quo semine prag-
nans est herba, ad extrahen-
dum succum.

Euphrasia, quibusdam
Eufragia graecis Euphrosini,
alijs herba adhil, quibus-
dam ophthalmica, antiqui-
oribus incognita, herbula
est, inter initia autumnii ma-
gna copia erumpit, Germani
augentrost vocant.

Esula maior quam officinae
sic vocant, graecis pityu-

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO,
Sol in Virgine.

Nascitur
ruderib⁹
& incul-
tis agris,
aridis in-
terdu &
siccis lo-
cis.

In cultis
& siccis
sive aspe-
ris locis.

sa, quae à Cyparissia specie
differre constat, caulis supra
cubiti altitudinem assurgit,
geniculatus, folijs piceae acu-
tis, exilibus: flore paruo, ve-
lut purpureo, &c. huius ra-
dix magna impostura, pro
Turpeto venditur. Quod
cum non ignorasset Aqua-
rius sua aetate, Turpetum a-
liud album esse dicit, quod
Aliptae radicem esse prodi-
dit, aliud nigrum, quod py-
tuse radix est. Fuchsius a-
pud Nicolaum Esulam ni-
hil aliud esse opinatur, quam
Chamepitum, quod Matthi-
olus negat. Imò Nicolaum,
illam ipsam Esulam maio-
rem, vel pityusam, quae folio
piceae uel pineae constat, in-
tellexisse, à forma foliorum
denominatione sumpsit, par-
uam enim pinum, pityusam
representat.

Esula minor, hanc Mat-
thiolus Tithymalum Cy-
parissiam esse opinatur, ea-
liquidem primum arborem,
nuper natam folijs prorsus
imitetur, radicibus hac con-
stat exiguis fibrosis, parua
hac praestantior est, praeser-
tim cortice, & eo quidem
tenuiore, leuiore, fractu fa-
cili

24
QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Nascitur
in hortis
et vineis.

Hortis
seritur.

Seritur
agris.

Hortis et
vligino-
sis locis.

cili Casia modò subru-
bente, senis nondum men-
sibus transactis collecto,
nam recens quo mense legi-
tur mala est uti, & nigra &
orta loco aliquo prope Ther-
mas, legenda igitur sunt E-
sula, circa finem Augusti,
aut tempore melsis.

Esula rotunda, græcis pe-
plus, frutex est lactei succi
plenus, Germani, Teuffels-
mildh vocant, folijs parvis
uritz, paulò latoribus, ro-
tunda coma, colligitur prin-
cipio Augusti mensis, sicca-
tur in vmbra & cōtinuè ver-
titur.

Eruca sativa, latinis parit-
er atq; officinis græcis Eu-
xomon, Germanis Weiss-
senfft / circa finem Augusti
colligenda.

Lens sativa herba notissi-
ma, Augusti mensis initio,
vel circa finem Iulij, colligi-
tur vna cum semine.

Mentha, cuius duæ sunt
differentiæ, hortensis & syl-
vestris. Hortensium aliquot
numerantur species, floscu-
lis purpureis, vna interno-
dia coronantibus verticilla-
to ambitu: altera sub pur-
pureo flore spicatoq; circa

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Campe-
stribus
& itine-
rū mar-
ginibus

In quer-
cu arbo-
re & sa-
xosis lo-
cis.

In arvis
& incul-
tis nasci-
tur.

caulicorum fastigia, ut
quæ Romana dicitur. Sylue-
stris, vulgo Menthastrum di-
citur.

Mentha in vmbra sic-
canda, ut eius superflua hu-
miditas corrigatur, vbi ve-
rò infundi tantum postu-
lat, ut in syrupo de absin-
thio, passa tantum requiri-
tur. idque in omnibus in-
fusis perpetuò obseruan-
dum.

Pulmonaria, Germanis
Lungastraut.

Pulegium, Germani Pos-
ley / aliud sativum, aliud syl-
vestre apparet, Sylvestre pul-
legium, simile est origano
minoribus folijs quàm sa-
tium, & à quibusdam Di-
ctamnium vocatur. Diuidunt
præterea in marem & fœmi-
nam pulegium. Mas candi-
do flore, fœmina purpureo
erumpit, quæ efficacior est
mare, legenda sunt cum
fuerint floribus onusta, Iu-
lio videlicet & Augusto mē-
sibus.

Psyllum, latinis herba
pulicaris, Germanis psiliens-
fraut / semine est nigro pur-
licum

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

licum simili, vnde & nomen
flore tota æstate. Matthio-
lus duo constituit genera v-
num flosculis albis, alterum
quod folijs constar numero-
rioribus, longioribus, angu-
stioribus, densioribus pilolis
pnr iter atq; incanis. Franci-
scus Apollo tria describit,
album nigrum, vel subpur-
pureum, ex quibus deligen-
dum est semen, quod est ma-
turum, magnū, graue & qd
aqua mergatur.

Nascitur
in mōti-
bus aspe-
ris & in
cultis lo-
cis.

Solidago Saracenica, ab
alijs ceratophyla, Germani
Heydnisch wundkraut / à
Fuchsis sic denominata, cau-
lem rubrum ac cauum ha-
bet, altitudine trium fere cu-
bitorum, è quo prodeunt
folia oblonga, serræ modo
incisa falicq; similia, flores
luteos Augusto mense osten-
dit.

Locis in-
cultis
mōtib;
saltibus
pratis &
dumetis.

Succisa quam aliqui Ge-
um appellant, Germ: Teuf-
fels ambie / latinis Morsus
Diaboli, folijs plantaginis
minoris similis, floribus pur-
pureis, radicibus subnigris
& succis. In Augusto colli-
gitur.

Nascitur
in aqua-
rū ripis.

Tanacetum, Germanis
Keinfarn / quod Fuchsius pro
tertia specie Artemisæ po-

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

nit, Matthiolus verò negat
& pro parthenio mare de-
scribit, floret hæc Augusto
mense.

1.
Sepibus
aut val-
libus.

Tithymali, Isue Esulæ,
quæ indifferenter ab officis
nis sic appellatur, septem nu-
merantur genera, quorum
masculus Characias, latinis
vallaris appellatur, quod ni-
mirum vallis sepiusq; mus-
nuendis idonea sit, Germani
Wolffemilch vocant.

2.
Mōtosis.

Tithymalus Myrtites, à
foliorum figura denomina-
tur, huius fructum quidam
nucem vocant, & hic scemis-
na æstimatur.

3.
Maritis-
mis.

Tithymalus paralius, id
est Marinus, quod in mari-
timis nascatur.

4.
Ruderis-
bus.

Tithymalus Helioscopius,
hoc est, Solisequus, quod ad
solis cursum circumagitur,
groß wolffemilch.

5.
Campe-
stribus.

Tithymalus Cyparissias,
à cupressi similitudine, Ger-
mani Cypressene wolffemilch.

6.
Petrosis.

Tithymalus Dendroides
à ramorum copia.

7.
Scopus-
lois.

Tithymalus platyophil-
lus, id est, latifolius, à latitu-
dine foliorum, Germani
Breyte blettere Wolffemilch.

Omnia hæc genera Tithy-
malorum, in fine Augusti &
mense

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO.
Sol in Virgine.

menſe Septembri colligen-
da, præſertim quando iucci
ſint extrahendi, nam ut ſu-
pra diximus, quo recentio-
res plantæ hæ colliguntur,
eo deteriores ſiunt iucci,
ideoq; non nili tranſactis ſe-
nis menſibus legendas eſſe
præcipiunt Medici.

LOCVS
Natalis.

SEPTEMBRI,
Sol in Libra.

Hortis.

Hortis et
ſicilib.

In Ida
monte
Troadis
et in Me-
ſenia.

Hortis
ſeritur.

A Brotanum ex Dioſco.
lib. 3. cap. 25. duum
eſt generum, mas &
fœmina, Mas frutex eſt, qui
in arboris ſpeciem candican-
tibus folijs, ſeriphij modò,
exurgit, circum ramulos in-
ciſis, cum odoris grauitate,
Auguſto floret, autumno le-
gendum potiſſimum Sep-
tembri, quo tunc ſemine
prægnans carpitur. Fœmina
non omnibus cognita, ſunt
enim qui abſinthium mari-
num pro eo oſtendunt, alij
Cypreſſum, prior opinio fal-
ſa, poſterior verior eſt, quod
Dioſcoridis verba decla-
rant.

Aſarum, quibuſdam ſyl-
ueſtris Nardus de quo Dioſ.
lib. 1. cap. 9. alij aſarum
Bacchar vulgare eſſe ſcribunt,
Germani baſelwurg / vere &
autumno floret, in fine Au-
guſti & principio Septem-
bris colligitur.

Æthiopis folia, quæ ver-
baſco ſimilia ſunt, per quàm
hiſſuta denſaq; Plinius leſ-
git autumno.

Coriandrum aut corias
non, Germani Coriander /
herba eſt vulgaris noticiæ.

Conyza: officinis pulica-
ria, quia ſubſtrata pulices

H inte-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.	LOCVS Natalis.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.
Locis æditiis, interdū humentibus & agrorum marginibus proueniunt.	interimat ex Diosco. lib. 3. cap. 116. triplex est, maior, minor & media, Germani <i>Gelwurtz</i> oder <i>dürwurtz</i> vocant. parua odore præstantior est, maior verò frutice, altior et folijs latioribus, graui odore, vtriusq; folia nirsuta & pinguia. Medium genus iniucundum, & grauius spirat.	tumno & æstate. Est & pseudodictamnium, ex Diosco. eodem loco duo genera describuntur, primum priori simile, sed minus, quàm illud acre. alterum folijs sisymbrij, ramis maioribus, in quibus flores syluestris origani, nigri molles.	Lathyrus, officinis cataputia minor, quod in pilulis quibusdam, seu potius catapotijs semen ferat, Germanis <i>spring forner</i> / oder <i>treibforner</i> / carpitur autumno, dum fructu prægnans est.
Agriscultis reperitur, colitur etiam in hortis ob purpurei floris odore.	Cyclaminus: vulgò panis porcinus, quibusdam panis, vel vmbilicus aut malum terre, radice constat, rapimodo tuberosa & folijs præstantiore. officinis arthanita, germani <i>Sewbror</i> .	Nascitur locis cultis & sabulosis.	Lupulus Germani <i>hopffen</i> vocant. ex Plinio videtur. lib. 1. cap. 11. esse lupus salicarius, inter sponte nascentia esui apta enumeratus: autumno legitur.
Hortis & agris collitur.	Cannabis satiuæ, planta in marem & fœminam distinguitur, Mas semen profert, sterilis fœmina ad lineos vsus accommodatior. Est & syluestris Cannabis, quam alij Eupatorium vulgi esse, existimarunt.	Horticolitur, & iuxta sepes & vepres nascitur sponte.	Rosmarinus vel Libanotis, ex Diosco. lib. 3. cap. 70. duum est generum, fœcundum nimirum & sterile, fœcundi semen Canchrys vocatur, sterile neq; caulem, neq; florem, neq; semen promit. Est & Rosmarinum Coronariū vocatum, semper virescit, præterquam in raris & extremis gelicidijs, profert caruleos flores, quos Melanthios vocant. Carpuntur Maio mense, & deinde ad Septembris
Syluis & montibus.	Erica, arbuscula bicubitalis, sæpe longè maioris proceritatis, multis à radice stolonibus, bis anno floret, vere & autumno, quo tempore etiam colligenda.		
Herba cretensis.	Dictamnium, aliquibus syluestre pulegium à Diosco. lib. 3. cap. 31. sine flore & semine describitur, metunt au-		

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.	LOCVS Natalis.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.
Nascitur narcissus in mon- tib ⁹ pro- batissim ⁹ suauio- dore.	bris medium, bis enim anno flore, vere & autumnno. Narcissus ex Theoph. lib. 6. cap. 6. folium albuci ter- ra proximum gerit, sed lon- ge latius, lilij modò, habet caulem sine folio herbaceu florem suo ferentem cacu- mine, in membrana veluti vasculo inclusum, large am- plum, coloreq; nigrum, figu- ra oblongum, serotinus ad- modum. post arcturum e- nim & circa æquinoctium flore, Plinius duo genera, lib. 21. cap. 19. Narcissi de- scribit, vnum flore purpureo, alterum herbaceum, Germa- ni zeytlosen vocant. Matthio- lus præter hæc alias complu- res species ostendit.	Hortis vmbro- sisq; lo- cis & se- cus uias sponte nascitur.	Solanum siue Solatrum corruptè, ex Diosco. lib. 4. cap. 61. aliud est hortense, siue esculentum, vulgo her- ba mora, alijs vua morel- la, idque simpliciter Solani voce intelligendum est, Ger- mani Nachtschatten. Secundum est Halicaca- bon, aut phisalida, id est, Vesicaria vocatum, officinæ Alkakengi appellant, Ger- mani nostri, Juden dockle: Juden kirschen / oder Rott nachtschatten / quod non ni- si autumnno maturescit. Est præterea aliud genus Vesica- riæ, siue Hali cacabi, quod Fuchsius peregrinum, Ger- mani Welsch schluten / vo- cant. Franciscus Apollo, vir eruditione insignis, Balsa- minam, aut viticellam esse ostendit, ab alijs Hierosolo- mitanum pomum vocatur, folijs quali vitis, flore can- dido, vesicis halicacabi ver- rucosis, &c. Tertium habetur Sola- num somnificum, ab effectu denominatum, nempe dor- mitorium. H 2 Quar-
In hortis seritur spectadi potius q̃ quæstus gratia.	Ricinus, latinis cici, aut croton græcè, vulgo catapu- tia maior. Arabibus Cher- ua, ex Diosco. lib. 4. cap. 142. nomen accepit à ricini ani- malis similitudine. plebis ceca vocatur, cui cibus nul- lus est exitus, nullis discre- tum membris, colore liuido in globum continuè crescens, nec prius à suctu recedens, vbi animalium dorso nhære- scit, nisi antea disrumpatur, & sponte decidat.	Saxosis nec pro- cul à ma- ri locis.	

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

SEPTEMBRI,
Sol in Libra.

Monta-
nis ac vé-
to perfla-
tis locis
nascitur.
In arbo-
rib⁹ quer-
cinis.

Quantum Solanum Ma-
nicon, siue furiosum dicitur,
folio erucæ simile, maius ta-
men, satis ad spinam, quam
Pederota vocant accedens.
Viscum optimum est quer-
cinum, decerpitur autumn-
initio cum suis acinis, Ger-
mani Nischel vocant.

LOCVS
Natalis.

OCTOBRI, SOL
in Scorpione.

HAstenus eo progressi
sumus, ut herbarum
vires, quò nimirum
tempore vigent, & colligun-
tur ad vsum medicum, con-
spicue fierent studiosis. Nunc
cum in Octobri Sol in Scor-
pionem ingrediatur, quo tẽ-
pore pleraq; ad ruinam de-
fluere solent, paucis exceptis
quibus folia non decidunt,
natura nos hic aliquandiu
in colligendis desistere &
quiescere iubet, estq; hoc tẽ-
pus Brumale omnino incli-
nanti atati conferendum,
quod non sentiat amplius
gaudia annorum. Sed non
immerito posset, quis cau-
sam commutationis quære-
re, an fortassis quod folia
sint tenuia, lata & mollia,
vel forsitan id fieri occulta
aliqua qualitate, ut Timeus
Mathematicus sensit, aëris
veneno & fideris qualitate,
cum Sol scorpionem ingre-
diatur. Verum cur non ea-
dem causa aduersum omnes
polleat, iure miramur, cadūt
enim plurimis autumn-
quædam ocys aut tardius
amittunt, atque in hyemes
prorogant moras.

Nec interest maturius ger-
minasse, ut pote cum quæ-
dam

27

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

dam primò germinent, & inter nouissimas nudentur, ut Amygdalæ, fraxini, Sambuci. Morus autem nouissimè germinat, & cum primis folia dimittit, magna & vis soli, prius decidunt in siccis macrisq; & vetustæ prius arbori, multis etiam, antequàm maturescant fructus. In Scythia ficu, & hyberna pyro, & malo granata, est pomum tantum aspici in matre, neq; his semper retinet, comas eadem folia durant, sed subnascentibus alijs tum arescunt, quod euenit circa solstitium. Nec præterea ista commutatio annua adscribenda erit duntaxat frigori, gratia cuius calor cum spiritu & humore, quorum est comes intro repellitur in profundum, forisq; cutis spiracula adstringit, calorisq; substantiam cogit, & ita coercet, ut nihil aut minimum possit effluere, siquidem folia in quibusdam, media æstate, aut statim post germinationem decidunt. Cur verò frigore non pereant, folia arborum quædam, & herbarum ne hodie sapientia professoribus id cõtat. Eth quidam non decidere, nec arescere folia in arboribus putant, cum callo sint crassa & angusta, ceu hædera muralis,

uinca peruinca, Buxus & similia aut quorum foliorum succus pinguior est, verum neutra ratio mihi placet. Quis enim in Ilice, Abiete et Larice potest intelligere causam? Quidam inuitantis cœli voluptatem, aut etiam soli vbertatem, fertilitatemq; respiciunt, veluti circa Memphis in Ægypto, quæ hodie Alkyra dicitur. præterea in Elephantina Thebaida, tanta vtrorumq; locorum vis est, tanta cœli clementia, ut nulli arbori, ne vitibus folia quidem decidant, Sed ne his quidem concedimus. In Germania enim & locis Septentrionalibus, licet nullam talem fertilitatem videmus, nihilominus arbores quædam perpetuo virescunt, frigusq; nõ abhorrent. Quid non laudatius Germaniæ nostræ pabulis? licet subest statim harena tenuissimo cespitem corio testæ. Nec itaq; semper proceritas herbarum vbi aquosum & pingue est solum.

Proinde cum nulla probabilis ratio eorum, quæ sensui sunt conspicua, reddi aut demonstrari potest, satius erit, omissa terrestri cura, naturæ illud duntaxat occultæ adscribemus, natura enim uim miraculum sui, atque

H 3 tellus

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

tellus ostendere voluit, quæ
cuilibet in ipsa propagatio-
ne ad mensuram caloris in-
nati dedit, ratione cuius vi-
tam longius aut brevius du-
cere potest, de quibus apud
Aristotilem in libro de lon-
gitudine, & breuitate vitæ di-
sputatur, quæ nos hîc, cum
ad institutum nostrum pa-
rum conferre videantur, præ-
teribimus.

LOCVS
Natalis.

OCTOBRI, SOL
in Scorpione.

QVOTEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS

Natalis.

NOVEMBRI,

Sol in Sagitario.

Lauri folia decerpuntur,
vna cum baccis autumnō, &
hyemis principio.

LOCVS

Natalis.

DECEMBER,

Sol in Capricorno.

IANVARIO

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

FORMA
Coloris.

IANVARIO,
Sol in Aquario.

COLOR.

FEBRVARIO,
Sol in Piscibus.

Cadidos
flores ha
bet.

A Mygdala, iuxta Plini
um lib. 16. cap. 25. in
Egypto omnium pri
mo floret, mense nimirum
Ianuario, Martio vero po
stimum maturat.

Purpurei
mixti cu
candore.
Flos cro
ci modò
erumpit,
nullis ad
huc ap
parenti
b^o folijs.

E Rica in tepidioribus los
cis, primò inter sylues
itres herbas floret, in
frigidioribus autem mense
Martio.

Hermodyli ueri, flores
erumpunt Februario, & pri
mo statim vere, alio tempo
re & itaru cœli clementiori,
post exitum autumni.

MARTIO

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO	MARTIO, SOL	COLO	MARTIO, SOL
res.	in Ariete.	res.	in Ariete.
Cádidos flores ha bet.	B Vibus sylvestris, Ger mani feldt zwibel / in Martio flos erumpit, ac statim evanescit.	Cerulei.	curvatur, perduratq; diu an tequam contabescat.
Purpus rei.	Ellebori nigri hortensis, Germ: schwarz garten nieß wurtz/locis videlicet Septen trionalibus apparent, non priusquam Martio flores.	Subcan didi, aut subpalli di.	Hyacinthi secundi maio ris.
Candidi	Ellebori nigri sylvestris, wild schwarz nießwurtz.	Floribus paruis ac herbaceis	Hyacinthi minoris, Ger mani omnes Mertzzenblumen vocat.
Herba ceis.	Ellebori herbacei, cuius magna est copia in nostris montibus Halæ Suzuorum cum floribus.	Purpurei	Hyacinthi albi, siue palli di flores.
Cádidos	Elleborus albus, weiß nießwurtz/ flores habet.	Floribus purpu reis.	Iuniperus perpetui viro ris, floret in fine mensis.
Flores in cacumini ne albica tes nume rosos, in stellæ mo dum sese pandens tes.	Hastula Regia, quam la tini Albulcum, siue Aspho delon vocant folijs maio ris porri: caule lævi ferente in cacumine florem quem Anthericon appellant, floret particulatim, ut Scylla ab i mo incipiens, verbasci quo que modn. Radicibus niti tur numerosis, nigricantibus & bulbosis, Plinius colli git flores Martio: lib. 21. cap. 17.	Flores ha bent la nugino sos, & quasi nu camento compa ctos.	Laricis flores ineunte Martio è frondium cacumini ne mira elegantiq; naturæ industria comantibus folio lis annexis micant, etsi quis dam nullo exhilarari flore putant.
Ceruleos	Hyacinthus primus flo res habet maximos, floret cum violis circa finem Mar tij & Aprilis initium, qui maturefcens ad terram in		Petasites, quam Matthio lus pro Tussilagine maiori pingit, floret circa finem Martij.
			Salix vulgò nota, Germa ni weiden oder selbinger / flo res Galenus lib. 6. simpl. med. multis verbis com mendat, ad exiccantis em plastri preparationem: est es nim vis eorum ita desicca toria, ut morsu abstineat, ha bent verò etiam quandam adstrictionem, & C. Theop I phrast.

COLO. MARTIO, SOL COLO. MARTIO, SOL

res.

in Ariete.

phrast. lib. 3. cap. 13. hist. plant. tria genera Salicis describit. Nigram, quod cortice nigro sit obducta, hanc Plinius lib. 16. cap. 27. Viminalem vocat, Columella vero Sabinam & Amerinam appellat, Germani Rotweiden. Secunda, Salix candida, à Plinio, Vitellina, Columella autem Græca, Germanis, gel weiden vocatur. Tertia à Theoph. Helix, à Plinio, Columella, Gallica appellatur, Germani Flein weiden.

Flos virgata specie in luteo candido pro filit, floresque ab imo.

Flores habet luteos.

Violacei.

Candidi.

Carulei.

Purpurei.

Lutei.

Scylla ter anno floret, Theoph. autore lib. 7. cap. 12. triaque tempora sationum ostendit, ut testatur Plinius lib. 21. cap. 17. Est hoc tempus primum sationis.

Tussilaginis floret usque ad principium Aprilis, quo de hinc tempore evanescit.

Viola Martiane siue purpurea.

Viola alba, Leucorj dicti vulgaris notitie, sed in floribus differentia quædam invenitur.

Verum illud animadvertendum, quod luteæ viola, Mauritani Cheiri, siue Alcheiri appellant, & deinde

res.

in Ariete.

purpurei, non nisi Aprili & Maio mensibus florere incipiant.

Vitex, siue lygos, frutex est in arborem assurgens, folia aliæ, sed molliora habet, dum generum ex Diosco. lib. 1. cap. 116. notatur, ex differentia florum. Germani viticem Schaffmullen vocant.

Vna flore mittit album cum purpureo altera tantum purpureum florem habet.

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO res.	APRILI, SOL in Tauro.	COLO res.	APRILI, SOL in Tauro.
Cáddos ut sape florere vi dimus in horto il lustrissi moru co mitu de Hohéloe	A Vrantia poma, quibus dam aurentia, fulgo ris auri plena, ideo au rea nuncupata, aut verius ab Arantia oppido Achaia, ut ex Hermolao 5. sui corolla rij. cap. 422. apparet. Germa ni Pommerantzén vocant, flores habet fragrantissi mos.	intrinse c ^o lutei. Purpu reos os tendit. Purpu rei. Aurei. Purpu rei. Cáddos	pitunt & per aestatem durant fere integram. Clematides, Daphnoidis latinis vnica peruinca flo res. Cneoron, Matthioli. Chelidonij minoris, siue Scrophularia minoris. Daphnoidis zeytlandt. Fumaria, quæ olim à D. Fuchfio pistolochia nomi nabatur. Geranij primi flores Geranium candidis flori bus. Hedera terrestris, flores pusilli. Limoniarum, Lemonien blúst. Pulsatila flores legimus, quàm plures iuxta Cocha rim flumen impetuosissi mū, non procul ab oppido Ingelfingen dicto, mense Aprili.
Profert flores cá ddos fra grantif mos.	Adami poma, alijs Lumia, vel cedriata vocantur, her baceo virentia colore & pre grandia instar melonum vel orbiculata, aut oblonga fa cie turgentia, vel ouali specie turbinata.	Purpu rei. Candidi Purpu rei. Candidi. Purpurei ex nigro splendēt, in cuius medio aurei flo sculi emi cant.	
Candidi. Purpurei	Amygdalarum dulcium. Amygdalarum amara rum,		Primulaueris, siue verba sculum, alijs Phlomides. Ruellio Brachecuculus, herbarijs Arthritica, Germa nis Schlüsselblumen / cuius duo sunt genera.
Purpurei Cáddis floribus.	Asari flores. Armeniaca, quæ & Chry somela, id est aurea mala, ex Athenæo lib. 3. cap. 5. lati nis præcotia dicta sunt, hæc vna cum alijs horæis fru ctibus Aprili mense flo rent.	Unū flo rib ^o lute is odora tis. Alte rū palle scētibus odore de stitutis.	
Cáddis.	Allium vrsinum, floribus in summo.		
Cáddis.	Agrostis siue gramen, in fine mensis incipiunt florere, & per mensem durant se quentem floribus.		
Extrinse c ^o rubei,	Bellis minoris satini Ger mani Monar blümle / inci		

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	APRILI, SOL in Tauro.	COLO- res.	MAIO, SOL in Geminis.
Candidi	Prunorum sylvestriū flores, quos Germani <i>schlehen</i> appellant.	Cādidos Aurei.	A llaria flores habet. Anguria, hetruscis cucumis, alijs melo palestinus. ex Serapione Dulla ha, id est, melo magnus, Germanis Cucumern. cuius flores Maio apparent.
Purpurei	Perficæ arboris flores, germani <i>Pfirsingblüß</i> vocant.	Aurei.	Anagallis mas.
Lutei.	Ranunculi hortensis primi, ungefülter garten hanen süß.	Punicei.	Anagallis fœmina.
Candidi	Rorismarini siue Libanotis.	Candidi	Aparine.
Ex cādido pallescentes	Ribes, Joannes berle blüß.	Candidi	Alparagi.
Candidi	Siliquarum flores, Joannes bierblüß / græcè Ceratia. alijs ceratonia, quibusdam Xylocaracta, alijs Carobe dicitur, flores sunt.	Aureo Chrysanthemi modo.	Aconitum Dioscoridis, Theophrasti, & Plinij, flores apparet.
Floribus candidatibus.	Vua Crispa, vulgo spineola, Germanis <i>Eloster ber</i> / veris initio statim pubescit, frutice ramulis pluribus aculeato, horridis spinarum mucronibus folijs circinata rotunditatis apij instar discissis, duum est generum mas & fœmina.	Carulei.	Aquilegiæ flores violacei, siue carulei sunt, ex caudis quibusdam, veluti muliebres loci propendentes.
Flos caruleus albus et luteus apparet.	Viola trinitatis incipit florere, & per integram æstatem durat, Germani <i>Dreyfaltigfalt blümen</i> .	Candidi	Allij Hortensis, gartenfnobisch.
		Purpurei	Allij sylvestris, tam primi quam secundi speciei.
		Candidi	Alleluia, siue Trifolij acetosi.
		Purpurei	Anemonis sativi, primæ & secundæ speciei flores.
		Albi.	Anemonis tertie speciei.
		Aurei.	Anemonis quartæ speciei.
		Extrinsecus albi, intrinsecus lutei.	Bellis maioris, groß genß blümen / flores chamomillæ modò profert.
		Purpurei	Betonice purpureæ.
		Flores utriusque purpurei	Bistorta tam mas quam fœmina. Germani <i>Wasserwurtz</i> / falso serpentaria dicitur.

Barba

QVO TEMPORE ELORES COLLIGENDI.

COLO- res.	MAIO, SOK in Geminis.	COLO- reis.	MAIO, SOL in Geminis.
Flore au- reo.	Barba hirci, græcis Trago- pogon, Germani Bochebart/ duum est generum, vnum, flos auri modò fulget, alte- rum purpureos, radiantibus circumquaq; calycis apici- bus.	Aurei.	Chrysantemi flores splen- dent.
Flore pur- pureo.	Betula iulos profert ob- longos, in quibus hæret flos.	Candidi.	Erucæ sylvestris, wilde senfft blüß.
Herbas ceus.	Bulbus sylvestris florem ostendit.	Luteis.	Erigeron, floret tota ferè æstate floribus.
Câdidû.	Caryophyllata sylvestris, Benedict wurtz / florem pro- fert.	Câdidis	Euonimus arbor siue fru- tex, Germani Hanenbôdle / floret vere floribus.
Puniceû	Consolidæ mediæ, gulden güngel / mixtum colorem.	albæ vio- læ colore similibus, odore in- festo.	Fumariæ flores. Purpurei.
Ex pur- pura cæ- ruleum.	Coluthea spectatissime floret, circa finem mentis floribus.	Rotundi	Fagus arbor, Germ. buch- baum / cuius flores apparent.
Luteis.	Cerasorum hortensium et sylvestrium omnium flores.	Echina- cei & her- bacei.	Fraxinus arbor, Germani Eßhabaum / habet flores.
Candidi	Cydonæ arboris flores mixtus.	Câdidos	Geranium, 2. 3. & 4. Ger- mani Storchschnabel blümen.
Ex albo & purp:	Corni maris & fœminæ flores.	Purpu- reos flo- res osten- dunt.	Gingidium flores in vm- bella.
Albi ra- cemosi.	Cercfolium florem osten- dit.	Lutei.	Genesta, genest / flores.
Câdidû.	Chamedrys vtraque tam mas quam fœmina flores.	Lutei.	Genestella, Germ. Streich blümen / frutex rosmarini pes- nè folijs est, at rigidis ac pun- gentibus, femine, flore, ac radice genestæ, flores diu ap- parent.
Purpu- reos.	Chelidoni j maioris.	Lutei.	Isatis sativa floribus.
Aurei.	Citriorum.	Subflavi	Isatis sylvestris, Maio & Iunio apparet.
Snbpurp:	Crespini flores, officinis	Siquidè	Iris Domestica, à cœlestis arcus similitudine nomè ac- cepit, flores in summitate in- curui uarij. Germani Blaw- gilgen blümen vocant.
Lutei ra- cematim coheren- tes in v-	Berberorum, Germani saw- rach, oder sawerdoin / vel Ba- berblüt / odore non ingrato flores.	candidi,	Iris
uæ ferè modum.		pallêres, lutei pur- purei ac cœrulei côspici- untur.	

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLOMAIO, SOL	COLOIUNIO, SOL
res. in Geminis.	res. in Cancro.
catus wüntenbergenſis, præterea ſatis magnitudine floret, menſe Maio floribus.	Crocei vel poti⁹ ſubſtanti.
Scabioſa, Maio Iunio ad Octobrem uſq; floreſcit.	A Bietis flores, Germani Tannenblüſt/ apparent circa ſolſtitium æſtiale, Plinio atteſtante lib. 17. cap. 26. noſtro Climate conſpeximus menſe Maio.
Carulei.	Abſinthij, Seriphij flores.
Lutei.	Abſinthij Santonici.
Aurei.	Abſinthij pontici.
Rofaceis floribus.	Altea id eſt, malua ſylueſtris, florēt vltra menſem integrum.
Subrubro.	Aphace flore,
Puniceis.	Anagallis vtraq; tam mas quam fœmina floribus.
Aurei.	Acorus ſylueſtris, Germani gelb ſchwertelblümen.
Cãdidis.	Acantha vera, Germani Welfch bern fleet/ latini Brancam vſinam vocant, floribus decorata eſt.
Subluteis.	Ariſtolochia tam longa quam rotanda.
Cãdidi.	Aſphodeli, ſue haſtula regie, flores ab imo incipiunt.
Lutei.	Attriplex, vtraq; hortenſis & ſylueſtris.
Aurei.	Anguriarum.
Purpurei.	Betonica.
Cãdidi.	Batti ſue Rubi Idei, qui à monte videlicet Ida ſic denominantur, flores primo rubefcunt, deinde apparent.
& racemofi.	Bryonia,

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.	COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.
Candidi. Pallidi.	Barba capri. Bryonia, racematim co- herent, & in stellæ modum radiant.	Luteis.	Cucumer sativus floret, particulatim floribus.
Aurei. Extrinse- cus albis, intrinsic- cus luteis	Balsaminæ siue viticellæ. Chamomillæ, à summo florere incipit. ex Dioslib. 3. cap. 131. trium est generum flore tantum distantium. primum Herantemon vo- cant, quam consolidam Re- galem existimat Fuchsius, Matthiolum hanc cumini syl- vestris speciem. alterum ge- nus Leucanthemon dicitur, alio nomine Camilla, quo- rum sane vnicus vsus est in officinis. Tertium chrysan- themum appellatur.	Aureis.	Cucumer sylvestris flori- bus.
	Calendula siue Caltha, Germani Ringelblumen/ flo- ret singulis ferè mensium cas- lendis Maio incipiente, Au- tumno autem magis appa- rent.	Lutei. Subpur- purei. Cerulei.	Coronopi flores spicati & Ciceris sativi flores diu ap- parent, similiter & sylvestres. Chamedrys vtraq; tam mas quam femina.
Aurei.		Cerulei flores.	Chondrylla, quam aliqui cichoreon, alij serin appel- lant, duum est generum, v- num caulem flores, & folia habet cichoreo similia, qua ex causa quidam sylvestris Intybi speciem esse dixe- runt. Germani Sonnen wir- bele. Alterum à lactis yberta- te, præsertim à radice, qua redundat, lacti folia seu lacti folia appellatur.
		Lutei flo- res.	Centum morbia, siue nu- mularia.
		Aurei.	Chamecy parissi, quam quidam pro abrotano fe- mina ponunt, Germani Cy- pres/ flores habet.
Candidi. Cerulei. Ceruleis	Carei. Cinoglossæ. Cyanus maior & minor floret.	Aureos.	Chamecyssi.
Câdidis & mu- scosis.	Cypros græcè, Ligustrum latinis, floret in eunte æstate.	Câdidi. Aurei. Câdidi.	Chamepytis primæ. Chamepytis secundæ.
Cerulei. Purpurei	Centaurei maioris. Cetauri minoris, Mesues æstatis initio florem colligit, nos vero Augusto & autum- no mensibus.	Lutei. Purpurei Purpurei	Chamepytis tertiæ. Chamaelonis nigri. Dipsaci Iunio & Iulio mensibus.
		Câdidi. Purpurei Purpurei	Dauci genera flores. Echij. Eringij, flores apparent post

QVO TEMPORE ELORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.	COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.
	post solstitium Cancri, circa finem fere Iunij.	Candidi.	Lepidium, Iberis Damo- crati appellata.
Purpu- reum.	Eruum rufum ostendit flore[m].	Candidi.	Lithospermi.
Subpur- pureum.	Eruum pallidum: ambo hac diutius florent, quam frumenta.	Purpurei	Lifimachia purpurea.
Cadidos	Erithrodanum fatium et syluestre flores habet.	Lutei.	Limaschia lutea, Iunio & Iulio mensibus florent.
Lutei.	Eupatorium, Dios. floret ab imo, & durat per mensem Iunium & Iulium.	Candidi	Laserpitij germanici flo- res.
Candidi	Epithymi.	instara- mili.	
Candidi	Filipendula, siue Oenan- tha.	Purpu- reis.	Lauendula, alias pseudo- nardus, floret Iunio & Iulio mensibus.
Purpu- reos.	Gentiana, utraq; flores profert.	Subpur- Lutei.	Malu insania.
Subpur- Purpurei	Gratiola oblongi flores & Geranij quinti.		Melissa duorum generum, vnum floribus luteis, alte- rum floribus purpureis.
Lutei.	Hepthaphylli.	Aureis.	Melissa citrigo floribus.
Caru- leos.	Intybus siue feris horten- sis flores profert Iunio & Iu- lio. Intybus syluestris, cuius duz sunt species, prima Ci- chorea, Germani Wegwar- ten / incipiunt particulatim florere & durant vsq; in au- tumnus: altera species syl- uestris, folio est latiore.	Ceruleis.	Melanthium siue Gith of- ficinis Nigella, nomen a se- mine nactum, floribus.
Carulei.	Imperatorie flores.	Purpu- reis.	Melanthium floribus,
Cadidi.	Lolium.	Luteis	Melanthium citrium.
Subpur- purei,	Lilij albi, nec vlli florum maior excelitas, interdum trium cubitorum conspicitur (si videlicet flos cum sti- pite mensuretur.)	floribus.	Melanthium syluestre flo- ribus.
Candidi.	Limonij veri.	Purpu- reis.	Pseudomelanthium, quod Germani vocant Kotteln.
		Punicei aut sub- purpurei	Morus arbor floret non prius nisi exacto frigore, ob id sapientissima arborum dicta est a veteribus flores habet.
		Cadidos purpure- os & az- tros.	Meliloti veri Iunio & Iu- lio mensibus.
		Melini.	Meliloti vulgaris.
		Lutei,	

K Melo-

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.	COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.
Lutei.	Melonum.	Pallidi.	Pentaphyllum, siue quin- que folium latinis, flores.
Candidi.	Marrubij nigri foetidi.	Sublutei.	Periclymeni flores mixti, nempe candidi & lutei, vel
Câdidis.	Nymphaea floribus.	Câdidis	Pſylium primum & secū- dum floribus.
Aureis.	Nymphaea floribus.	& lanu- ginosis.	
Câdidis.	Nasturtium satiuum.	Câdidi.	Pyrola flores in Capilla- mentis.
Câdidis.	Nasturtium syluestre primū.	Rosei pu- nicei &	Rosarum differentias per- sequitur, Plin. lib. 21. cap. 4.
Purpus reis.	Nasturtium syluestre secun- dum.	Albi: om- nes hi flo- res decer- pendi, cū non pla- nè expli- cati vi- suntur, ceu etiā capparū.	q̄ differunt multitudine fo- liorum asperitate, leuore, co- lore, & odore, paucissima quina folia ac deinde nume- rosiora. Est & Rosa in cam- pania Italiae quam Centifolia vocat. praestantissima sunt rosa, quae puniceo colo- re rubent, proxima laus ijs, quae in rufum candicant, vi- lissima candicantes.
Purpu- reis.	Orminum tam satiuum quam syluestre floribus.	Purpurei	Rapunculi, in principio mensis flores apparent.
Câdidis.	Orcoselinum gracè, Apriū montanum latine floribus.	Albis me- dioluteis	Solanum hortense tota æ- state floret, floribus paruis.
Câdidis.	Oxyacantha Matthioli, latinis acuta spina, Germa- nis bagendorn/floribus.	Candidi.	Solani halicacabi, officii- nis Alkakengi.
Câdidi, & race- matim coherēt.	Olex flores omnes tam fa- tues quàm syluestres, mense Iunij apparent.	Subrubei	Solani somniferi.
Candidi	Plantaginis aquaticæ.	Ex câdi- do lute- scentes.	Solani peregrini.
Lutei.	Plantaginis maioris flores in spica coherant.	Carulei.	Sij siue Iaueris, Germani Bachmuntz/flores.
Pallidi.	Plantaginis minoris.	Echinos	Spina alba Fuchſij, latinis carduus Maria, Germanis ſechdiſſel flores habet.
Intus luz- tei, extus albi.	Parthenium Fuchſij, quod nos supra pro Matricaria ſyl- uestri posuimus, Germ: wildt Chamillen/oder froendill.	et purpu- reos.	Scorea
Extrinse- cus albi, intrinse- cus lutei.	Parthenium satiuum, ger- mani Mertram / latinis Ma- tricaria diu flores apparent.		
Candidi et lutei.	Peponum flores.		
Ex purp- caruleo,	Ptormicæ, siue sternumen- tariae Germ: wiß Bertram.		
Lutei.	Pilosellæ maioris flores.		
Aurei.	Pilosellæ minoris.		
	Pes Leonis, Matthiolus stellaria dicta.		

QVO TEMPORE ELORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.	COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.
Flores purpurei coloris.	Scorlea, floribus in caule secundum folia, per interual- la prodeuntibus, ab Ormino fatiuo Fuchij distans.	Aurei. Lutei. Subrubei	Sanctæ Barbaræ. Sargi. Scordij flores parui appa- rent, & Stachados.
Câdidis in umbel- la.	Sanibucus hortensis, syl- uestris & aquaticus, floribus gaudent omnes.	Subcæ- rulei. Câdidis.	Struthium, floret Iunio & Iulio mensibus grato aspe- ctu floribus.
Purpu- reos.	Serpentaria maior alias Dracunculus maior flores habet.	Lutei. Lutei. Albi.	Staphisagritæ. Sesalis Mafsiliensis. Sagittæ maioris & mino- ris.
Purpu- reos.	Serpentaria minor, alias dracunculus minor.	Candidi.	Saracenici frumenti, Cer- mani Heydel vocant, fru- mentum hoc copiosissime nascitur & colitur, in mea patria Forcheim, flores diu apparent.
Flores purpurei & echi- nati.	Scolymi flos erumpit He- fido lib 2. de opere & die te- ste Solstitio æstiuâli. in Ger- mania verò mense Iulio. & quo tempore floret, aliud concipit, aliud parturit, de quo vide Plinium.	Flos in luteo câ- didus.	Scyllæ flores, secundum sationis tempus nunc osten- dunt, Plinio autore lib. 21. cap. 17.
Purpu- rei.	Saluæ maioris & mino- ris flores spicati Iunio & Iu- lio mensibus apparent.	Ruffi.	Terebinthi flores racema- tim coherant, ut in oleis ve- rum apparent.
Purpu- reis, can- dore mi- xti.	Serpillum hortense & syl- uestre, utrunq; ornatur flo- ribus.	Subfla- uis.	Tilia fœmina floret cum urbanis arboribus floribus.
Luteis.	Sinapi hortense floribus.	Rubeis.	Trifolij pratensis floribus.
Câdidis.	Sinapi hortense floribus.	Subrubei et cand.	Trifolij pratensis secundi.
Aureum.	Sonchus aspera & leuis florem habet.	Câdidis.	Trifolij pratensis tertij, cū floribus duntaxat.
Purpurei	Sideritis, Iunio mense flo- rere incipit, nec desinit nisi in autumni fine.	Lutei.	Turcici frumenti. 1.
Purpurei & punic.	Spatula foetida.	Candidi.	Turcici frumenti. 2.
Ceruleis.	Scabiosa omnes micant floribus.	Purpurei	Turcici frumenti. 3.
Candidi.	Saxifraga albæ.		K 2 Thymi

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.	COLO- res.	IVLIO, SOL in Leone.
Cādidos purpura mixtos.	Thymi, circa solstitium cancri, flores legimus.	Rosacei.	A ltea, id est, malua syl- uestris.
Cerulei.	Teucrion Fuchsi, Germa- ni gross Battengel.	Rosacei.	Althea officinis, bis malua.
Cādidis.	Vitis vinifera, floret circa solstitium cancri, floribus odoratis.	Lutei.	Anethi.
Purpurei	Veronica maris.	Candidi.	Anisi.
Lutei	Veronica femina mixti.	Aurei.	Ascyri flores.
purpura- scentes.		purpu- reis.	Amarantus floribus.
In pur- pura ru- bescētes.	Vitis Wicken/floret Maio & Iunio mensibus, quæ lon- gè differunt ab Aphacis.	Luteis.	Amarantus floribus.
	Viola Trinitatis, de qui- bus & supra diximus, no- men à floribus desumptum est, sunt enim superius pur- purei, in medio candidi, in- ferius verò lutei, aspectu gra- tissimo, nullo odore, ab ali- quibus lacea dicta.	Cādidis	Anonis, siue ononis, alijs Restabouis, quod altis du- risq; radicibus aratorum, me- dijs insuleis remoretur, Iu- lio & Augusto mensibus flo- ret, prima species floribus.
		Luteos.	Anonis, secunda species flores habet.
		Purpu- reis qui apparent	Anonis tertia species, flo- ribus omnes hæ mense Apris li è veteri, aculeato caudice regerminant, mox sublimes quosdam ramulos spinis viri- dibus rigentes emittunt, in- fra autem thyrsulos acu- leos producentes, qui autum- no firmioribus spiculis per- ficiuntur.
		Iulio & Augusto mensib ⁹ .	Angelica sativa.
		Candidi	Angelica syluestris.
		Purpurei	Apij palustris siue Eleose- lini.
		Candidi	Absinthij pontici.
		Aurei.	Arbuti flores racematim dependent, floribus candi- dis, paruis lilij conuallij vo- cati figura.
		Cādidis.	

Attra-

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVLIO, SOL in Leone.	COLO- reis.	IVLIO, SOL in Leone.
Pallidi.	Attractylis, hirsutior & hortensis vulgo Cardobene dictus.	Subrubei	Cannabis.
Purpurei	Anchusa, cuius aliquot species obseruentur, Germani vocant rot ochsenzungen/ omne genus in toto ferè caule purpureos explicat flores, à vulgari Buglossò non dissimiles.	Candidi	Coriandri.
Ceruleos	Buglossum magnum, Borago dicta flores habet.	Candidi	Cicutæ.
Purpurei aut subrubetes.	Buglossi, vulgaris primi flores ostendit.	Aurei.	Cnici.
Nigriantes flores.	Buglossum vulgare secundum.	Cerulei.	Cruciata.
Purpurei	Bliti flores.	Candidi.	Ceparum.
Lutei.	Botris.	Purpurei	Campanulæ.
Purpurei et candidi.	Cyani seu fabæ flores durant quadraginta dies.	Purpurei	Calaminthæ Dioscoridis.
Purpurei	Ciceris nigri.	Purpurei	Calaminthæ montanæ,
Candidi	Cucurbitæ flores, statim in principio Iulij & circa finem Iunij mensis apparent.	rufescentes.	cuius tres sunt species, iuxta
Lutei.	Colocynthidis.	Candidi	florum colores, de quibus
Subpurpurei	Citreorum, Germani Citrinat blüß/calathi effigie capillamentis, quibusdam è medio emergentibus, apparent.	Candidi	postea in Gattaria dicemus.
dim ^o in horto illustri.		Candidi.	Chamelex, alij Mezereon.
comitū de Hohenloe.			Cuscutæ.
Purpurei	Cardiaca flores mixti.		Capparum, flores muria
candidi.			asseruandi, antequam se explicent.
		Purpureos.	Chameleon, albus flores
		Luteis.	profert.
		Subpurpurei.	Digitalis lutea floribus.
		Aurei.	Digitalis purpurea.
		Lutei.	Dictamni albi.
		Pallidi.	Elenij circa finem mensis.
		Lutei.	Erysimi.
			Eruce satiuæ.
			Eruce sylvestris, diu apparent.
		Subpurpurei.	Elxine, id est, parietariæ.
		Candidi	Fœni græci.
		Lutei.	Fœniculi.
		Purpurei.	Gattaria prima, Germani
			fatzen nep oder müntz. alio
			nomine Calamentha, floribus.
		Luteis.	Gattaria secunda floribus.

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.	COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.
Albis flo- ribus.	Gattaria seu Nepeta tertia species floribus pulegio si- milis.	Candidi.	Ocymi maioris.
Lutei.	Gnaphalij.	Candidi	Ocymi minoris, flores diu- tissime durant, incipiunt au- tem ab imo, & particulatim florent. legendi flores ante caniculæ ortum.
Cerulei.	Glyzerica.	Candidi	Ocymi Caryophyllati
Ceruleis	Geranium sextum cū flo- ribus.	Purpurei	Organi flores mixti, nempe.
Aureo, li- lij facie.	Hemerocallis, Germanis Heidnisch lilien/flore.	cadescentes.	Personatia, siue arcion, of- ficinis Lappa maior, folia habet cucurbitæ maiora ta- men, hirsutiora, nigriora & crassiora, caulem albican- tem, quanquam interdum vidua caule reperiatur. flo- rem ostendit mense Iulio in capite echinato, Germani vocant groß fletten fraut.
Purpurei	Hyslopi.	Purpu- reum.	Personatia minor, folijs minoribus, mollioribus & mitioribus aculeis, alba qua- dam lanugine circum qua- dam obductis extat. hanc Plinius lib. 25. cap. 9. persolatam vocat, quæ minoribus est echinatis capitulis, cū flore.
Aurei.	Hypericonis: Sanct Joann- es blumen.	Purpu- reo.	Perfoliata flores gerit, è capitulis quibusdam prode- untes, & in stella modum ra- diantes foliosos, odore non ingrato, floret Iulio.
Sublutei.	Hyposelinum, Germanis Libstuckel.	Aureos.	Petroselini vulgaris, id est, appij hortensis, Germani Peterle fraut/florem gerit Iu- lio & Augusto.
Candidi.	Helxine Cissampeli.	Album.	Pseuda-
Candidi.	Hyosciami albi, flores sunt.		
Lutei.	Hyosciami flau.		
Purpurei	Hyosciami nigri.		
Floribus	Lichnis, cuius flos æstas tem primo nunciat, ut testa- tur Plinius, ceu viola alba & purpurea: huius variaz sunt species, aliz enim sunt.		
rosaceis			
vel pur-			
pureis			
vel can-			
didis.			
Lutei.	Linaria.		
purp. cad	Lentis satiuæ.		
Sublutei.	Lathyrus.		
Sublutei.	Lauri arboris muscosi, &		
Cerulei.	Lini flores vulgo noti, nepe		
Candidi.	Millefolij.		
Candidi.	Maioranæ.		
Purpurei	Maluæ hortensis.		
Purpurei	Marrubij siue præsij, ver- ticillato ambitu asperi, Ger- manis, schwarz endorn.		
Lutei.	Nardi celtici.		

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLORES.	IULIO, SOL in Leone.	COLORES.	IULIO, SOL in Leone.
Punicei.	Pseudapij flores sunt odorati racematim coherentes, quibus flaccescentibus siliquula oriuntur, in quibus semen concluditur, Germani vocant Erdnuß/ Erdseygen/ floret Iunio mense, & principio Iulij. hoc pseudapium longè differt à vero Apio Dios. lib. 4. cap. 170.	Candidi.	Pastinaca minoris.
Albis.	Petroselinum macedonicum floribus.	Lutei.	Pastinaca erraticæ.
Lutei.	Portulacæ domesticæ.	Candidi.	Phu magni, id est, Valeriana, Germani groß Baldian.
Sublutei.	Portulacæ sylvestris.	& subpurpurei.	Pseudonardi maris, Germani, spicanardi blümen.
Rosacei.	Papaveris sativi.	Cerulei.	Pseudonardi foemina/ Lauder.
Lutei.	Peucedani.	Cerulei.	Rutæ hortensis, græcis Pegani flores, Germani Rauten.
Candidi.	Pimpenellæ saxifragæ.	Candidi.	Raphanus hortensis, Germani Retch/ Iulio mense floribus apparet.
Candidi.	Pimpenellæ maioris.	Candidi.	Ricini, vulgo cataputix maioris.
Candidi.	Pimpenellæ minoris.	Candidi.	Rubiæ sativæ.
Puniceis.	Polygonum, floret usq; ad Septembrem floribus.	Candidi.	Rubiæ sylvestris.
Luteis.	Potentillæ.	Aurei.	Senæ flores veluti Brasicæ Iulio mense visuntur, cuius folia Glycyrrhizæ respondent crassa, subpinguia, fabarum sapore, caule cubitali, à quo ramuli exeunt in lori Modum flexiles, floribus emicat aureis, purpureis intercurrentibus ventulis. herba hæc græcis antiquis incognita fuit, distatq; plurimum à Colutea, à Delphinio, à Pelicino, à Peplio, ab Empetro, & tandem ab Alypo Dioscoridis.
Purpurei.	Pisarum.	Purpurei.	Scrophulariæ maioris.
Purpurei.	Persicariæ.		Scro-
Lutei.	Pyrethri, flore Chamemelino non anethi umbella, ut Dioscorides reliquit.		
Albi.	Pulegij maris sativi.		
Purpurei.	Pulegij foemina.		
Purp. candidates.	Potamogeti.		
Purpurei.	Polij hortensis.		
Purpurei.	Polij sylvestris.		
Lutei.	Pastinacæ maioris.		

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.	COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.
Subrubei	Scrophularia minoris per aestatem ferè integram appa- rent.	Lutei.	Verbasci maris.
Candidi & pur- purei.	Smilacis hortensis, siue phaseoli.	Sublutei	Verbasci foeminae.
Candidis.	Smilacis levis, floribus in cacumine perpetuis multis rotundis, &	Aurei.	Verbasci sylvestris, omnes species Verbasci particula- tim florent, & incipiunt ab imo, ut scilla & hastula re- gia.
Lutei.	Teutli siue Betæ.	Albi.	Viola matronalis, prima species.
Flores ca- didos.	Tordylium, quod aliqui sefeli creticum vocant, Ger- mani Berwurz / Fuchsius il- lud esse primum genus Dau- ci ostendit, folia feniculi si- milia habet, minora tamen & tenuiora.	Punicei.	Viola matronalis secun- da species.
Candidi.	Thimelex.	Candidi.	Viburni flores, Germani arbores hanc vocant <i>schlin- genbaum</i> / floret Iulio.
Lactei.	Telephij albi.		
Purpurei	Telephij purpurei.		
Lutei.	Tithymalli, genera omnia flores ostendunt luteos, præ- terquam marinum, quod al- bos habet flores.		
Flos de- sus eua- dens in pappum seu lanu- ginem, Augusto mense.	Typhae, Germani <i>Starren- folbenblust</i> / hic flos cum adi- pe suillo vetusto & eloto ex- ceptus medetur ambustis.		
Candidi.	Vitis nigra odorati flos res &		
Candidi.	Vrticæ Romanae.		
Purpurei	Verbenacæ maris.		
Lutei.	Verbenacæ foeminae.		

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI

COLO- res.	AVGVSTO,	COLO- res.	AVGVSTO,
	Sol in Virgine.		Sol in Virgine.
Purpurei Aurei. Puni- ceos. Ceruleos Florē ha- bet cādi- dū, tenuē & graue olentem. Cādidū.	A Brotani maris. Abrotani fœminæ. Anagallis mas. Anagallis fœmina flores. Artemisia latioribus folijs Artemisia tenuioribus fo- lijs, florem habet. Artemisic tertia species. Ammi flores in umbella. Anisi. Ascyri. Attraxylis vulgaris siue Carthamus sylvestris, Germ: wild saffran. Asclepiæ siue hirundinariæ. Aster atticus, à Matthiolo. Balsaminæ. Brassicæ. Centaurij minoris, Germ: sieber fraut. Cucumeris asinini. Euphrasie, Iulio Augusto & Septembri floret. Eupatorij adulterini, siue herbæ S. Kunigundis. Hydropiperis.	Cineritij & sub- candidi. Purpurei vel Ro- facei. Rosacei. Candidi Purpurei Purpurei Intus lu- tei extrin- sec ^o albi. Candidi Candidi Candidi Candidi Lutei. Aurei. Purpurei Aurei. Purpu- reis. Luteis. Cādidis. Cādidis.	Lupuli salictarij, Germ: ni Hopffen. Malux hortensis arboreæ, prima species. Malux hortensis, altera species. Myagri flores. Menthæ flores, tam hor- tenses, quam sylvestres om- nes apparent. Myrica. Matricariæ, siue parthenij hortensis. Sylimbrij hortensis. Sylimbrij sylvestris. Sylimbrij aquatici, Germ: Bachwurtz. Sylimbrij aquatici secūda species, Germ: Brunnen treß. Solidaginis Saracenicæ. Senetij maioris, siue flos S. Iacobi. Succisæ, id est, morsus Dia- boli. Tanacetij, Germ: Reinfarn/ quod supra pro parthenio mare posuimus. Antirrhinon, Germ: vocant Sterckblumen. Antirrhinon secundū florib. Antirrhinon tertium florib. Arbuti flores racematim pendent liliorum conualliū instar.

L SEP

QVO TMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.	COLO- res.	OCTOBRI, SOL in Scorpione.
Purpurei	A Sari flores vere & au- tumno legendi.	Candi- cantibus floribus.	E Rica, ex Theophrasto arbuscula est, multis à radice stolonibus, bis anno vere nempe & autum- no floret.
Aurei.	Abrotani fœminæ.		
Purpurei	Cnici flores, quidam cã- didi, quidam purpurei, ger- minant & florent post æqui- noctium autumnii, & deniq; uultum temporis. hæc Theo- phrast. & Plinius.	Flos in luteo cã- didus.	Scyllæ flores tertium, nunc sationis tempus ostendunt. Plinio teste lib. 21. cap. 17.
Cãdidi.			
Aureis.	Crocus, floret Vergillia- rum occasu per mensem ferè integrum floribus.		
Subpur- Purpurei	Colchici florentis.		
Lutei.	Cyclaminis.		
Lutei co- loris.	Calthæ. Conyza maior florem ge- rit fragilem, qui in pappum abit.		
Luteum florem ostendit.	Conyza minor, Germani vocant gelb münz / oder dūr wurz.		
Luteis.	Conyza media floribus.		
Cãdidis floribus.	Libanotis, siue Rosmarini frugifera, quæ fœmina dici- tur. Maio & Septembri men- se floret.		
Purpurei	Narcisci purpurei, Ger- mani zeytlosen.		
Herbacei	Narcisci herbacei flores.		
Purpurei	Ocymastri flores.		

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI

COLO NOVEMBRI, COLO DECEMBER,

res.

Sol in Sagitario.

Hedera nusquam non
virens, ex Dios. lib. 2.
cap. 171. cuius tres
statuuntur differentie. Can-
dida nigra & Helix, candida
fructum fert candidum, ni-
gra, nigrum, aut croci am-
ulum, quam vulgus Dion-
isium vocat. Helix fructum
non fert, sed albas habet vi-
ticulas, & folia parva, angu-
losa & concinniora: Maior
porro quæ fructum profert,
& arborea hedera vocatur,
florere incipit ad finem au-
tumni, floribus.

Musco-
lis colore
pallido, e
quibus
hyeme
racemosi
eduntur
corymbi

Flos cro-
ci modò
nullis ad
huc ap-
parentis
b° folijs.

Hermodyli, veri flos e-
xitu autumn, qui alio tem-
pore, Februario nimirum, &
primo statim vere, erumpit.

res.

Sol in Capricorno.

Elleboris nigri hortensis,
Germani Schwarz Garten
niefwurz.

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

Specieatq; forma modo
adornata planta cum sit,
omniq; ex parte folijs,
floribus, carne, neruis, venis,
ossibus & medulla, ceu re-
cens ac tenellus fœtus, im-
modico humore, conforma-
ta. Restat ut reliquo deinceps
tempore, ut caloris assiduo
siccior atq; aridior fiat, cum
ita firmentur, atq; semina
gignantur, quo aspirant &
eile, viuerēq; natura deside-
rant omnia quæ mortali cō-
ditione generata sunt. Quan-
quam autem fieri nequit, ut
id perfectē & omnino conse-
quantur, hoc tamen nacta
sunt, ut quodammodo sem-
piterna sint, non numero
quidem, verum specie, quæ
semper est æterna. Quapro-
pter immutabili æternitate,
continuantur viuentium or-
tus et procreationes, ut quodd
singulari substantia seruari
nequit, specie saltem persi-
stat. Etenim vsu venit, ut v-
num quodq; indiuiduum,
cum mortale & dissolubile
se sentiat, aliud sibi simile
optet in locum suum repo-
nere, in quod & languidum
& inclinantem suam vitam
quodammodo conferat, & per
quod procreatione, quasi re-
puerascens, atq; renouatum
quodammodo perpetuam
fiat, & æternum: hanc dico

procreationem, & frutices
acceperunt, quos procreare
manifestum est, atq; etiam
nutriri & incrementum, quæ ex
se ipsis progignunt, semina
nullo alterius congressu, ceu
animalia. Semen igitur cum
pars plantæ sit, ex qua primò
oriuntur ea, quæ secundum
naturam constituuntur, non
quidem ut ex materia, sed ut
ex motus efficiente princi-
pio, quæ est forma ætherea, à
cœlesti spiritu orta & acqui-
sita, necessario igitur tempo-
ra, quibus singula semina
matura & absoluta sint re-
spicienda, neq; hoc solum,
verum & ætalia, præcellen-
tia & florente ætate, in quib-
us inest flos roboris, facul-
tasq; generandi quodque sit
absolutè coactum, coctumq;
planeq; imitatur naturam,
plantæ arboris aus fruticis,
obseruanda. præterea in de-
metendis elaborandum, tam
quæ in siliquis ossibus, vas-
culis, corniculis, aut capitulis
bus includuntur, quam quæ
nuda proueniunt, aut quo-
rundam fructuum medulla
obsessa, ex fructibus videli-
cet summè maturis ubi sic-
cari cœperint priusquam de-
fluant, ex stirpibus iam sic-
cis, nec amplius virentibus,
qui sanè in sole expendendi,
potissimum ex cucurbitæ,
cucu-

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

cucumeris, & huius generis
fructibus, ut eorum omnis
caro exsiccet, exempta au-
tem huiusmodi semina a
glutino lota, aliquantisper
soli exponenda sunt, quæ ad
annum vsq; vixq; ulterius,
perdurant, rangorem non
sentiant, nec diu soli æstiuo
committantur, ne exusta aut
evanida fiant, & si quæ sunt
reliqua, quæ ad colligenda
semina spectant, & de eorum
durabilitate, lege Theopha-
stum 7. de historia plant: cap.
6. Nos tantum hic paucis
admonere volumus, ut
Pharmacopolæ negligentio-
res exteris admonerentur de
prestantia & natura seminis
cuiusq; si legitimo tempore
colligintur.

FORMA
seminis.

Granisa-
deo pu-
sillis ac
minimis
ut atomis
cōpara-
ri possit,
ob id es-
nim egrè
perspici-
tur.

IANVARIO.

Sol in Aquario.

Cupressi fecunditas mi-
ra, trifera enim est, colligun-
tur eius coni mensibus Ia-
nuario Maio & Septembri,
semen ijs innascitur.

23

FE-

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	FEBRVARIO, Sol in Piscibus.	FORMA.	MARTIO, SOL in Ariete.
			Salicis semen Martio mense colligitur, antequam maturitatem sentiat, etenim semen amittit ocysimè, ob id Homero dicta est, frugi- panda, Plinio teste lib. 16. cap. 26.

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	APRILI, SOL	FORMA.	MAIO, SOL
	in Tauro.		in Geminis.
Sinapi non diffimili.	Leucoion, siue viola alba, Germani weiß Nertzen blumen / semen in Aprili ostendit in capitulis.	Acomis simile.	Cupressi semen in conis, quos ter anno edit, reperitur. Hyacinthi semen, circa finem mensis colligitur, semen leniter extergit & adstringit.
		Semen propè folia paruū & rotundum.	Mercurialis syluestris, siue Cynocrambe maris, semen maturefcit Maio mense.
		Pingue lentum & fuliginosum.	Paliuri semen, cuius frutex aculeatus & durus, Germani Walde disteln / in filiis rotundis conclusum, lini seminis instar.
			Saxifraga maior siue alba, radicem habet exilem, cui granula Coriandri similia adherent, partim alba, partim rubea, quibus officinae pro semine eius vtuntur, colligunt Maio mense.
			IVNIO

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.

IVNIO, SOL

in Cancro.

Rufum.

Alleluia, siue Trifolij acetoli semen in filiquis lunatis profert.

Nigrum.

Asari semen acino non dissimile, hoc mense & Septembri colligimus.

Rufum.

Bulbi sylvestris semen non tantum in caulibus, verum etiam iuxta radicem nascitur.

In filigs

exiguus,

oblongu

angustu

& acumi

natum.

Cerefolium, quod ab alijs falso Gingidium appellatur, Germani ferbelfraut / semen producit Iunio.

Angulo-

sum ac

copiosu.

Caron, Germani fümich / semen in summo caulium nascitur, quinquennio non in efficax.

Minutis

simu est.

Filicis maris semen, quod auersis folijs inhaeret, ad finem Iunii maturefcit.

Racemo-

sum.

Lunaria minoris semen.

Nigrum &

oblongu

Orminum satium, caule constat quadrangulo semicubitali, circa quem eminentia filiquis similes prodeunt, ad radicem versus nutantes, in quibus semen est.

Parua, ro-

tunda, &

fuluesce-

tia.

Orminum sylvestre calyculis pluribus in terram inclinatis constat, in quibus ad summum quatuor semina reperiuntur.

FORMA.

IVNIO, SOL

in Cancro.

Pisi fere magnitudine ex viridi nigricantes.

Rubea

multa,

exigua

tamen.

Nigra,

quinque;

nimirum

aut sex.

Seme di-

sci figura

exiguu

minutu,

& acutu,

& hac ra-

tione a se-

mine pa-

storis

difert.

Seme in

vasculis

loculi

speciem

habenti-

bus, pro-

fert.

Seme la-

tu & co-

pressu in

filiquis

lentium

modu.

Polygonatum latifolium, Germani weiswurtz / Baccas floribus excussis producit, circa finem mensis & principio Iulij.

Paeonia maris, semina siue grana in capsulis, profert acinis puniceorum similia.

Paeonia, foemina summo caule filiquas emittit amygdalis similes, in quibus cum dehiscunt multa grana inveniuntur, mense Iunio & Iulio.

Thlaspi graece, Capsula, siue scandulaceum latinis, tam latifolium quam angustifolij, Germani hoc besenfraut vocant / illud Bawernsenff oder fress / utrunque Maio & Iunio floribus & semine pragnans inuenitur.

Veronica, Germanis Ebssepeis / mas & foemina, Iunio mense floribus & semine pragnans est.

Vitia graecis Bicia, Germanis wicken / floribus & semine Iunio mense pragnans est.

Viola

41
QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.

IVNIO, SOL
in Cancro.

Semē fo-
liaceum,
tenuibus
quidem
sed quin-
cuncina-
libus fili-
quis cō-
tinetur.

Viola alba, græcis Leucoi-
on, Germanis weissen weyl/
semen inter æstatis initia
profert.

Viola lutea, Arabibus
Cheiri dicta, Germanis gelb-
weyl.

FORMA.

IVLIO, SOL
in Leone.

Terna
aut quaz
terna ni-
griora ta-
men &
minora,
quæ sunt
lentes.

Atrum
et parvū.

Semen
ex baccis
rubescē-
tib⁹ legi-
tur co-
piosum.

Semē ha-
bet durū
candidū,
rotundū,
à medio
umbilici
modole-
niter cō-
cauum.

Oblon-
gum an-
gustū &
acumina-
tum.

Semen
aniso si-
mile al-
bidius
tamen.

Semē spi-
catū her-

A Phace græcis pariter
ac latinis, vulgo sylue-
stris vitia, & os mundi,
Germanis wildt wicken / se-
men in filiquis lentium mo-
do producit.

Aquilegiæ semen in Ca-
psulis ostendit.

Asparagus altilis, Germa-
nis Spargen / circa finem Iu-
lij mensis.

Aparinæ, Germanis Fleb-
frut / officinæ & herbarij
nonnulli Aspergulam hodie
vocant.

Cherefolium, semen in si-
liquis exiguis profert.

Cicuta latinis, & officinis
græcis Conion.

Cyperus, Germanis wil-
der galgas / minuta folia in

M cacu-

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	IULIO, SOL in Leone.	FORMA.	IULIO, SOL in Leone.
bacei coloris. Semē gerit p oia plantagini simile, circa finem mēsis et principio Augusti.	cacumine cum semine, Iunio & Iulio mense producit. Coronopus ex Diosc. lib. 2. cap. 123. herbula est per terram strata, filsis folijs, spicatis floribus, colitur in orto Illustrissimorum comitū de Hohenloe.	Semē ut in genera the- sta the- cis inclu- ditur. Latum cōpres- sum & foliaceū. Mollem colore puniceū.	Isatis sativa. Isatis sylvestris.
Rotundum lentis obtinens similitudinem.	Coluthea semen producit in filiquis circa finem mensis, & principio Augusti.	Grana in filiquis, dura lata et ruffa.	Laserpitium Germanis cū officinis Magistrantia, semen circa finem Iulij mensis, & principio Augusti producit.
Siliquas habent breues in quib⁹ semē presum continetur.	Eruum ruffum. Eruum pallidum. Eruum candidum.	Grana 3. aut 4. exeunt.	Lilium conuallium fructū profert, asparago non dissimilem Iulio mense.
Semine lenticulis non absimili.	Genista, Germanis Genist/ in filiquis hirsutis, semen profert circa finem mensis.	Semē rubrum & racemosum.	Lupini ter florent Maio, Iunio & Iulio, post vnumquemq; florem filiquas producant, in quibus continentur grana.
Ruffum.	Genistella, Germanis Erdbpfri- men / oder Klein streichwurtz / semen in filiquis exiguis.	Grana 3. aut 4. exeunt.	Lolium in filiqua aculeata, cortice contumaci contenta.
Leue glutinosum id spon- siliij semen accedens.	Gentiana maior. Gentiana minor, vtraq; Iulio mense semen producit in calycibus. Iberis siue Nasturtium sylvestre, Germanis wilden fressen samē.	Nigro, p interual- la in cau- libus.	Limonium verum, cuius radicem officina falso Ben- rubrum appellant.
		Semē in calicibus orbiculatum.	Marrubium latinis, praefum officinis, Iulio potissimum mense semine est praegnans.
		In filiquis semen valde exiguum.	Nasturtium hortense.
			Nasturtium sylvestre, tam prima, quam secunda species.
			Nym

42
QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.	FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.
In capil- lamenti nigrū, la- tū, den- sum & pingue. Herbace- m u, acu- minatū & trian- gulare. Acumi- natū & rubeum. Racemo- sum. Rufum.	Nymphaea alba. Nymphaea lutea. Oxylapathum folijs du- rioribus, & tenuioribus fo- lijs semen ostendunt. Oxalis seu acetosa. Bonus Henricus, herba est Oxalidis, semen profert. Papauer erraticum, tam primæ, quàm secundæ spe- ciei, circa finem Iulij mensis & principio Augusti. Pyrolæ in capillamenti semen. Pes anserinus, semen cir- ca finem Iulij ostendit. Sinapi luteum, filiquas profert rotundas ac hirsu- tas. Sinapi album, floribus ni- mirum albicantibus, crucif- que effigiem referentibus, fi- liquis teretibus & oblongis, refertis.	Striatum et oblon- gum. Semen p ramulos diffusum & rotun- dum. Semē in summis caulibus syluestri ormino simile ge- rit vtraq; Spinulis horridū semen. Nuci si- mil quæ carytes nomina- tur Semē in- globulis tenue. Semen tenuius. In glo- bulis se- mine lini minore.	Sanicula, quæ Matthiolo est quarta species pentaphyl- li, semen producit. Saxifraga lutea, Germani gelben steinflee/profert. Salvia maior. Salvia minor, dicta autem latinis utraque est, quod ad multa, præsertim ad fœcun- ditatem salutaris sit. Spinachia, Germani Bis- nestsch vocant. Tithymali Myrsi nitis se- men legitur cum hordeum turgescit, principio nimirum Iulij mensis, alternis tamen annis. Vrtica maior. Vrtica minor. Vrtica Romana, tempore messis semina vrticæ legen- da sunt, vtrum verò semen eligatur, non refert, quidam Romanum semper præfe- runt.
Rubrum gustūq; adstrin- gens. Racemo- sum ve- luti in at- triplici syluestri. Plenas se- mine cā- dicante. Semine pullo & ruffescē- te.			M 2 AV

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.	FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.
In filiisq semen paruum. Semē nō habet co piofum ceu pri ⁹ . Semē ha bet rotū dum, ra cernatim coharēs. Semē illi est oblō gum lu teum ca put Thy si specie. Album. Semē aci no non dissimile profert. Tenue se men pro ducitur. In filiisq atrum. Cōpres sum. oblongū et latum. Oblōgū.	A bsinthij seripij marini semen, quod à quibus dam cina appellatur. Absinthium fantonicum. Absinthium ponticum: o mnia hæc genera colligenda circa principium Augusti mensis, quo tempore semine abundant. Acanthus siue Acantha, semine abundat statim in principio Augusti mensis, & circa finem Iulij. Altheæ semen in calyculis. Asari à 15. die Augusti, us que ad 8. diem Septembris. Amaranti lutei in umbel la rotunda veluti Corym bris. Allerariæ. Attriplicis Domesticæ in folliculis. Anethi. Anisi semen adoratum, &	Latū pe ponū du plo mai ⁹ cortice solidiori et nucleo grādiori. In figura pistilli he ret croci colore. Foliatū semen & cortice obductū. Semē ra cernatim pendet. Nigrum. Corticeū copiosū racema tim de pendens. Semē in caulibus copio sum. Semē ni grum & striatum. Nigrū & striatum. In folli culis.	Anguriarum semen in fru ctibus, tanquam nucleus cō tinetur. Aaronis semen primum viride apparet, vbi mature scit croceum. Attriplicis hortensis. Attriplicis sylvestris. Anchusæ species, quarum tres obseruentur, semen o stendunt. Blittum album, et rubrum semen, singulis annis, ut in Beta ostendunt. Beta candida, mangolt: Beta nigra, rotter mangolt/ Beta rusta, rot ruben / ger mani vocant. Buglossum verum, vulgò Borago dicta. Buglossum sylvestre vtrumq; Blatteariæ semen. Betonicæ

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.	FORMA.	AVGVTSO, Sol in Virgine.
In spicato Thyrsos thymbræ modo.	Betonica purpurea semen.	Subrotundum siue oblongum & album.	Cardui Mariæ, Germani scabidistel / Semen cnico non dissimili.
Tenue semen.	Cassuta, siue cuscuta.	Nigrum.	Chelidoni majore semen in filiquis.
Candidum & rotundum.	Cnici, in fine mensis septembris producit barbæ modum hirsutumq;.	Semen in calycibus latum & oblongum profert.	Digitalis lutea.
Hispidum.	Chamelionis nigri.	Semen capitum cum maturitate nigrescit.	Digitalis purpurea.
S. atrum in Calyculis.	Chamedrys, utraque masculinum & femina.	Semen candidum hirsutum & acre profert.	Dracunculi majore.
Sem: nigrum, paruum iuxta alas.	Chamepytis, secunda & tertia species producant.	Semen oblongum in umbella, odoratum acre.	Dracunculi minore.
Semina siue grana, lata compressa, arietis caput representantia.	Ciceris candidi.	Capite et semine anethi, oblongum sapore acre.	Daucus creticus, qui folia feniculi similia habet, sed minora, Germani Berwurtz.
In filiquis rotundis granis concluduntur.	Ciceris nigri.	Primum viride mox rubrum tandem nigrum ubi maturum.	Daucus secundus, qui folia Laserpitio similia habet, aromatum modo odoratum, acre, gustanti odoratum & feruens.
Oblongis capitulis paruum.	Ciceris rubei, semina in filiquis duo concluduntur.		Daucus tertius, folijs Coriandro assimulatur.
Nigrum.	Ciceris sylvestris.		Erithrodani siue rubie tinctorum semen.
	Cornopi sativi.		
	Cornopi sylvestris.		
	Ceparum semen nigrescere incipiens colligendum, color enim niger maturitatis signum est.		

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	AVGVTSO, Sol in Virgine.	FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.
Asperū.	Elxine, id est, parietaria.	Rotūdū	Hipposelinum, quod est
Nigrum.	Elenij.	nigrū sa-	vulgare leuisticum, Germani
Subhir-	Eupatorii semen.	pore acri	Libstüchel.
sutum.		ingrati	
Semē in	Eruca sativa.	odori,	
filiquis	Eruca sylvestris, huius se-	friabile	
firmum.	men homines in Hispania si-	& squa-	
	napis vice vtuntur, est autem	mosum.	
	ad ducendam vrinam effica-	Nigro &	Hipposelinum Appollina
	tior, & multo quā sativa	oblongo	ris, de sententia Dios. lib. 3.
	acrior.	acri soli-	cap. 62. in Corymbis semine
	Echium, Germani wildt	do etaro	turget.
Capiti vi-	Ochsenzungen / semina ha-	matico.	
perarum	bet.	Semē p-	Hyoscyamus, officinis
similia.	Esula maioris, siue pepi-	ducit ca-	Iusquianus albus, quo vtun-
Paruum	in capsulis profert semen.	didum.	tur medici solo.
rotundū		Semen	Hioscyamus flauus.
& puni-		flauum.	
ceum.		Semen	
Subflauū	Foeni græci semen.	nigrum.	Hyoscyamus niger, tria
pingue.			hæc genera Dios. lib. 4. cap.
Foliatū	Filipendula siue Oenan-		50. notauit, quorum semina
cortice,	the semen habet.		colligenda sunt in fine men-
instar at-			sis, Galenus libro 8. simpl:
triplicis.			Flaua & nigra semina fugi-
In filiqs	Fabarum satiuarum ma-		enda esse præcipit.
grana	gnitudine differentes.		Hastula Regia siue Aspho-
subbro-		Nigrum	delus uerus, baccas profert
tunda.		& trique-	subrotundas herbacei colo-
Rotunda	Fabarum sylvestrium in	trum.	ris, in quibus semen conclu-
grana.	filiquis compressis.		ditur.
Granaha	Frumentum Saracenicum	Nigrum	Intybus maior, siue En-
bet tri-	quod nos Heydel vocamus.	& oblon-	diua.
quetra ni-		gum.	
gra intus		Nigrum.	Intybus minor, siue Sca-
alba.			riola.
Latū le-	Gentiana maior.		Lactuca
ue & glu-			
tinofum.			

44

QVO TEMPORE SEMINASINT COLLIGENDA.

FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.	FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.
Sem: omnibus oblongū in acutū de sinens album & nigrum.	Lactuca rotundum. Lactuca crispæ. Lactuca capitata. Lactuca sylvestris.	Paruum rotundū subflauū	leporino pedi similib' admodum adstringentis gustus. Miliū Germ: Hirscht/ Augusto mense demetendum, semen in iuba tereti & pendulo folliculo concluso.
Sem: paruum inter folia rotundū cuius magnitudinis duritia lapidea.	Lithospermum, siue milium, solis sativum maius. Lithospermum sativum minus. Lithospermum sylvestre.	Exiguū, rotundū geminorum testiculorum modo.	Mercurialis mas semen. Mercurialis femina, semē producit racemosum & multum.
Subrotunda.	Lens semina profert in siliquis orbiculata compressa.	Nigrum.	Melanthium quod et Cith officinis Nigella appellatur, German. schwarz kumid.
Nigro folio & oblongo fœniculo proximo.	Ligusticum, seu cum Galeno Libiscum ex Diosc. li. 3. cap. 49. nascitur semine.	Nigrum.	Melanthium secundū hortense floribus purpureis folijs Coriandrinis, ob id à German. schwarz Coriander nominatur.
Gustanti acri & aromati.	Errant pharmacopæi hoc tempore plurimum, qui pro eo leuistico vulgari vtuntur, caule alto, crasso, cauo & geniculato, semine ingrati odoris, squamoso & friabili, nō aroma olente. Cerna: libstüchel samē.	Flauum.	Melanthium citrinum, cuius semen officinis incognitum.
Subflauū compressum.	Linum vellitur Augusto mense intumescēte semine, & flavescente colore. Lagopus, semen in panniculis muscosis lanuginosisq;	Semē in siliquis striatis foliis nigro amaro in odore.	Melanthium sylvestre, ab alijs pseudomelanthium.
		Paruum rotundū flauū, rotundū in fra amplitudine sinapis. cuius dūtaxat vsus esse debet.	Maiorana. Melilotum verum, siue fertula campana, semen in tenuibus corniculis includitur.

Ocyz.

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.	FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.
Semen parvū & nigrum, cui et cortex obducitur. Odoratū amarū.	Ocymum maius. Ocymum minus. Ocymum cariophylla. tum.	Nigrum in calycibus.	Papauer sylvestre, quoddā nonnullis philitis appellatur à quibusdam verò Rheas, semen producit.
Grana in filiis sese inuicem stipant. Semē in spica tenuē profert.	Peucedanum Macedonicum semen habet, petroselinum hortensi non dissimile.	Semē leuem in uersione habet veluti fœnū gracū, ut bouis cornu videatur esse.	Est & papauer sylvestre secunda species, de qua Theophrast. 9. historia plantarum cap. 13.
Semina dauco similia producant.	Pisi maioris. Pisi minoris.	Verficolor.	Papauer Spumeum, alijs Heradium et Corniculatum, siue ceratites.
Semen Getta vocato, simile.	Plantaginis maioris, minoris & longæ.	Semine duplici rotundo scutulo rum effigie odorato subacri.	Smilacis hortensis semen.
Septē, 8. 10. aut plura habet cicerum magnitudine.	Pastinaca sativa & sylvestris.	Triquetrum.	Seseli creticum, Tordylium dictum, recentioribus Siler montanum, ex Dioscor. lib. 3. cap. 51. multiplex est: nempe Massiliense folijs fœniculi. Peloponense folio cicutæ latiore & crassiore.
Pellucidum & nigrum.	Personatia officinis Lappa maior.	Que corculi figurā planē referant, ex nigro subuirescentia.	Staphisagria semen.
Semē candidum et rotundū.	Phaseoli, grana in filiis aut inuolucris.		Senæ Alexandrinæ, ex Thecis oblongis lunatis tenui pedulo pendentibus semen legitur, semina intus in ordinem digesta sunt.
	Perfoliatæ semen.		Stachas
	Papaueris sativi candidi, cuius plantam Thiliacem vocant.		

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA. AUGVSTO, Sol in Virgine.	FORMA. SEPTEMBRI, Sol in Libra.
<p>Triquetrum coloris spadiciei. Stachas uel stichas, principio fere mensis Augusti, spicis flavescentibus semen reperitur copiosum.</p> <p>Rotundū & cādidum. Spinæ albæ semen Cnico simile.</p> <p>Oblongū nigrū acre odore Myrrham referente. Smyrnum semen in umbella gerit anethi modo, semine brassicæ maiore.</p> <p>Semina in capitulis minutā. Sagittæ maioris. Sagittæ minoris.</p> <p>Latū & compressum. Sphondilij sylvestris semen sapore ingratum, in folliculis.</p> <p>Subrotundum. Tinctorij semen.</p> <p>Semen milio nō dissimile parū & nigrum. Trifolij odorati.</p> <p>Rotundum et odoratū. Thymbra Dioscoridis.</p> <p>Racemosum nigrū, plumis quasi vestitū. Thymbra alterius generis, ambo hæc Satureia vel cuius nulla dicuntur.</p> <p>Vitis Nigræ, barbæ canæ effigiem præbens, semen initio herbaceum, ubi verò maturuit.</p>	<p>Tenne numero sum. Brotani maris.</p> <p>Rotundū et minutum. Artemisia latifolij.</p> <p>Acinosum. Asari semen.</p> <p>Rotundum & circinatū. Anagallis mas. Anagallis foemina.</p> <p>Oblongum odoratū. Anisum folio & flore usque, adeo fœniculi æmulo ut oculis illius gustu atque odoratu intuscat, semine tamen minore.</p> <p>Parū rotundū & subflavū. Amaranti purpurei semen.</p> <p>Oblongum & plumosum semen. Asclepia, semen in folliculis longis, quæ cum dehiscent ostendunt.</p> <p>Oblongum & squamosum. Alnus, Germani Erlebaum cuius semen.</p> <p>Granula. Anonis siue Ononis in siliquis fert.</p> <p>Semen nigrum & resinam obolens. Ascyrum hyperici genus.</p> <p>Nigrum punctis depictū. Androsæmi, semen in calyculis papaveris nigri Dioscoridi.</p>

N Acatia

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.

SEPTEMBRI,

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Sol in Libra.

Lupino
simile in
folliculis

Semen
lenticula
min⁹ fert
autūno
in oculis
cōnexis.
cernum
quater
numūe
capacib⁹.

Verū am
maī semē
ae re &
amariu-
culū fit
petro se
lino exi
liore.

In filiqs
rotunda
& parua
Subrotū
dum ac
paulō a-
cumina-
tum.

Racemo-
sum.

Panico
sylvestri
simile.

Acatia, quæ nascitur in Æ-
gypto, spina instar arboris
fruticosa, semen.

Acatia altera, quæ in Cap-
padotia, Pontoque provenit,
Ægyptiæ spinæ similitudine
longè minus, tenerius, humi-
le, aculeorum vallo muni-
tum, folia habens acuta, se-
men in autumnno legitur.

Ammi, cuius genituo Am-
meos officinæ vtuntur. Phar-
macopœi pro Ammi varia
semina ostendunt, nonnulli
semina parua, oblonga & te-
nuia habent, alij similia fœ-
niculo, alij petroselino vul-
gari adeo amula ut vix visu
internosci possint, nisi gu-
stum consulamus, alij maio-
ra cumino & nigra, quæ par-
ua sunt & passim videntur.

Brasica sativa capitata, &
levis semina producant.

Bryonix semen in acinis
delitescit, glutinoso succo
immersum.

Botris circa ramulos.

Blitum fatuum atque insi-
pidum olus, in cæcuminibus
fert semen.

Atomis
simile, ut
vix cōspi-
ci possit.

Candidū
plenum
grandis
usculū.

Album
pilis bar-
batum.

Rotūdū
ae nudū.

Rotūdū.

Tritico
simile.

Oblōgū
& nigrū.

Longū
nigrum.

Copiosū
tenue, ut
in Hele-

nio.

Magnū,

latum, a-

mygdali

ni nuclei

figura.

Subni-

grinstar

capituli.

Cypressus, tertio nunc co-
nos profert, in quibus semen
continetur.

Cnicus hortensis semen
profert, cortice tenui, medul-
la vinctuosa & pingui.

Cnicus sylvestris seu At-
tractylis, prima species fru-
ctum nigrum producit, in
quo semen continetur.

Alter Cnicus sylvestris, seu
Attractylis secunda species,
vulgo Cardobenedictus ma-
turus est in Augusto mense.

Coriandri semen.

Cannabis sativa semen.
Centaurij minoris.

Caltha semen ostendit.

Caryophylli Indici mai-
oris.

Caryophylli Indici mi-
noris.

Cucurbitæ sativæ, tā longe
q̄ rotunda semen, in ipso fru-
ctu cōtinetur, dulce & suave,
maturū circa finem Septem-
bris & principio Octobris.

Cichorei sylvestris & ve-
rucarij.

Erysimi semen in corni-
culis paruum acre.

Fœni-

46
QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	SEPTEMBRI,	FORMA.	SEPTEMBRI,
	Sol in Libra.		Sol in Libra.
Craſſius anetho et gustui magis bladiens.	Foeniculum secundo anno a ſatione ſemen profert.	Nigrum durūq; Latum.	Pſilij ſemen pulicibus ſimile.
Nigrum.	Hiperici ſemen in ſiliquis hirsutis.	Nigrū in herbaceis caliculis cōtinetur	Pyrius lenticula modo ſemen.
Racemoſum.	Hidropiperis albi.	Semine in modū mori rubri.	Portulacæ hortensis.
Acre & rubeum.	Hydropiperis rubei.	Durū qd difficile euellitur	Portulacæ ſylueſtris.
Rotunda maiora eruiſ, q̄ cū corticib⁹ exuuntur, cā dida ſunt & gustu dulcia.	Lathyris fructum fert in ſummis ramis, tribus loculentis diſtinctum, rotundū, ceu capparim, in quo terna ſunt ſemina putaminibus inuicem diſcreta.	Lentum pingue ſiliq; cōcluſum.	Pimpinellæ maioris.
Paruum.	Lepidium ſemen profert.	Album.	Pimpinellæ minoris, vtraque hæc planta, quibuſdam ſanguisorba, alijs ſolbaſtrela dicitur, herba elegans & perpulchra.
In forma vmbilici numeroſum ſemen cōtinetur.	Malux hortensis.	In vuis racemisq; aſperis e cortice nudatū.	Perclymenon vulgò maior ſylua, ſemen habet.
Candida & hirsuta.	Malux ſylueſtris.	Rotundū ruſſū & ſapore acutū, rapī napiq; ſemine cū min⁹ tum etiā durius.	Paliuri arboris Theophr. ſemen legit, libro 3. de hiſt. plant. cap. 19. autumnio.
Semē in ſiliquis.	Napi ſtavi ſemina, quæ Germani ſteck ruben ſamen vocant.		Rutæ hortensis in anguloſis calycibus ſemen continetur.
	Napi candidi ſemina, quæ Germ. weiß ſteck ruben ſamen appellant, vel alio nomine trucken ſteck ruben.		Ricinus, cuius ſemen officinæ Cheruam maiorem vocant.
Semē in ſiliquis.	Napi ſylueſtris ſemina, q̄ germ: naß ſteck ruben vocant.		Raphanus ſatiuus primus cuius ſemen in ſiliquis tumentibus, rapo quadruplo maioribus in mucronem delinentibus continetur.
Candidū & hirsutum.	Paſtinacæ ſatiuæ ſemen.		
	Paſtinacæ ſylueſtris.		

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.

SEPTEMBRI,

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Sol in Libra.

Raphanus sativus secundus, radix minus crassa, longè durior, acrior, & gustui ingrator.

Raphanus Rusticanus, siue vulgaris, à Romanis Armoratia vocatus, folijs sativo similibus ferè, sed magis Lampanæ amulis. Fuchius vulgato nomine Bren oder Merretich vocat, sed falso.

Rotundū, albu, durū, operitū lanugine, lib. 2. r. cap. 4. Plin. test. Nigrum

Rosarum semen continetur in ipso fructu, & legitur cortice rubeo ubi maturuit.

Symphytum maius, quod alio nomine pectron appellatur, semen veluti verbasci ostendit.

Nigrum paruum lupino simile.

Smilacis levis semen.

Nigrum.

Syderitis.

In alijs

Sylimbrij hortensis, vulgo

exiguū

Mentha Romana, semen Sylimbrium aquaticum, vel

ca instar.

Lauer.

Rufum

Sorgi, Germani Welschen

rotundū

Hirschjamen.

acuminatum.

Rotundū

Spatulae foetidae, in filiquis

et rubrū.

profert.

Rotundū

cādidū.

Simile e-

ruo.

Rotun-

dum.

Rotundū.

Oblōgū.

Paruum.

Rotūda.

Nigrum.

Album.

Tithymalorum semina autumnno leguntur, quorum genera sunt.

Charatiq; semen in capitulis, alternis tamen annis.

Paraliq; semen.

Cyparissij siue Esulae minoris, in capitulis semen.

Helioscopij semen.

Dendriiformis.

Platyphylli.

Tiliae foeminae, semina in

baccis orbiculatis continen-

tur, quae siccata sole, leuiter

tunduntur, seruescuntq; loco

mundo reponuntur.

Verbasci nigri & sylue-

stris.

Verbasci albi semen, ex

Dioscoride lib. 4. cap. 89. ha-

differentiae duae summae ha-

bentur in quibus mas & foe-

mina intelliguntur.

OCTO.

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA OCTOBRI, SOL FORMA OCTOBRI, SOL

in Scorpione.

in Scorpione.

Subalbidum.

A Bies, græcis ἐλάτη, germani Tannen / legit semen Plinius, lib. 16. cap. 26. post Vergiliarum occasum.

Nuclei ob longi duris putaminibus conclusi, interior nucleus tunicæ circumtegitur flauo colore.

Piceæ.
Pini domesticæ.
Pini sylvestris Idææ.
Pini sylvestris maritimæ.
Pini sylvestris Mtuago dicta.
Pini sylvestris Crembo dicta, Germani Harzbaum / Fichtebaum / oder Föhholz.

Semine nigro, melancholico seu nigella simile.

Ocimastrum, quod Germanis wüld Basilig appellatur Plinio lib. 20. cap. 13. attestante. folia habet Ocimo similia, filiquas hyoscyamo pertimiles.

Cnici figura, laugina sum.

Scolymus, latinis Carduus dicitur & Strobilus, Columella cinaria. Germani Articoxa oder Strobil der dem nominant, semen ostendit.

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.	
FORMA. NOVEMBRI,	FORMA. DECEMBER,
Sol in Sagitario.	Sol in Capricorno.
<p>FRaxini semen, quod alio nomine Orneoglosson, siue lingua auis, Germanis Stein eschern dicitur, initio Nouembris decerptum, & in furno siccatum datur, per quam vtiliter calculosis ex veteri vino.</p> <p>Libanotis foeminae frugifera, cuius semen canchrys vocatur.</p>	
Candidum & latum.	
	Ianuario

QVO TEMPORE FRUCTUS COLLIGENDI.

FORMA.

IANVARIO,

Solin Aquario.

Fructus,
crassus,
durus &
cōpactus

Quęante
maturita
tem vire-
scunt &
deinde
nigrū co
lorē con-
trahunt,
mense
Ianuario

Bacce
subrotū-
dæ, q̄ aut
ē viridi
nigre-
scut, aut
ē viridi
albescūt.

CVpressus vel Cyparissus, rustica & urbana plebi notissima arbor, ter in anno frugifera est. Ianuario, Maio & Septembri, de qua Plinius lib. 16. cap. 27. & Diosco. lib. 1. cap. 77.

Hædæ arboreæ Corymbi racemosi eduntur, ligustinis grandiores,

Lauri Bacce, Ianuario Aquilonis afflatu siccantur, expandunturq; rare ne calefiant aceruo. Plinio attestante lib. 17. cap. 10.

Pini fructus, nullo non mense maturescit, quo enim mense ex ea nux decerpitur, eodem maturescit & alia, & sic dispensatur toto anno, hæc Plinius.

FORMA.

FEBRVARIO,

Solin Piscibus.

MAR

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.
 FORMA. MARTIO, SOL FORMA. APRILI, SOL

in Ariete.

A Mygdala, quæ et nux
 Græca dicitur, ex Dio-
 sco. lib. 1. cap. 139.
 duplex est, alia amara, quæ
 medicamentis, alia dulcis,
 quæ cibo idonea est. Dulcis
 in Macedonia & Ægypto,
 Plinio attestante lib. 16. cap.
 25. matura est Martio.

Racemo
 sum, fru-
 ctu folli-
 culo, cor-
 niculi
 modo in
 torto, in
 quo in-
 cluditur
 liquor
 limpidus,
 qui tan-
 dem ve-
 terascens
 vertitur
 in bestio-
 las ijs per
 similes
 quæ ex Vi-
 mi et The-
 rebinthi
 folliculis
 euolant.

Lentiscus, ter in anno fru-
 ges fundit, ut Ciceronis ver-
 ba referam.

Iam verò semper viridis,
 semperque grauata.

Lentiscus, triplici solita
 est grandescere fœtu.

Ter fruges fundens, tria
 tempora monstrat arandi.

in Tauro.

S Alicis fructus in princio
 spio mensis colligendus
 est, ante maturitatis gra-
 dum, vel ut Plinius testatur,
 antequam in araneam abeat,
 ocysimè etiam, perdit fru-
 ctum, ob id ab Homero fru-
 giperda dicta est.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

MAIO, SOL

in Geminis.

Crassa
duraatq;
cōpacta.

Rubex,
Alba &
molles
sunt.

Orbicu-
lata &
præssa.

CVpressus arbor, secun-
do nunc fructum ma-
turat forma.

Fragaria, fructus suauitate
commendata, gustu Maio
mense aridente, biliosis æstu-
antibusq; ventriculis & siri-
culosis, non leuis commodi,
Germ: Erdber.

Lupini, ter filiquas in an-
no producant, Maio Iunio
& Iulio, in quibus grana 5.
aut 6. membranis distincta
continentur.

FORMA.

IVNIO, SOL

in Cancro.

ARmeniaca, q̄ & Chry-
somela, id est, aurea
mala, quanquam &
cotoneo competant, vti &
citrio ex Atheneo lib. 3. ca. 5.
à latinis præcotia dicta, eo
quod ante alios fructus fus-
gaces sint, & cum alijs ho-
ieis fructibus maturescant.
eorum quædam sunt mino-
ra, quæ Germana appellatio-
ne vocamus Amareli. Quæ-
dam maiora, inter Persicum
& Armoniacum media spe-
cies, subfulua, carnosâ, odo-
risq; Persici sunt, Germani
S. Ioannes Psirsing.

Orbicu-
lata &
præssa.

Fructum
racemos-
um foli-
culis
cornicu-
li modo
intortis
ostendit.

Lupinorum fructus, in si-
liquis grana, 5. aut 6. mem-
branis distincta, reperiuntur
in fine mensis & principio
Iulij.

Lentiscus arbor est in Chio
Insula, ex qua resina lentisci-
na, vulgo Mastix. græcis Ma-
stiche, resudat Diosco. auto-
re lib. 1. cap. 75.

Myrtus ex Dios. lib. 1. cap.
228. sativa, nigra, utilior est
medicina, quam candida, &
in hoc genere multò magis
montana. semen tamen im-
becillius parit. Dux itaque
Myrti species, altera candida
comparata, nigrescens, alte-
ra ni-

O ra ni-

FORMA.

IVNIO, SOL

in Cancro.

Baccas
ferūt ob-
longas,
agrestes
oleas
quadan-
tenus re-
ferentes,
multo sa-
nē sylue-
stribus
maiores.
Colore
& mag-
nitudine
iuniperi-
no non
absimi-
les, vino-
sum &
austeriu-
sculum,
et in sum-
mitate
cōcauū,
vmbili-
ciāe mo-
do.

Baccę fla-
uę & sub
dulces.

ra nigra respectu, albicans &
in purpuram pallescentes.
Satię sunt & sylvestres v-
triusq; coloris.

Satię sunt Myrtus exo-
tica, Myrtus Romana.

Myrtus, Tarentina quę in
arbores facillē adolescunt ra-
mis flexibilibus, ac lentis.

Myrtus sylvestris, Germa-
ni vocant Heydelber/ oder
Schwarzber/ fructum fert.

Vua crispa, vulgo spineo-
la, veris initio statim pube-
scens, postea flore atq; acinis
candicantibus, primū acer-
bitate grata herbacei coloris
per maturitatem flauescen-
tibus granosis translucidis
cum dulcore, Germani vo-
cant Blosserber.

FORMA.

IVNIO, SOL

in Cancro.

Solamum, Somniferum
secundum, quod Matthiolus
pingit lib. 4. cap. 69. supra
Diosc. folijs angustis, caule
anguloso, floribus tintinabi-
li figura subpurpurascen-
tibus in ambitu denticulatis,
flore Maio mense, Baccas
maturat Iunio & Iulij prin-
cipio.

IULIO

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA

IULIO, SOL

FORMA

IULIO, SOL

in Leone.

in Leone.

Fructus
prodeunt
Perfico-
rum for-
ma, sed
aureo aut
luteo, co-
lore cum
purpura
mixto.

Baccas
rubentes
longo pe-
diculo
dependen-
tes, duro
intus los-
ficulo
pili mag-
nitudine
aut mai-
ore, in q̄
nucleus
conclu-
ditur, sub
amariu-
sculo sa-
pore.

Grana 5.
aut 6. me-
branis di-
stineta.

Fructus ni-
ger &
mollis,
sanguis-
neus; ple-
nus.

Armonica maiora, graecis *παρακάρια*, non *ἐπε-
χάρια* dicta sunt, Ger-
mani Sancti Johannes p̄fir-
sing/ ut supra diximus.

Cerasus arbor notissima,
Germani Weichselbaum/pro-
fert baccas rubentes. Genera
cerasorum ex fructus colore,
duritie, gustu sortiuntur no-
mina, ut Plinius lib. 15. cap.
25. testatur. Alia dulcia, alia
subamara, alia austera, alia
acida, alia insipida reperiu-
tur. De ceraso lege & Theop.
3. de hist. plant. cap. 13.

Lupinus, tertio nunc fili-
quas producit in quibus con-
tinentur.

Morus ex Diosc. lib. 1. cap.
143. arbor duplex est Nigra
quæ & celsi dicitur: & candi-
da. Nigra rursus duplex, syl-
vestris arbor, quæ batos, la-
tinis rubus dicitur, de qua

Diosc. lib. 4. ca. 33. cuius fructi-
bus Iunio & Iulio mensibus
vescimur, Ger: Bramber vo-
catur, Domestica arbor Mora
in fine ætatis p̄fert, Germa-
nis Maulber.

Rubus Idæus, graecis *Ἰδαία* fortassis ab Ida
monte de nominationem ce-
pit, quod ibi copiosissimus
habeatur, nascitur & nostris
regionibus, breues spinas ha-
bet et tenellas ipsa arbuscula,
tenella etiam & flexili exis-
tente, fructus Hindber/ vo-
catur à Germanis, extrema
ætate, maturi decerpuntur.
Sic de ijs Horatius, 2. sermo
num Satyra. 4. illa salubres.
Æstater peraget: qui nigris
prandia moris Finiet, ante
grauem quæ legerit arbore
tolem.

Alba siue candida anti-
quorum, nemo recordatus
est solo excepto Ouidio: de
qua infra dicemus.

Ribes ex Serapione, autho-
re Isach, est planta, proferens
capreolos, recentes rubeos
ad viridem inclinantes, gra-
uis prædita dulcacido gustu,
Germani Johannes berle/
vocant, Iulio mense potissi-
mum leguntur.

O 2

AV-

FORMA.

AVGVSTO,

FORMA.

AVGVSTO,

Solin Virgine.

Solin Virgine.

Primo
virides,
deinde
ruffesce-
tes & ro-
tunda.
Flaua,
plani in-
regri nō
erosa le-
ues, intus
cādidis-
simē.
Rotūda,
magna
aureo co-
lori.

Pregnan-
diamala,
instar me-
lonum,
herba-
ceo virē-
tia colo-
re.

Fructum
extube-
rante pō-
deroso
herbaceo
colore
maculo-

A Sparagi altilis siue hor-
tensis, baccas cum se-
mine legimus æstate.

Amygdalarum dulcium
fructus vulgo vbique noti,
sunt verò German. *Mandel-
fern*.

Amygdularum amararū,
Germ: *Butter mandel fern*.

Aurantiarum mala, fulgo-
ris auri æmula, ideo aurea di-
cta sunt, quibusdam auran-
tiæ, quod in eum inclinent
colorem, qui vulgo ranzo
dicitur, aut verius ab Aran-
tia oppido Achaia, ut ex Her-
molao, 5. sui corollarij cap.
422. videre licet, Germani
vocant *Pommerantzen öpffel*.

Adami poma, Germani
Adams öpffel.

Anguriarum, Germani
vocant *Gurken* / viridis aut
verius, ex viridi & subpallio
do interstinctus fructus: ob-
longus insipidus cum lauo-
re, semine rubicundo,

so tamen
ea parte,
qua hu-
mi iacet
albicāte
carne in-
tus hu-
mida &
aquosa.
Calyce
fimbria-
to, rotun-
do, nu-
cleo mol-
li intesta
barba.

Vtriusq;
fructus
imaginē
longe py-
ri referunt
suntq; in
glandib;
longe mai-
ores: in
rotunda
vero ro-
tundio-
res, pau-
loq; mi-
nores spe-
ctantur.

Vesicam
hali caca-
bi veru-
cosam,

Auellana nux græcis pon-
tica, ut latinis pranestina, ex
Diosc. lib. 1. cap. 16: ut etiam
Avellana atque edomita,
Germ. *Baselnus* / quædam
sunt sylvestres, & hoc mense
maturefcunt.

Aristolochia rotunda.

Aristolochia longa.

Aristolochia clematides,
hæc rara admodum & pau-
cis nota est, duz priores sunt
notissimæ.

Balsamina siue Viticella
mas, Germani *Balsam fraut* /
planta visu pulcherrima,
hortorū cameras fenestrasq;
per

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

utrinque per cancellos tegit, fructum
turbina- maturat & perficit, Augusto
tā, in qua & Septembri mensibus, quē
semē ma & Hierosolimitanum po-
tunitate mum vocant.

dissilit,
inanitate
confras-
tum ap-
paret,
nūc can-
didū nūc
rubrū &
rotundū,
vna ex
parte co-
loris ni-
gri, cor-
dis effi-
giem ex-
primēs.

Fructu
oblongo
& macu-
loso.

Oblong⁹
non ma-
culosus,
sed flau⁹,
semina
intus ha-
bet lata
& alba.

Cucumer sativus latinē,
σίκυς ἡνερῶ & artice, communis
multis generibus dictio,
de quo Theophras: 7. histo.
plant. cap. 4. primo intelli-
gimus genus, quod vulgo
cucumer vocant.

Cucumis sativus, Turcicus
sive peregrinus, priori multo
maior ac procerior, Germa-
ni Citrulen appellant, quasi
citrinum,

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Fructus
rotund⁹
semina
minora
habet, q̄
priores
cucume-
res.

Fructum
rotundū
herbacei
coloris,
semina
in rufo
atra.

Baccas
oblōgas
oliuē mo-
do fert
primò vi-
rides tan-
dem per-
maturita-
tem ru-
bescunt.
Racemo-
sus ru-
beus.

Colore
primum
herbaceo
et cum e-
maturuit
croceo.

Cucumis Marinus, Ger-
mani Meer cucumer / officii-
nis incognitus.

Cucumis citrulus dictus,
Germanicè Citrulen.

Cornus, vulgò cornalo ex
Theoph. 3. de hist: plant. du-
plex, quædam mascula, quæ-
dam foemina, Mas per asta-
tem, foemina autumnno fru-
ctum perficit.

Dracunculi maioris fru-
ctus, in summo caule, colo-
ris primum cineritij, mox
per maturitatem in crocum
& purpuram vergens.

Dracunculi minoris fru-
ctus, summo caule racema-
tim cohæret.

O 3 Erica

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Rotundas
baccas.

Effigie
humani

vnguis
colore

nō simi-
plici, sed

aut ful-
uo, aut

nigro,
aut her-

baceo,
aut coc-

cino.
Molli

pulpa
granis in

numeris
referta.

Velicas
pferens

colore
primum

herbaceo
mox pau-

latim ru-
bescente,

turbina-
tas, semē

intra se
clauden-

tes ruffū,
acino v-

uā tū fi-
gura, tū

magnit:
assimile.

Erica baccifera, Germanis
Hcyden / arbor fruticosa, ex
Diosc. lib. 1. cap. 100. descri-
bitur Myrica similis.

Fabarum, in siliqua ple-
rumq; semipedali, contine-
tur intus fructus.

Ficus maturescunt Iulio
Augusto & Septembri men-
sibus. Sicca officinis carica
appellantur, ē Mafsilia & Pi-
ceno aduecta sunt, ceteris
prastatiores: parua quidem,
sed gustu suauiores.

Halicacabi velicarij fru-
ctus, officinis Alkekengi A-
rabum exemplo, Germanis
Judendocfle vocatur, qui nō
nisi autumnō maturescunt,
sæpe etiam (pro clementia
cœli et soli) in fine Augusti.

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Hali cacabum peregrinū,
qd̄ describit Matthiolus lib.
4. comment. supra Diosc. cap.
69. profert velicas virides, te-
mine intus pullo erui ma-
gnitudine aut paulo maiore,
in cuius latere veluti huma-
ni cordis effigies visitur.

Hippoglossum Matthioli,
quod Fuchsius pro Daphni-
de Alexandrina posuit, pro-
ducit.

Rotūdū
fructum
pediculo
longo ap-
penitum
in medijs
folijs.

Grana ex
albo fla-
uescētia
et amara.

Poma
oblonga
cute non
crassa,
ceucitree
flauo cor-
tice con-
tecta suc-
co prag-
nantia,

Lupinorum in siliquis.

Limoniarum pomum,
Germani Lemonien / et hī Li-
monia tum facie tum facul-
tate citria referant, attamen
cittijs sunt minores.

Melones, qui & pepones,
& Melo pepones, confusane
proferuntur, ex Gal. 2. alim.
facul: cap. 4. & 5. & Paulo
Ægineta lib. 1. cap. 80. inter
se differunt figura & quanti-
tate, ut quum quantitate ex-
cellerint pepones dicantur,

Germa.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

AVGVSTO,

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Sol in Virgine.

Rotundi
mali co-
tonei for-
mam fe-
re refe-
runt.

Germani Pseben, Cum verò
rotundam formam mali effi-
gie adepti sunt Melo pepo-
nes. Germ. Melan.

Mora batti, Germani
Hindber.

Mala mustea. Germ: vo-
cant Honig apffel.

Ceterum hoc loco de po-
mis, quæ & mala vocantur
obiter notandum est. si quis
dem de ijs mentio frequen-
ter incidet. Mala siue poma
quæ nos appellamus, græci
μήλα, Germ: Apffel / diuersa-
rum sunt specierum, quæ vix
explicari & pernotari pos-
sunt, aut enim nominantur
à colore & odore ut Rosea.
Serica aurea apud græcos
χρυσόμηλα, aut à sapore ut a-
cido, acidula, dulci, dulcia,
græci μελίμηλα, Honig ap-
fel / Aut à primo insitore qui
eorum fructuum coloniam
alio deduxerat: ut à Martio
Mariana, quibus contentus
erat Domitianus in cena te-
ste Suetonio cap. 21. Ab Ap-
pio Claudio Claudiana, à
Manlio Manliana, à Quirio
Quiriana: Aut à figura ut ro-
tunda, orbiculata, Germani
scheubapffel / ab effigie mami-
mæ Germ: düttels apffel. Aut
ab esu, veluti quæ statim in-

ter edendum liquefcunt, in-
star farinæ, farinaria dicun-
tur, Meling apffel / oder Me-
ling birn. Aut à tempore, sic
Germani vocant Haber birn
& Haber apffel. Aut à patria
veluti ex municipio deducta
ut Persica à perside, apud la-
tinos præcotia, Punica à poe-
nis iuxta Carthaginem, vul-
go Granata Granat apffel /
Cydonia à cydone, creta op-
pido latine cotonea. Aut à
mense ut Augusto, Augusta
Germ: Augst apffel / & sic de
alijs innumeris pene appel-
lationibus, lectorem admo-
nemus in præsentia, ut quisq;
pro suo more imponat no-
mina quibus populus vititur:
& licet singulis agris fere
mutationes occurrunt, in-
tres tamen quatuorue, præci-
puas reduci possunt, ut Gal.
scribit lib. 2. aliment: facult:
cap. 21. Alia enim acida,
quædam acido dulcia et dul-
cia, alia insipida, aliqua au-
stera reperiri, quæ in Medico
vfu intelligenda sunt.

Nux iuglans, id est Iouis-
glans, siue Regia ex Dios. lib.
1. cap. 142. à nonnullis Per-
ca vocata, tam nota est, quam
notissima.

Pyra

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

In vni-
uersum
omnibus
commu-
ne est py-
ris ut in
turbiné
desinant.

Pyra præcocia, Germ: *Sa-
ber biern/à tempore maturi-
tatis.*

Pyra mustea, in principio
mensis Augusti, Germ: *Moss
biern.*

Pyra mellina, Germ: *Ho-
nig biern.*

Pyra Turbinata, Germ: *Rappen
biern vocant.*

Pyrorum multa & alia
sunt genera, quæ distinguit
Dioscorides lib. 1. cap. 132.
in ea quæ adstringunt, quæ
acida aut dulcia, & quæ ex ho-
rum mixtione composita
sunt: alia odora ut Apiana,
alijs Moschatula siue Mo-
schata vel Chia, Germani
*Moscateller biern/ omnium
minima sunt, quæ nos vidi-
mus.*

Pruna ex Dioscoride lib.
1. cap. 137. Syriaca & Da-
mascena tantum enumeran-
tur. Plinius & Theophrastus
etsi prunorum differentias
longius tractant, quædam e-
nim alba, nigra, rubra, ce-
reola, purpurea, viridia, ver-
sicolora sunt, quædam cras-
sa, parua, mediocria, longa,
rotunda, ovalia, quædam
dura friabilia, quædam dul-
cia, & acida, inter hæc medi-
gustus, etsi inquam innume-
ra sint differentia, in duo ta-

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

men præcipua genera redu-
cuntur, sativa nempe & syl-
vestria. Nostri itaq; pharma-
copolæ Damascena quædam
vocata, perfecte nõdum ma-
tura exsiccant, ijs in omnib⁹
tum decoctis, tum Antido-
tis confusane vtuntur, sed
hæc alijs discutienda relin-
quimus. nos hic prunorum
quorundam nomina dun-
taxat, quæ hoc mense matu-
rescunt significabimus. nem-
pe pruna sebellina, græcis
Myxa & Myssaria, fructus in
racemis prædulcis, viscida
pulpa, vnde Myxarum ap-
pellatio.

Pruna Damascena, quæ in
Damasco vrbe Syriæ nascun-
tur.

Pruna Asinina, Ros pflau-
men.

Pruna Onichiana, kleine
braune pscumle.

Rubia sativa, fructus vbi
maturuerint apparent.

Ruscus, officinae Bruscum
appellant: isti ein stocher fraut/
hat mitten rotte berle/ matu-
rus fructus in fine mensis,
aut principio Septembris.

Rosmarini fructiferi, ca-
chrys fructus vocatur.

Sam-

In glâdis
magnitu-
dine pau-
lò minor
quã ple-
raq; pru-
na sunt,
ubi ma-
turuerit
glauescit

Nigri &
rotundi.
Baccas,
rubeas et
rotundas,
intus nu-
cleo of-
seo.
Candid⁹
scaber &
oblong⁹.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.	AVGVSTO,	FORMA.	AVGVSTO,
	Sol in Virgine.		Sol in Virgine.
Racemo- si in ni- gro pur- purei. Rubex et rotunde.	Sambuci urbanae fructus, Holderber / in umbella co- haerent.	Oblongū et orbicu- latū mag- nitudine fabae simi- lis hede- rae acino- q̄nis an- gulis ve- luti ner- uis emi- nentibus in que a- curum.	Tilia foemina in fine men- sis fructum maturat, mas au- tem, nec flore, nec fructu exhilaratur.
Rubetes oxy acā- tha ma- gnitudi- ne vino- so succo referta, q̄ deuora- ta vomiti- ones ci- ent.	Sambuci Montanae siue sylvestris. Baccæ non in um- bella sicuti in urbana co- haerent, sed in racemis uix modo dependent.		
Rufum purpure- um & a- cinosum	Sambucus palustris virgif- sambuci, æmulis geniculatis alba intus medulla, sed ca- duca & fragili materie: flore albo sambuci modo, à quo Baccæ prodeunt augusto mense.		
	Terebinthina mas, quibus- dam granum viride, eo qd fructus suos in viridi palli- dior ferat, messis tempore. Pli- nius lib. 16. cap. 26. postea rufum tingit, cum vite ma- turefcit, nigrum nouissimè facit.		

P

SEP-

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.	SEPTEMBRI,	FORMA.	SEPTEMBRI,
	Sol in Libra.		Sol in Libra.
	<p>A Catia quæ in Ægypto nascitur, semen in foli- culis lupino simile profert, ex quo succus ex- pressus siccat in ymbra, ni- ger & maturo semine, sub- ruffus ex viridi eligatur, mo- dice ruffus & odoratus suc- cus.</p>	<p>Baccas rubentes oblôgas, et semini bus, seu granulis intus nu- merosis- simis.</p>	<p>Cynorrhoda, Cerm. <i>Has- genbotten oder hipffen vor- cant.</i></p>
	<p>Acatia altera, quæ in Capa- dotia Pontoq; prouenit Æ- gyptiæ spinæ similitudine longe minor & tenerior, fo- lia habens rutæ simillima, se- men lenticula minus fert Au- tumno, quo tempore colli- gendum, antea enim colle- ctum nimis validum fiat.</p>	<p>Fructus paruus oblôgus asper, a- maroq; succople- nus.</p>	<p>Cucumer syluestris, vulgo cucumer Asininus quibusdâ anguinus ex Dios. lib. 4. cap. 136. fructu solo distat à sati- uo cucumere, maturicum vi- rides esse desinant, & pallidi fiant, ex quibus fit Elate- rium, id est agitatorium.</p>
In locu- lis cône- xis seme- profert.	<p>Cupressus vel Cyparissus, tertio nunc fructum maturat, profertq; conos.</p>		<p>Chamæleam & thyme- leam Arabes, ut ex Serapione videre licet, confuse satis ac perplexe Mezereon appella- runt, cum quibus etiam Da- phnoidem siue Laureolam commiscent & confundunt, cum appareat esse diuersa.</p>
Nuces so- lidæ & al- bæ corti- ce puni- ceo obdu- ctæ.	<p>Castanæ quæ & Sardianæ glandes, aut Lopima, siue glandes Iouis appellantur, quædam syluestres, quædam hortenses sunt, Germana ap- pellatione omnes Kesten vo- camus.</p>	<p>Rotun- dum ni- grum Myr- ti bacca- rum in- star.</p>	<p>Chamælea Arabibus Me- zereon, fructum fert Myr- tibus similem: Germani <i>Sya- landt.</i></p>
Baccas oblôgas rubeas nucleo oliuæ si- mili, q. p. maturita- te fulue- scit et flo- culis intus côtinet.	<p>Cynosbata, id est Rubini- nicade quo Dios. lib. 1. cap. 106, Cerm. <i>Hasgendo: n berle.</i></p>		<p>Thymelea autem, ex qua granum Gnidium, fructum quadantenus oblôgum, qui primo viret, tandem rube- scit. deniq; exiccatus niger conspicitur.</p>

Cor

QVO TMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in libra.

Oblongas
oliue mo
do, rus
bras acer
bas ingu
stabiles
cunctis
animan
tibus.
Rubeum
oblongu
racemo
penden
tem vuz
modo.
Malu est
oblongu
& rugo
sum co
lore aur
imitas cu
grauitate
odoratu
seme ha
bet pyri.
Fructus
pmo her
hacei co
loris. tan
dem flau
pyri for
ma tur
binati.

Coruus foemina, Germani
furperbaum / fructum seu
baccas fert, Septembri & O
ctobri mensibus.

Crespini fructum, Mat
thiolus ostendit eum, quem
Germani saurach siue erbseln
vocant: maturescit Septem.
& Octob. illius opinionem
Fuchsius & Vercellenis re
ferunt in historia Oxyacan
thæ.

Citria, latine medica mala
perficauit, aut cedro mela au
rea, nemini non cognita, ex
arbore omnibus anni tempo
ribus pomifera, alijs decidu
is, alijs subnascentibus, alijs
maturantibus, ut ex Theop.
4. de historia plant. cap. 5.

Cucurbitarum satiuarum,
fructus varia sortiuntur no
mina ab ipsa forma desum
pta. Sic quædam cucurbitæ
sunt gibbosæ, ventricosæ a
liæ, aut in orbem collectæ,
longæ aliæ lagenosæ dictæ,
quæ omnes, viribus & na
tura non repugnant: decer

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in libra.

Fructum
oleæ simi
lem pro
dit, qui
cum de
hiscit pa
ditur.

Baccas
nigrascu
ematur
rit myrti
similes.
Semen
rotundu
rubens,
annexu
folijs.

Fructus
cu puta
mine fili
quæ sfa
ma pro
ximus,
præterq
quod in
versus di
uiditur
quater
nos.

puntur autumnò, & asser
uantur hyeme tota in culi
nis.

Capparum fructus, autum
no maturi, ex Alexandria &
Apulia præstantiores asse
runtur.

Dactylorum fructus, vide
palmam Daphnoides, lati
nis laureola, Germani Bey
land oder feydelbast / fructum
maturat Septembri.

Chamedaphne, quam qui
dam Laureolam marem no
minant, folijs & fructu à
daphnoide, non longè dif
fert, verum hæc tantum in
tercedit differentia, quoad
fructum, quem is profert.

Euonymus arbor, Germ:
Spindelbaum / fructum pro
fert, quem Germ. Hanenbods
le vocant.

Ebulus qui herbaceo ge
neri assignatur fructum pro
fert, ceu sambucus acinosum
& nigricantem.

P 2

Ficus

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA. SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Fructus
flau^o pin-
guis gra-
nis intus
innume-
ris.

In filijs
lentium
modo
ruffis &
paruis.

Galla du-
plex per-
forata, &
non per-
forata.

Ficus multæ sunt species, omnibus omnes notissimæ, sicca officinis Caricæ appellatur, præstantiores cæteris sunt, quæ è Massilia & Pice no corbiculis turbinatis cō-pactis, inter stratis lauri fo- lijs, aduehuntur.

Glyzerica siue radicis dul- cis fructus, pillularum pla- tani magnitudine, asperio- res modo, maturi sunt au- tumno.

Galla ex Diosc. lib. 1. cap. 123. fructus est glandi fera- rum arborum, rustica & vr- bana plebi notissimus, Ger- mani Aich apffel siue gall apf- fel / nascuntur Sole de ge- minis exeunte, & si æstui- mio excipiuntur arescunt pro- tinus nec amplius adolefcunt: ad maturitatem perueniunt in fine Septembris siue Octo- bris principio. Est verò Gal- la alia leuis plana perforata, fungosa, flaua, quæ & minus efficax ad coriarios vsus, alia solida nullo foramine per- uia, quæ Omphacitis appel- latur, efficacissima in altrin- gendo, quæ & efficacior est.

Iuglandes, id est, Iouis glæs siue Regia à nonnullis perfica vocata, Germani Welsch- nuß.

FORMA. SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Fructus
rotundus
locula-
mentis
distinct^o,
in q̄ ter-
na sunt
semina.

Racema-
tim co-
hærent.

Rubi grā-
diorē, &
oblōgio-
rem tan-
guineo
succoma-
dentem.

Primo
virides
aut sub-
uirides.
quaratio-
ne auste-
riusculi
sapore
percipi-
untur, v-
bi uero
matura,
resipiunt
melleam
dulcedi-
nem.

Lathyrus, alij Ricinum paruum, Germani treybor- ner oder spring iorner vocant, alij cataputiam minorem.

Ligustri bacca nigra au- tumno maturi.

Morus nigra, Germani schwarz Maiber / fructum fert.

Morus alba, Germ: weiß Maiber: bacca minores habentur quam in nigris, quorum facultas minime conuenit cum nigris, sunt.

Alba antiquorum nemo recordatus, quantum ipse memini aut legi, excepto O- uidio in Thisbes fabula, hæc ad sericeos bombyces agni- tissima, nullius in re medica vsus.

Oxyacantha græcè, acuta spina, latinè, & officinarum Berberis, idem à Fuchsis & Apollonario, viris doctissi- mis esse creditur, Germani Saurach siue Erbseln / qui- bus

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Sol in Libra.

Rotunda
carnosa
& succo
lenta.

bus repugnat Matthiolus, qui Oxya cantham eam putat esse, quam Germani hasegendo in appellant.

Orthomastica mala, Germanis Scheubapffel.

Perficæ mali genera non pauca, quædam enim Rhodacina putantur, Græcis recentioribus nuncupata, alijs duratina sanguinolenta, sanè, & nucleo tenacissimè adhærentia, quædam tota pulpa sanguineum colorem præferentia, quædam nucleum deserunt, alia bipartitum habent, nonnulla sicciora, alia friabili & solidiori carne consistunt quotquot igitur sunt species, communi hæc omnes appellatione Germani Pfirsing vocant.

Poma acida, Germani Weinling/quæ distinguuntur in maiora & minora.

Poma hyberna, Winter apffel.

Poma Turbinata, à Turbinæ Germani spizige apffel.

Poma rotunda, Germani Scheubapffel.

Pyra Dobelliana, à Dობella sic dicta, Germani Resgelbirn.

Pyra Falerna, Germani Spectbirn.

Fructus
suavis
dulcis ac
fuluus,
nucleo
intus ob
longo ac
durissim
mo, fru-
ctu hunc
Germani
vocant
Dattel-
fern.

Pyra volema Vergilio, à Catone sementina et mustea, Germani Psaltzgressere / in volema porro sunt dicta à vola, quod sua magnitudine totam volam implere possunt.

Pyra syluestria, Germani Holtzbirn/ oder feldbirn vocant, quæ dura autumno plerumq; fructificant.

Palma arbor est insignis, caudice squamoso, Germani Dattelbaum vocant, flores profert numerosos, albos ij antequam emergant, magno quodam inuolucro concluduntur, quod palmâ daten vocant, quo tandem dehiscente, emergunt ac panduntur, hinc subinde datyli prodeunt, qui per Autumnum cum ficibus maturescunt.

Populus, quibusdam arbor tremula, quia tremulis & inter se crepitantibus folijs constat, est verò duplex alba & nigra de sententia, Plin. lib. 16. cap. 24. & Dios. lib. 1. cap. 92. ex Theophrasto autem triplex. 3. de historia plant. cap. 14. Alba populus

P 3 est.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,
Sol in Libra.

Baccis o-
robi ma-
gnitudi-
ne in qui-
bus lanu-
go albi-
cans cō-
cluditur,
quæ ubi
maturus
erint in
pappos
abeat vel
euolat.

Baccæ, he-
deræ simi-
les, qui-
b^o semen
durum,
qd diffi-
cile euel-
litur.

Fructus
asper qui
si cortice
nudetur,
semē re-
peritur
ricino
animali
simile.

Paliurns, Germani Waldr
disteln / frutex aculeatus &
durus: vtrum verò sit Agri
folium, discrepant doctores,
fructum profert autumnò.

Peryclimenon, vulgo ma-
ter sylua, quibusdam capri-
foliū, siue vincibosco, aut li-
lium inter spinas, Germani
Wald lilien / cuius fructus po-
ma equina vocantur.

Ricinus latinis, cici aut
Croton Græc, vulgo cata-
putia maior: Germani Wun-
derbaum oder Kreuzbaum /
Septembri fructus maturus.

FORMA.

SEPTEMBRI,
Sol in Libra.

Colore
fructus
rutil^o est,
nucleos
binos cō-
tinens,
quan-
quā gran-
diori ter-
nos, &
paruulus
vnū nu-
cleus du-
rus est, &
forinse-
cus nig-
ger.

Baccas
edit ro-
tundas,
primo vi-
rides quæ
post ma-
turita-
tem ni-
gricant
aut fulue-
scunt, iu-
niperinis
baccis
non mi-
nores.

Smilax aspera, alijs rubus
ceruinus, German: Scharpff
winden nominatur, cuius
historiam persequutus est.
Theoph. lib. 4. cap. vltimo,
fructus proximus solano, at-
que melothro, & maximè v-
ux labruscæ vocitata.

Solani hortensis, siue escu-
lenti, græcis σπυγρος κνπαιδ^o,
Germani, nachtschatten.

Sola,

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

Colore primū virides mox rubras & turbintas, semē intra se claudentes rufum acino vix affimile.

Baccæ figura in folliculis hirsutis delitescētem.

Fructus racemosus, niger & rotundus.

Solanum Halicacabon, id est, vesicaria, Germ: Luden oder Juden firschen. officina Alkakengi, Arabum exemplo vocant, Septembri mense vesicas profert maturas.

Solanum, somniferū primum, quod Matthiolus lib. 4. cap. 69. describit, frutificat numerosis ramis, densis surculosisq; fractu contumacibus, folijs multis & subpinguibus, cotoneæ mali nō absimilibus, floribus subrubentibus, fructum ostendit Septembri.

Solanum somniferum secundum, fructum gignit mense Iunio, de quo vide supra.

Solatrium mortale, Stramonium Fuchsio dicta, Germani Stedhendt oder rauch opffel.

FORMA.

Baccæ oblonga oliuarum modò, primum virides, deinde subalbican-tes, posthæc aureo colore, vltimo rufescentes.

Luteum colorem referunt, priusquam mature- scunt.

Matura autē colore pallido & in latere rufescente.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Serica zezipha officinis iuiuba dicta, Dioscoridi in tacta aut non cognita, Arbor pruno paulò humilior, spinis vbiq; horret, ac riget flores pallidi, ac muscosi à quibus Baccæ oriuntur.

Sorba: fructus vulgares, quos Germ. Speyerling appellant, decerpuntur immatura ad sistendam aluum, hoc mense Septembri: ad laxandam verò aut subducendam aluum, cum probè matura fuerint, nempe Octobri. Sunt verò duorum generum, domestica & sylvestria. Ex domesticis est mas & fœmina, quæ pomorum diuersitate noscuntur, alia rotunda quæ magis grata, alia oblonga & velut ouis figura. Sylvestriū iterum duorum generum, unum sylvestre simpliciter appellatur, alterum à Plinio Forminale, quæ Octobri mature- scunt, & cibis turdis gratissimus.

Sumach

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Racemo-
sum fru-
ctum o-
stendit,
ex rubeo
purpura-
scens,
cū is im-
maturus
fuerit.
Vbi verò
maturus
acini
huius fru-
ctus ni-
gricant.
Gal. au-
tore lib.
8. simpl.
medic.
facul.

Siliquæ
latæ &
cōpressæ
in quib⁹
nuclei in-
tus flau-
seu sub-
ruffi ap-
parent.

Sumach Barbari vocant
Rhu, aliquibus Erithros ap-
pellata, semen est Coriarij,
fructus lenti similis, ob id à
Germanis Gerberbaum vo-
catur. Galeno lib. 6. com-
pos. loc. cap. 1. duplex est,
vnum tinctoribus coriorum
expetitur, alterum obsonijs
inpergitur à quibuscūq; Rhu
obsoniorum, siue culinariū
dictum est.

Siliquæ, quæ græcis Cera-
ia, quibusdam Xylocrata,
Germani S. Johannes brot/
fructificant in fine æstatis &
principio autumnī. Siliquæ
recenter ab arbore decerptæ
ingrato displicent sapore,
sed tractu temporis in crati-
bus expansæ & siccatae mi-
tescunt, & dulces euadunt.

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Fructus
subruber
medulla
ex crocea
subnigra
& acido
dulci.

Fructus
profert
rubentes
racema-
timq; co-
hærentes
vuarum
modo,
iuniperi
baccarū
magnitu-
dine, re-
sinosi du-
riq;.

Fructus
racemo-
sus pri-
mo viri-
dis, per
maturi-
tatem
ruffescēs

Tamarindi: offi: & Bar-
baris, quasi palmula Indica,
Græcis *οφθαλμικα*, latinis
acida palmula, alijs sylue-
stris palmæ fructus.

Thymelææ fructum, supra
in Chamælea ostendimus.

Terebinthus quibusdam
granum viride, quod fructus
iuos in viridi pallidos ferat,
vel quia viridem editum,
ruffum post modò tingit, cū
vite maturescit, nigrum no-
uissimè facit, ex Theoph. 3.
hist. plant. cap. 15. duplex
est. Mascula quæ est sterilis.
Fœmina fructifera, & hæc
duplex, alia fructum proxi-
mus. ruffum promit magni-
tudine, lentis qui concoqui
nequit, Alia viridem editum
post modum ruffum turgit
& cum vna maturescit, ni-
grum nouissimè, ut iam di-
ximus, facit.

Vitis alba latinè, Bryonia
& Ampello leuco Græcè.

Vacci-

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,

Solin Libra.

Baccæ in
cacumi-
ne arbo-
ris siue
fruticis
apparent
nigræ, ra-
cematim
pyrami-
dis mo-
do cohæ-
rentes.
Acini ni-
gri com-
pressi lés-
tium mo-
do.

Vaccinia nigra, baccæ sunt
hederaceis minores, ex arbo-
re ligustro, Germani arbo-
rem Beinbölzlein vocant,
oriuntur Septembri mense,
& perdurant tota ferè hye-
me, quibus aues, præsertim
merula ac turdi vescuntur.

Viburni fructus, Germani
Schlingenbaum fructus.

Vindemiam antiqui nun-
quam existimauere maturâ
antè æquinoctium, iam pas-
sim rapicerno. Quamobrem
& huius tempora notis ar-
gumentisq; signantur. Viam
calidam ne legito, hoc est in
eius siccitate, ac nisi imber in-
teruenerit, hanc ne legito ro-
rulentam, hoc est, si ros no-
cturnus fuerit, nec prius quâ
sole discutiatur. Vindemiare
incipito, cum ad palmitem
pampinus procumbere ce-
perit. aut cum ex densitate
exempto acino interuallum,
nō compleri apparuerit, aci-
num non augeri.

FORMA.

OCTOBRI, SOL

in Scorpione.

Viridis
oblongus.

Baccas
aliquan-
tulum ob-
longas et
rotundas,
Myrto
grandio-
res, pri-
mo viri-
des, tan-
dem ni-
gras, se-
men &
granum
Plinius
Carthe-
gon vo-
cat.

Fœmina.
Rotunda
forma
mediocri
pilæ simi-
lis fungo-
sa, alba
leuis &
q̄ leuior,
eo me-
lior.

Alnus, Germani Erles-
baum/fructus maturus
autumno, forma mo-
ris similis, quam plurimis
squamis compactis.

Buxus arbor folia fert, myr-
ti breuiora, floribus herba-
ceis, Germani Burbaum/
fructum Octobri, mense ma-
turum vidimus, in horto illu-
strissimi Comitum, Ludouici
Casimiri pij defuncti, de Ho-
henloc.

Colocynthis: vulgaris nos-
titur, officinis colocynthida,
alii cucurbitam syluestrem
appellant. Menses in marem
& fœminam distinguit: fœ-
mina præstantior, præsertim
si ex agro laxo arenoso libe-
ro & autumno lecta fuerit,
quàm languescere virore
ceperit in colorem luteum
mutari, immatura & his no-
tis, destituta pessima ac vena-
nosa,

Q

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.	OCTOBRI, SOL in Scorpione.	FORMA.	OCTOBRI, SOL in Scorpione.
Mas. Lanugi- nosus, ni- gricans sub asper durus grauis.	nosa, praesertim etiam si vni- cam duntaxat, tota planta colocynthidam produxerit, & in loco vliginoso, vbi ser- pentes, vel alia infecta ani- malia, abundant.	Fructus olea simi- lis, q cū dehiscit pāditur. Calycu- lo echi- nato & dammo- do hispi- do sca- bro ac ro- tundo	Cappares ubiq; gentium notæ, in acetarj; quotidiana nus vsus frequens.
1. Præssa lanugis nosa co- lore au- reo.	Cydoniorum quorum tria genera. Cydonea aurea, Bömissh fürsten.	Nuclei triangu- lari for- ma inclu- duntur, ac tenui cu- te obte- guntur. Glandes oblongæ in caly- culis q̄s cupulas vocant.	Fagi fructus, Germani vocant Buchern/ qui communis nomine glans appellatur.
2. Forma magis py- ri quam mali sūt.	Cydonea Struthia dicta, Fleine fürsten.		Glans: fructum omnium glandiferarum arborum cō- prehendit, id est ouercus & roboris, asculi, cerri, ilicis, fagi, suberis, castanearum, quæ & Sardinia glandes ap- pellantur, & si quæ sunt si- miles, licet itaq; omnes com- muni nomine appellentur, figura tamen atq; forma, plu- rimum inter se differunt. Proprie glandem nunc in- telligimus, quæ in Quercu arbore nascitur, qua saginan- tur porcorum greges. Ger- mani Eychel vnd stich eichel.
3. Forma ac facul- tate me- dia inter vtraq;.	Cydonea mustea, mellea sunt & dulcedine grata.		
Baccæ ob- longe ru- beræ acer- bæ & in- gustabi- les cūctis ferè ani- mantib;.	Cornus fœmina baccas Octobri producit, quas Ger- mani vocant Welsch firschen.		
Nuces sunt so- lidæ.	Castaneæ syluestres, Germi- Holz oder feldt kessen / qua- rum multa reperiuntur ge- nera, de quibus Plin. lib. 14. cap. 23.	Fructus racemo- sus folli- culis in- clusus.	Lentiscus, trisera cum sit arbor, ultimo nunc fructifi- cat.

Mespi-

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA. OCTOBRI, SOL

FORMA. OCTOBRI, SOL

in Scorpione.

in Scorpione.

Pomum Mespilorum, quorum tres
fert sua- nouimus species Seranium,
ue exis: groß Mespeln/ Avbwoelzlein
quo ma- Mespeln Avbwoelzlein. An-
lo nō dis- thedoni similis, Plinius hanc
simile tri- Gallicam vocat. de quibus
bus intus- consule etiam Theoph. lib. 3
nucleis, de hist. plant. cap. 12.
qua de
causa id
nonnulli
Tricoc-
con ap-
pellant.

Coreas Mala punica, siue Grana-
ceo legū- ra, cuius tres sunt species.
tur corti- Germani vocant Granat
ce extrin- spffel
secus, Acida
ruffesce- Dulcia, &
te intrin- Aulera.
secus fla- Prunus sylvestris, Germa-
uescente, ni Schleben / ex quibus suc-
innume- cus exprimitur, quo offi-
ris gra- cina loco Acacia vtuntur,
nulis an- quod videlicet refrigerat, sic-
gulosis cat & adstringit.
& ruben-
tibus.

Pyra serotina hortensia,
Germanis Winter oder dol-
birn.

Ruffa ex-
terius tu-
nica &
odorata,
albo sunt
putami-
ne, inter-
nus nu-
cleus cu-
ticula cō-
tegitur
ruffa, me-
dulla vi-
ridis, sa-
por pi-
neæ nuci-
prox-
imus.

Staphylodendri fructus si-
ue nuces, Germani Bimper-
nüggle / racematim prodeunt
e ramorum extremitatibus,
arbor hac quotannis, frugi-
fera conspicitur in Monaste-
rio Murhart, quod situm est
in Ducatu wirttembergensi.
Sorba tam domestica quā
sylvestria hoc mense matura
sunt.

DECEM

Q 2 NO

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

NOVEMBRI,

FORMA.

NOVEMBRI,

Sol in Sagitario.

Sol in Sagitario.

Cum ma-
turū est
pomum
ruber, a-
spero ta-
ctu, nul-
lo intus
ossiculo.
Baccæ ob-
longæ &
rotundæ
minores
quàm sa-
tiur.
Baccæ ob-
longæ &
rotundæ
maiores,
quæ syl-
uestres,
primo
pdeunt
virides,
appin-
quante
maturita-
te palle-
scunt, tã-
dem pur-
pureæ
prius fa-
ctæ satu-
ratæ ni-
grescunt.

ARbutus arbor, fructum
maturat hyeme, quo
& turdi & merula ma-
ximè delectantur.

Olea, Germani Oliuen/
duplex, quædam syluestris,
quam aliqui cotinon, id est,
oleastrum appellant; alij Æ-
thiopiam oliuam.

Quædam sativa, cuius de-
cem antiqui genera notaue-
runt: videlicet
Pansias.
Algianas.
Lucianas.
Sergianas.
Neuianas.
Culminas.
Orchites.
Regias.
Circites.
Murteas.

Decerpuntur omnes No-
uembri & Decembri, antea
enim non maturescunt, ster-
nuntur deinde pavimentis,
donec rugosæ fiant, moleq;
sub ponuntur, & torculari
præmuntur affusa feruenti a-
qua: ita enim oleum reddūt.
Plinius lib. 18. cap. 31. oli-
uas capiendas esse scribit fa-

Baccæ ni-
græ ro-
tundæ.

Muscosu
qualem
amygda-
la, in fili-
quis mi-
nutum,
gustu
subama-
rum.

Et vindemia, et quæ ad oleū
pertinent, quæq; ad Vergilia-
rum occasum agi debent.

Iuniperus, duum est gene-
rum, maius & minus, utrum
autem legatur non refert.
Autumno baccæ decerpen-
dæ, per maturitatem nigra,
bimatu videlicet, ita enim
fructum suorum maturita-
tem prorogat. fructu in ea
terno, eodem tempore nigro
ad maturitatē producto viri-
di maturescente & nouo ir-
rumpente.

Fraxinus, Germani Stain
esbern / fructum fert mense
Novembri & Decembri,
maiori porro copia non vi-
dimus quàm circa arcem
Walderstain / milliare distans,
à Schoendoiff.

DECEM

FORMA. DECEMBER.

Sol in Capricorno.

Bacca oleis simile coloris primū viridi, & p̄ maturitate nigro, crasse intus nucleo, ut in Rubra bacca.

Laurus odoratissima arbor, & Apollini dicata Ioui gratissima, ideo à fulgetris, nudi ex prodigio tur-
tissima: ex Dioscoride quādam tenui folio constat alte-
raliore, perpetuis vires folijs, praterquam in extremis gelicidijs, eius bacca Lorber vocantur. colligenda in prin-
cipio Hyemis, sicuti oliuæ.

Fructum Pruna Aegyptiaca, de qua Theoph. est autor lib. 4. cap. 3. historia plant. arbor insignis magnitudinis. florere incipit mense Iulio, fructum circa Brumam perficit, nec folia dimittit.

FORMA.

ARBORES

ARBORES

quæ per integrum

annum fructiferae sunt.

Fructus rotundi sorborū ferè magnitudinis, q̄ p̄mo exoritur virer, deinde

flauescunt maturi verò rubent, aspero tactu nullo intus osiculo fragorū modo.

Rotunda per maturitatem aureo colore nitida.

Arbutus per hyemem perpetuis virescit frondibus, fructus anno integro maturefcit, ut simul hūc haberi, atq; alterum florere sponderi contingat. Theophr. lib. 3. cap. 16. de hist. plant. autore.

Aurantiarum, Germani Bomeranzen/ Arbor semper pomifera est, & eadem ferè quæ citria præstat.

Cedrus arbor magna, ex qua picem colligunt, quæ cedria vocatur. Est autem cedrus alia maior, καρπὸν δὲ ἔχει ὠσπερ κνπὰρ ὁσσὶ μακροτέρου μὲν παρὰ πολὺ λεγέται δὲ. Alia cedrus est Phœnicia iuniperi modo baccas parit.

baccarum Myrti magnitudine rotundas. Tertia est Cedrus

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA. drus Lycia, quæ iuniperum paruum quadantenus refert, Dux posteriores omni tempore fructum gerunt.

Citria mala aut Cedromela, Germanis Citrinat dñf fel/ ex Theoph. lib. 4. hist. plant. cap. 5. arbor toto anno pomifera describitur.

Iuniperus, fructum per biennium prorogat, antequam bacca nigra maturefcunt, Autumno bacca decerpentur.

Pinus latine, *πίτυς* Græcè, *Harzbaum* / *Fichtebaum* vñd *Bünholz* Germanicè, ex Theophrasto lib. 3. cap. 10. hist. plant: duo genera pini describuntur, Domestica & syluestris. Domestica pinu in Germania caremus, fructum profert, quem Græci *σπόδιον* vocant, Gal: libro 2. aliment: facult: Nux pinea boni & crassi est succi, habetur copiosa hæc domestica, pinus iuxta littora Adriatici maris, & quibusdam Italix locis arborefcit.

Syluestris pinus plura habet genera, quæ in Alpina siue montana & maritima diuiduntur. Montanorum tria genera, è quibus syluani homines parant picem, Germani *Harz* / vocant, & lig-na pinea quæ nos Germani

FORMA. *Bünholz* vocamus. Nuces minores, hæc omnes quam domesticæ sunt cupreis paulo maiores, longiores tamen, ac compactiores, squamis compactæ, resinosa ac odorata. Mariorum verò duo genera, quæ tantum magnitudine & paruitate differunt. Omnia in vniuersum genera resinam albam & odoratam mittunt, in tædam vertuntur, & picem nigram fundunt. Estq; præterea pinus toto anno pomifera, quo enim mense ex ea nux decerpitur, eodem maturefcit, alia & sic dispensatur, ut nullo non mense maturefcant.

Abies latine, *ἰλάρη* Græcè, *Tannen* siue *Tannenbaum* Germani vocant, ex Theophrasto lib. 3. cap. 20. hist. plant in masculum & feminam distinguitur, à Mathiolo sterilis in Ananienfibus & Tridentinis montibus notatur, à Plinio verò fructifera, conis oblongis, in quibus semen sub album, nulla intus medulla.

Hedera minor *Helix* vocata, sterilis est, raro hæc arborescendit, sed authumi repit, aut saxa, macerías sepes & aggeres occupat, folio trique-

60
QVAE FRUCTVM ARBORES NON FERVNT.

FORMA. triquetro, maculoso, perpetua fronde viret.

Populus alba sterilis est, flore & fructu Matthiolo. Galeno autem fructifera, lib. 2. comp. pharm. part. cap. 1. populi albae (inquit) fructus cum aceto, tritus discus foris facultatis est.

Rosmarinus mas sterilis est, Theop. lib. 9. cap. 12.

Tilia mas sterilis est, flore & fructu.

Terebinthus mascula sterilis est, Theoph. lib. 3. cap. 5. autore.

Novellae arbores carent fructu quam diu crescunt, aut si fructiferae, facillime tamen perdunt ante maturitatem.

Perdunt & facillime ante maturitatem fructus.

Palma siue phoenix.

Ficus.

Malus.

Pyrus.

Punica.

Perfica: quae etiam roribus nimij & pruinis florem amittunt.

Magna inter doctos de radicibus effodiendis controversia est, non enim desunt qui eruendas semper autumno esse censent, ut Dioscorides, cui in quibusdam Galenus, Auicenna & Me-

FORMA. sues contentiunt, alij vero ineunte vere, eo quod plantae nondum caules, folia neque flores emisserint, à quibus omnibus radicum succus exhauritur.

Plinius lib. 28. cap. 13. effodit antequam fructus, aut semina maturescant, quod diuersis temporibus accidere videmus.

Quamquam rationi consentaneum videtur, autumnales radices omnes paucioris esse succi, quam vernaes, quod videlicet paucio ante tempore, & caules, & folia, & fructus emisserint, ob eamque causam putrefactioni minus sint subiectae, longiusque asservari possunt, attamen cum eo tempore defluere incipiant folia, stipitesque tabescant eas radices nunc foetis animalibus dico esse similes, hoc est semi animas ac multum imbecillas, tristesque incipiunt fieri cum sensim deficiat humor, nisi, si quae tantum habebant virium, ut etiam earum satis retineant, arefacto caule, ut Scylla, ceu animalia valida, etiam foeta adhuc robusta permanent, veluti & in herbis aut arboribus, quibus folia nunquam decidant.

Econtra

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.

Econtra, quæ veris tempore radices erodiuntur, licet humore copiosiore abundat qui paulò post in folia, flores & semina abeit, attamen cū longè minus sint concoctæ, his quæ autumnò leguntur, corruptioni ideoq; magis erunt obnoxie, præsertim si quæ longo tempore conservari debeant.

Cum igitur nec nimis humida, siue recentia satis firma sunt, præsertim quæ nimio humore turgent, nec nimis vetusta commoda. Restat igitur, ut cum Plinio eo tempore radices effodiamus antequam in semina aut fructus transferint, hoc est ex adultis tum vigentibus, nondum lignosis aut tabescentibus, quo tempore enim medicamentosa sunt, maximæ & validæ, veluti ea omnia quæ augescunt, & robur accipiunt, calidiora & fortiora sunt. Hippocrate in libro de natura humana, autore, ferius enim aut tardius si eruantur radices, quando iam matura semina, aut iam defluere incipiunt folia incrementum omne absunt, summæq; vires deficiunt, foetis et infœcundis animalibus similes, quæ sunt exangues & frigidae, non amplius sentiunt gaudium annorum, li-

FORMA.

cet putredini minus sint obnoxie, seu ossa & dura corpora ob siccitatem, imbecillitati tamen non vacant, nisi si quæ sunt bisera, aut trisera quæ repullulant saluam vitam, quod in herbis segetum accidere videmus, aut quæ nec semen aut fructum generant, hæ omnes effodiendæ antequam folia incipiant marcescere: hac ratione itaq; singulis mensibus, et temporibus diuersis, cum adhuc sint succolentæ & validæ, euellendas esse statuimus, serena præsertim cœli constitutione, nō squaloribus imbribusque infesta, ne extraneæ humiditate perfusæ aut imbutæ corrumpantur, vel ex succæ & humido nativo carentes exarescant. Integræ itaque ac abunde nutritæ, ut ex Galeno libro 1. de antid: cap. 12. elici debent, quæ convenientem magnitudinem, non excefferint: aliter enim nimia succi copia turgent, peioresq; ijs sunt, quæ bene quidem nutritæ, minorem sunt naturæ corpulentiæ, virtus siquidem naturalis radicibus, ab initio à cœlesti influenza infusa in ea quæ vulgaris amplitudini debetur proportionem, postea in vasti corporis mole dispersa, æquali

61
QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA. aequali potentia sui opus FORMA.

robore nequit ostendere, quē
admodum in corpore me-
diocri. Maior in exiguo re-
gnat, nam corpore virtus.
Virtus enim (ut Philosophi
loquuntur) coacta seu unita
fortior est seipsa dispersa.

IANVARIO,

Sol in Aquario.

R FEB.

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.

FEBRVARIO,

Sol in Piscibus.

FORMA.

MARTIO, SOL

in Ariete.

Bulbosi.

Bulbi radices effodiendae ante Ver, aut deteriores illico fiunt, signum maturitatis folia in arescentia, ab imo vetustiores improbant item paruos & longos. Plinio autore lib. 19. cap. 16.

Sit muscæ cadidus, & odoratus optimus in cedrina arbore, proximus populea, nigricans improbat.

Lanugines arborum, quas Germ: Mößig/ Galli/ Marçant/ officinæ Arabas secuta vsneam, siue Bryon aut Muscum vocant, medio mense Martij colliguntur, maceranturq; in aceto ficcantur, & vsui adseruantur.

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.

APRILI, SOL

FORMA.

APRILI, SOL

in Tauro.

in Tauro.

Bulbosa
radix plu-
ribus co-
tecta tu-
nicis ip-
sisq; sub-
flavescenti-
bus gla-
dioli mo-
do.

Corpu-
lata, ple-
na, à ca-
pitulo ce-
pæ simili
cohareret
radices
tenues &
confi-
brata.

C Roti bulbi, eruuntur
quarto quouis anno,
verno tempore, seruan-
tur tota æstate in horreis &
seruntur, florem ante folium
redit per autumnum in Ver-
giliartum occasu, non ultra
mensē, quibus decidenti-
bus folia angusta, penē ca-
pillamenti exilitate tota hye-
me virent.

Elleboni nigri, vere &
messis tempore erui debent,
celeriter autem effodiendæ,
quoniam halitu aggrauant
caput, quapropter ad id ar-
cendum, foliuri allium præ-
sumere, & bibere vinum de-
bent.

Fungus, Germ: Schwam-
men oder psserling / quem
Calenus lib. 8. simpl. med.
facul: plantam appellat: sin-
gulis annis primis imbribus
erumpit, Vergilio lib. 1. Ge-
orgico: teste, qui porro inno-
cuius habetur inter omnes,
hunc nos Germana appella-
tione Nothhen nominamus.

Fungi verò porcini per-
nitiosi reperiuntur, ut testa-
tur Diosc. lib. 4. cap. 78.

Hyacinthi radices, tam
maximæ, quam maiores, ne-
dum minores, Aprili mense
effodiendæ.

Scylla

radicem,

maximè

effodimus

in ipsa

prima

fo-

liorum

germinatione,

simul

& caulium

arefactione,

quod

ter in anno

accidit,

eo quod

ter floreat,

triaq; tempora

sa-

tionum ostendat,

primo fit

in Aprili &

Maio,

secundo

Iunio,

tertio Septembri,

aut

principio Octobris.

Calenus

1. de antidotis cap. ultimo,

de usu Theriacis ad Pam-

philianum messis tempore,

quo præcipuè uigeat colli-

gendam inuere videtur. Hæc

scilla ex Varrone tam alba

quàm rubra: est & femina

nigris folijs ex Plinio lib. 20.

cap. 9. Candida Scilla utilis-

sima est.

Hermodyli radix, vere

legenda est, & per sex mens-

es sicca ante vltimū seruand-

da. Cæterum hoc loco admo-

nendum, quod officinarum

Hermodylus, qui duplex

est, reuera sit Colchicum, &

sanè venenum, quantumuis

peregrino vtantur. Alter ca-

staneæ effigie orientalis di-

ctus, intus & extra candidus,

alter cortice foris è nigro

rufescente. Colchicum est

Græcorum, ab vtrisque igitur

post hac se caueat pharmaco-

pai, tanquā à præsentissimo

R 2 vene-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA

APRILI, SOL

in Tauro.

& q̄ in loco pin-
gui pue-
nit quæ
autem
Scyllæ
aut Ras-
phano
proxima
creuit,
præstan-
tior.
Recens

subnigrū
& in ru-
brum in-
clinans,
rarū gra-
ue, si fra-
ctum ex
rubro &
glaucō
alternat,
si mansu-
um vel aliq̄
liquore,
solutum
croci mo-
do tingit

veneno, de quibus plura lege-
apud Vercellensem medicū,
virum doctissimum, Radio
primo, folio 103.

Rhabarbarum, radix illa
illustris ex Mesue quoddam
est Indicum, qd̄ & sinicum,
alterum Barbarum generis
nomine appellatum, tertium
Turcicum omnium ignobi-
lissimum, ut Indicum est præ-
stantissimum, effodiuntur
radices in ipsa prima folio-
rum germinatione, vere ine-
unte, quo tempore succosa
sunt maximè, radices repur-
gantur & secantur in partes,
a sectione, quas seruare so-
lent, non statim filo suspen-
dunt, ne succus guttatim stil-
lans deperdatur. Imo asseri-
bus collocant, vertuntq; ac
inuertunt quotidie, pluries
hoc enim modo incrassatus,
succus in radice seruatur.

FORMA

MAIO, SOL

in Geminis.

Tenuēs
& obli-
quas.

Rad: mul-
tas & te-
nues.

Radix
circa cau-
lem spō-
giosa, à
qua nu-
merosa
oriuntur
fibræ el-
lebori
modo al-
bicâtes.

In globū
extubes-
rat.

Digitali
crassitu-
dine in-
curuata
genicula-
ta caudā
scorpio-
nis amu-
lans.

A Sarii radices, Germani
Baselwurz.
Allij vrlini, Germa-
ni Wald knobloch / quod in
nemoribus prouenit.

Asparagus syluestris & al-
tilis, qui in hortis passim se-
ritur, Germani spargen vo-
cant, officinæ spargum, id
est, tenerem cauliculum, vere
ineunte prima germinatione
prodiens in fasciculos dige-
tus, quo aqua aut iure elixo,
postea aceto intincto pipere
asperso vti magno gula de-
lectamento cōluuimus, no-
tior est quam ut multis de-
monstrari debeat: Syluestris
distinguitur ut in palustrem
montanum, & petreum quē
Dioscorides propriè corru-
dam vocat, Radices Maio
effodiendæ.

Apij vomitorij, Germani
Erdnuß / exterius nigra, in-
terius candida, pyri effigie.

Aconitum pardalianches
Dioscoridis.

Aconitum

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.	FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.
Brachia- ta supe- rius, & genicula- ta est.	Aconitum pardalianches, Plinij qd ima parte caudam scorpionis refert.	Supernè singula- ris, infer- nè in multa	Chelidoniij maioris siue hirundinariz radix.
Fibrosa. genicula- ta grami- nis mo- do, ex qua folia et germi- na erum- punt.	Aconitum pardalianches Theophrasti, radicem effigie scorpionis integram haber.	crocea ca- pillamè- ta fibrans tur.	Chelidonium minus, qd triticum sylvestre quidam nuncuparunt.
Radix ra- mis mul- tifida & flexuosa.	Aconitum pardalianches minus, quod aliud non esse, nisi Doronicum officinaru, Matthiolus putat.	Radices habet ex eodè cal- lo cõplu- res, pulile- las in gra-	
Longa et subflava.	Boni Heinrichi radix.	noru tri- tici, mo- dũ acer- uatim cõ- gestas,	
Tenuis ut ellebori.	Betonice radix.	quarum tres aut	
Alba & crassa.	Chamedrys vulgaris, mas- & femina.	quatuor in longi- tudinem exeunt.	
Capillo- sa & fi- brosa.	Caryophyllate sylvestris.	Dulces	Gramen siue Agrestis Dio- scoridis multiplex et si sit, il- lud tamen eligimus, quod geniculatos per terram ser- pit ramulos, & ab jis.
Nume- rosa ra- dices.	Consolidæ maioris.	genicula- tasque radices spargit.	Geneste Maio & Iunio mensibus effodienda.
Radix la- teo suc- co plena,	Consolidæ medix.	Sublutea	Genestellæ.
Cicho- rio pxi- ma, sed longe a- marior.	Dens Leonis, quibusdam caput Monachi, Germ: rorle fraut. Plinio Cichorium ip- sum appellatur.	Sublutea Oblon- ga & sub lutea.	Geranium primum cum floribus purpureis, radix.

R 3 Gera-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.	FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.
Tenuis longa.	Geranium 2. cum floribus subpurpureis, radix.	Radix tenuis li-	res. Altera folijs gladioli longioribus, folijs constat
Radix in tus viri- dis.	Geranium 3. tenui folium & floribus purpureis.	gnosa ge niculata subruffa,	nouem purpureis, quorum extima superiori tantum parte aureis pinguntur lineis.
Intus cā- dida, ex- trinsecus sublutea.	Geranium quartum, cum floribus purpureis, ex quibus capitella rostrata gruni ca- pitis instar prodeunt.	in odo- rag.	Germ: vocant, Blaw Schwer- tel wurz/ Blaw gilgen/ Veyel wurz/ Radices Mesues collig- git vere. Dioscorides incipi- ente foliorum defluuio, qui- bus sese interponit Plinius, qui effodit, dum est in suo vigore vel flore.
Tenuis capillo- sa.	Gnaphalum tormentosa, planta & incana, quibusdam herba Sancti Christophori, vel filius ante patrem, folijs albis, radix.	Longas laxas fi- bris ca- pillamē- tisq; re- fertur.	Lilij conuallij, radices demittit.
Radix ge- niculata dura ali- às solida odorata, melior est illyri- ca, quæ pumila, densa fra- ctuq; cō- tumax est sub- ruffa co- lore gi- stu ama- ro.	Iris Domestica, officinis Ireos ex Dioscoride lib. 1. cap. 1. à celestis arcus simili- tudine cauø cauliculi sinu nomen accepit, flores in su- mitate cuiusq; caulis varij, siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei & cerulei cō- spiciuntur.	Radix al- ba oblō- ga, mol- lis rotun- da odo- rata cibo non in- suauis.	Myrrhis simillima est ci- cutæ, ideoq; Germanis Wil- derforffel appellatur, passim apud nos in hortis proue- nit.
	Iris vel Ireos syluestris, quæ duum est generum, vna, satiæ per omnia similis, ni- si quod radices graciliores	dulcis. Duplex bulbosa, longa, & rugosa.	Ornithogalum, Maio mense cum terra vomere ab agricolis prosciinditur, inue- nitur. Orchis mas, radix. Orchis femina, radix. Oro-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.	FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.
Radix digiti crassitudine.	Orobanchis cauleculus, est sesquipedalis, & interdum maior subruher hirsutus.	Multis capillamentis tenuis.	Prunellæ radix.
Radix amara & crocea.	Oxylapathum, officinis lapacium acutum, vulgo rumex ex Diosf. lib. 2. cap. 105. quadrifariam distribuitur, Galeno trifariam. primum palustre Dioscoridi Oxylapathum vocatur, quod folia in acutum desinant.	Crassa longa calida odorata. Parua alba exigua multis capillamentis.	Petasites Fuchlij in principio mensis colligenda, hæc plantam Matthiolus pro Tussilagine maiori pingit.
Radix longa insignis amaritudinis coloris ex rubro et croceo diluti, Rhabarbaro affinis.	Secundum satium, folijs minoribus pluribusq; cauliculis, plebi lingua Hippolapathum, nunc ubiq; Rhabarbarum monachorum, alij pro Rapontica habitum.	Oblonga nodosa, exuberat. Bifurcata ramulis referta.	Ranunculi lutei hortensis.
Capillosa multifida.	Tertium genus sylvestre, paruum plantagini proximum humile & molle.	Digitocrassitudine longa alba.	Ranunculi lactei floris.
Longa et subflaua.	Quartum oxalis siue Acetosæ, quia gratum saporem palato representat.	Geniculata radix graminum similis.	Ranunculi lutei sylvestris.
Longa digitigrassa alba.	Paeonia mas.	Intorta uel obliqua adnatis fibris.	Rapunculi, Raptinzel Ger. radice in acetarijs vimur, Sunt qui pro Rapo sylvestri Dioscoridis pingunt, à quibus Matthiolus dissentit.
Balani circiter 6. aut 8. adheret.	Paeonia foemina, utraq; de crescente luna, effodienda contra epilepsiam.		Rusci germina aspargi modo veris tempore colligenda, quæ elixa manduntur ex oleo, tale & aceto, radix acerba & subamara.
			Sparti siue Spartij radix.
			Sani

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.	FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.
Radix ru- bris sur- culis ac capillis. Capilloz sa ac sur- culosa. Multis fi- bris ca- pillata, eiq; mul- ta Coria- dri quan- titatem referētia grana ad- herent. Radix bulbosa mali ma- gnitudi- ne, fulua- intus, ut ouum cā- dida gu- stati dul- cis & ori- non in- grata. Cortex radicis gracilis, ruffus, in- tus autē albū in- cluditur.	Sanicula maris, quæ à Matthiolo pro quarta specie pentaphylli ponitur, quibus- dam Diapensia vocata. Saniculae foeminae. Saxi fragi albi radix, offi- cinæ non sine magno stupo- re grana adnata huic radici, pro semine vtuntur, cum se- men in caulium cacumine proferatur. Satyrii radix vera, officinis, testis vulpinus, desideratur. Satyrium, Erithonion siue Erithracion, id est rubrū, se- mine lini maiore, duro, leui, splendente. huius cum duæ sint species, prima accipien- da erit Serapioni testiculus vulpinus, Galen. 9. de simpl. triphyllon appellata, eius ra-	Radice bulbosa oblonga oliuæ mo- do angu- sta dupli- ci ordi- ne: supe- riore quæ plenior est, inferi- ore, quæ mollior ac rugo- sior. Radice bulbosa 5. aut 6. interdū 7. depen- dēt. Ma- ris radix flauescit, citra al- bedinem foeminae verò fla- uescit cū albedi- ne. Radice per om- nia ro- tunda.	Radices nuperrimè defossæ, aut saltem recentiores immittē- dæ, confectiōni nimirum. Est & Testiculus caninus, gracis Cynosorchis, in pralis nostris affatim luxurians, hanc supra orchim appella- uimus, Germani Znenen, frant/ qui testiculus caonius, Satyrii inopia, sub duplo sa- tisfacere poterit, vegetiore et maiore testiculo accepto, floccido autē & rugoso ab- iecto. Calidus enim & siccus est, qui venerem coercit & reprimat. Satyrium Basilicum, ra- hix humanæ manus simili- tudinem refert, vulgo pal- ma Christi, Germani Kreyß- blumen / à radice appellatio- nem sumpserunt, quæ inter- dum 5. aut 6. profert radi- ces, instar manus ramosæ. Et hæc planta duplex mas & foemina, siue maior & mi- nor. Est & Testiculus qui Sera- pias Andreæ dicitur, porra- ceis folijs caule palmeo, li- liaceis floribus purpureisq; respon-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.

MAIO, SOL
in Geminis.

respondentibus, seminibus rotundis miranda serie in globos duplici, triplici; cornu digestis, pro Satyrio substituendus, Germani vocant Ragwurz / & huius duo genera mas videlicet & femina.

Urtica nulli non cognita, cuius ex Dioscoride duo genera statuuntur, vnum sylvestre quod est asperius, nigrioribus foliis, semine lini, sed minore, alterum non aque asperum, minuto semine, utriusque radix Maio & Iunio effodienda.

Thlaspi radix, ex Diosco. lib. 2. cap. 150.

Oblonga
radix &
fibrosa.

Magna
utilis in
Ischia
morbis.

FORMA.

IUNIO, SOL
in Cancro.

A Canthus sativus verus, Germani Welsch bernfle.

Acanthus sylvestris, longe distans à Sphodilio sylvestri, radix ad eadem, ad quam superior efficax est. planta Scolymo similis, brevis quam sativa.

Aquilegia radix.

Acorus verus, cuius radicem quidam Calangam esse putant, ut Braslauolus Mauritanos secutus, quidam ut Manardus & Matthiolus Calamum aromaticum, quorum sententia magis mihi placet, quod & Aquarius in sua compositione Theriacis confirmat.

Acori palustris, alio nomine pseudacorus, Germani Gelbwasser lili.

Aeonitum, Lycostonum, Seplasi, Lupariam hodie appellare solent, Germ: Wollswurz / Matthiolo Aconitum secundum in ordine erit.

Longa
mucosa
rubra &
glutinos
ta.

Crassa.
Radix
densa
candida,
plena, ca
rie non
exesa, o
dorata,
que ex
Galatia
& Col
chide af
fertur.
Densa,
candida
& geni
culata.

S Aspho-

QVO TEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA.

IVNIO, SOL
in Cancro.

Bulbosa
radices,
oblongae,
rotundae,
glandib'
similes
quae in-
terdum
80. exce-
dunt Pli-
nio au-
tore lib.
21. cap.
17.

Rotundae
radix in
orbem
conglu-
bata rapi-
modo.

Longae
verò di-
gitis cra-
ssitudine
& longi-
tudinem
implet.
nonnun-
quam
paulo
maiores.

Longio-
res tenu-
es crasso
cortice,
odorato-
q; vestis-
tas.

Asphodelus vel hastula
Regia, ex Diosco. lib. 2. cap.
164. hac officina in Ger-
mania omnes carent. nam q
hactenus usurparunt, duntaxat
Lilij genus.

Aristolochia, tria sunt ge-
nera, ex Diosco. lib. 3. cap. 4.
Rotunda foemina vocatur.

Longa, mascula, nonnul-
lis Dactylitis, longiore, qua
rotunda folio.

Est etiam tertia Aristolo-
chia longa, quae Clematidis
vocatur folijs subrotundis,
minori semperuiuo similis
floribus rubeis, Radices.

FORMA.

IVNIO, SOL
in Cancro.

Cōtorta
oblonga
& inuo-
luta.

Oblonga
densa, tra-
ctu con-
tumax
radix est.

Simplex
radix, sed
fibrosa.

Radice
longa sa-
pore ama-
riusculo,
simul &
acri.

Radix
oblonga
paucis
fibris.
Intorta
candida.

Bistorta mas.

Bistorta foemina, Germa-
ni vocant, *Watter wurz*/ v-
tramq; Scplasiarij radicem,
falso serpentariam nomina-
runt, Radices.

Cyperi, Germani wilder
Galgan / Et si vnus tantum
meminit Diosco. generis plu-
res tamen hodie reperiuntur
radix est. Cyperi.

Curcuma, quae & inter
Cyperi radices, odoris gra-
tia reperitur.

Chamamilla, Graecis An-
themis, radix quoq; siccari
debet, dumq; ingruit neces-
sitas, autore Diosco. cap. 137.
lib. 3.

Carum officinis, vulgo ea-
rui planta in pratis omnibus
notissima, Germanis. *Watt-
fūmich*.

Cynoglossi vulgaris flori-
di, Germ: *Hundezungen*.

Campanula.

Chamedrys siue Trifago,
Germani Chamederle & Bat-
tengel duplex, vnam quam
describit Theoph. lib. 9. cap.
10. cuius radices pars supe-
rior, p superiora, hoc est, per
vomit

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.	FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.
Radix multifida, & albicans.	vomitum, inferior pars per secessum siue inferiora, purgat.	Radix digitali crassitudine, & dodrantalis longitudine adole- scit.	Daucus primus, quem Diosc. lib. 3. cap. 69. creticum appellat, Germ: Berwurz/ nascitur & probatissimus in sylua Turingiz, non procul à Sula oppido in monte excelso, & syluis Martianis, vulgo Schwartzwald.
Crassa in latis col- libus.	Chamedrys altera ex Dio- scoride lib. 3. cap. 96. folijs est quernis, flore purpureo.	Radix oblōga, extrinse- cus ni- gra, in- trinsecus alba, su- perius fi- brosa seu capillo- sa.	Daucus secundus, folijs la serpitij Germ: Weiß hirtz wurtz / hic reperitur in mon- te non procul à Tubinga, di- cto Spitzberg.
Gracilis in mon- tosis, in profun- do alba, aliquate- nus aro- matica, grani o- dore, dul- cis, Ger- mani E- berwurz.	Chamæleon albus, ex Diosco. lib. 3. cap. 8. quibus- dam Ixia vocatur, quod cir- ca radices in locis quibusdā viscum inueniatur, quo pro Mastiche vtuntur mulieres, flores habet purpureos, velu- ti papporū, lanugines emit- tit, semen Cnico simile, radix pro ratione loci diuersa.	Digiti crassitu- dine & longa.	Daucus tertius, qui passi- nacz syluestri similis est. Ger- mani schwarz Hirtzwurz.
Radix crassa, ni- gra, den- sa, inter- dum ex esa, quæ dissecta flauescit, & com- mandu- ata mor- det.	Chamæleon niger, Germ: schwarz Garten distel / folijs scolymo similis, in umbella flores spinosi, tenues hyacin- thi æmulos, versicolores.	Radix ni- gra digi- to tenui- ore.	Ebulus radix longa. huius interdum vtimur, ut sambu- ci, cortice medio flore & fo- lijs.
		Oblon- gam di- giti cras- situdine.	Echium, Germ: Wildt och- senzungen / alio nomine Al- cibiacum appellatum ab in- uentore, author est Nican- der, Echion autem dictum, quod resistat veneno.
			Eringij radicem, effodimus in monte Lympurg, propè Halam Sueuorum.
			S 2 Erucæ

QVOTEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA	IVNIO, SOL in Cancro.	FORMA	IVNIO, SOL in Cancro.
Candida capitulata.	Eruca sylvestris.	Radix longa, mediocriter crassa & rugosa, dura lignosa, que foris nigra, intus subviridis.	Imperatoria folijs sphondylis minoribus, solo acubantibus, robustis, hirsutis, ac asperis, in cacumine umbella floribus candidis.
Radix magna, in multa capitula extuberans.	Filipendula, Dioscoride Oenanthe dicta, folia pastinacæ similia habet.	Longa et fibrosa.	Intybus sylvestris duplex, prima picris, quæ & Cichorion vocatur, Germani: Wegwarten.
Radix longa crassa amara.	Gentiana maior, copiosa nascitur in monte Hewberg/ qua itur à Balinga, oppido ducatus wirttembergensis Duttlingam.	Longa et fibrosa.	Altera, folio latiore laetusa similis, solo strato.
Graminis modo obrepit ex albo, qua erumpit sub rubra.	Gratiola radix, vehementer amara. quibusdam gratia Dei nominata.	Multi-fida crassa longa, digitis crassitudine.	Limoniij veri, Germani Holz mangolt wurzel / hanc radicem officina falso pro Ben rubro usurpant.
Radix magna, alba non strumosa ut scrophularia.	Galiopsis latinè, item Galiopsis, siue vrtica labeo, & vrtica foetida. longè à scrophularia distans, Galeopsis officinis incognita.	Radicem longam & simplicem.	Limoniū secundū, folia pauciora habet, quam Theophrastus lib. 6. histor. plant. cap. 3. inter beram sylvestrem numerat, Plinius lib. 20. cap. 8. Limonium vocat.
Intorta punicea.	Hepthaphylli radix.	Oblonga crocei intus colore radice.	Lalerpitij, officinis Magistrantia, Ostrutij vel Astrutij Germani Meisterwurzel nominatur.

Lilij

67
QVO TEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.	FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.
Radici- bus ni- tuntur bulbosis, albican- tibus eōs pactili se- rie squa- marum sursum spectan- tibus.	Lilij albi. Lilij crocei.	Obliqua & capil- losa. Subalbi- cans.	sis, aut apij, de qua re latius cōsule Vercellensem, virum apprime doctissimum. Ra- dio primo. Pes anserinus, radicem habet.
Radix bifida, ca- pillosa, seu fi- brofa.	Marrubij ex Theoph. lib. 6. cap. 2. hist. plant. duo genera. primum, Marrubiū album, Germanis weiß an- dom/ folio est herbido. alte- rum Marrubium nigrum, Diosc. lib. 3. cap. 100. Bal- λων dictum, Germ: schwarz ger andom.	Radix candida, arundis nacea te- nera, sū- ma tellu- re vagā- te crebris articulis genicula- ta, densa & odore gravi.	Pyrolæ radix non alte de- scendit in terram, errant qui hanc plantam, quam Ger- mani vocant Winter grūn/ Limonium genuinum fa- ciunt, differuit de hac re Mar- thiolus. Polygonati, Seplasijs si- gilla Salomonis dicta, vel S. Mariæ, Germani weißwurz.
Radix vna sed fibrosa.	Parmica, latinis Sternu- tamentaria, ob saporem a- crem quem habet, quidam pyrethrum vocant. Pes Leonis Fuchsi, Mat- thiolo stellaria dicta.	Radix mollis & lenta.	Sphondilij sylvestris, plan- ta & radix frequentissima in pratis vliginolis, & quā quidam pro Acantho Ger- manico olim depinxerant, Scrophulariæ maioris ra- dix.
Obliqua fibrosa.		Magna & stru- mosa.	
Longa subrube- scens.	Pentaphylli latini, quin- que folij Dioscoridis, hodie autores adhuc tres species obseruant, prima prior non absimilis, verum hirsutior folijs, flore candicantibus. Secunda pumila, sub albida ad terram, ut plurimum re- pens, quarta folijs vitigino-		S 3 Spinam

QVO TEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA.

IVNIO, SOL

in Cancro.

Spinam albam, quam quidam Carduum benedictum putant esse alij Carlinam imperatoriam, id est, album chamaleontem, Fuchsius p Spina alba Carduum Diuæ Mariæ pingit, Germani *Sedz distel* / Matthiolus aliam ab his longè diuersam ostendit, folio chamaleonti similis, spinis rigentibus, caule bicubitali, in cacumine echinus subalbidus, intus flos purpureus, semine Cnico simili, in montibus vbi piceæ syluæ, Iulio mense conspicitur, pro inopia huius radices vti licet ea, quæ Carduus Mariæ dicitur, donec altera sese ostendit.

Radix cardui Mariæ dura & amara.

Subcandida.

Radices crassæ, & longæ.

Crassa.

Saxifragæ luteæ.

Sanguisorba maior.

Sanguisorba minor, quam sunt qui has plantas, & pimpinellas vocant, attamen cū viribus inter se plurimum distent, ratio nominis diuersa imponere iussit.

Scabiosa, quæ cum Maio & Iunio ad Octobrem vsque florescit, per totum hoc tempus valida erit radix, sicuti et reliquæ omnes plantæ, quam diu florent.

Est & pseudo scabiosa le-

FORMA.

IVNIO, SOL

in Cancro.

gitimæ adeo per similes, & iisdem locis agnascens, ut primo intuitu peritissimos, etiā herbarios fallat. verum crassior tota est, nec amarescit, nec adeo hirsuta.

Radix foris nigra int^o subalbida, succosa, odorata fauces mordicans.

Magnā oblongā q̄ ad purgandas lanas cōciditur.

Radix tenuis obliqua.

Radix crassa & nigra, effoditur secundo aut tertio anno à satione.

Obliqua & fibrosa.

Smyrniū Fuchsi, quod Germani *Libstickel* vocant, Mathioli Hipposelinum est, ut & supra monuimus.

Smyrniū Mathioli exterius nigricat, interius ex albo virescit, succosa & odorata.

Struthium, vulgo Lanaria Germani *seyffen fraut* / radicem habet.

Staphisagria, vulgo strusaria siue herba pedicularis, in Germania nobis frequentissima.

Strobilus siue Carduus aut cinaria latinis, Scolimos grecis, Germanis autem *Strobbildorn* / Dioscorides licet vnius tantum lib. 3. cap. 4. meminit. Theophrastus tamen et Plinius plura tradunt genera.

Sij siue Laueris, Germanis *Bachmünz*.

Sola-

QVO TEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA.

IVNIO, SOL
in Cancro.

Radice
gradi sub
rubeo
cortice
vestita.

Solanum somniferum, qd
alij etiam Halicacabum vo-
cat, folijs piuguib⁹, flore grā-
di, rubeo, fructu in folliculis
crocato.

Scylla hoc mense, quo se-
cundo floreat colligenda,
quanquam Gal. libro i. de
Antid: cap. 9. mēsis tempo-
re colligere videtur.

Radix
gustu dul-
cis, iucū-
daq; &
longa.

Tragopon Gracis, Barba
hirci latinis, Bochebart Ger-
manis, hac radix longē dis-
fert à Tragopogo altero, qd
purpureis floribus constat,
hac enim longior, grādi-
or, robustior & durior est. Præ-
terea amara & adstringente
facultate est prædita.

Tenues q
in plures
diuaria-
tur par-
tes.

Veronica mas.
Veronica foemina.

Digit
crassitu-
dine om-
nes fibro-
sa & ob-
liqua.

Vrtica Romana.
Vrtica maior.
Vrtica minor.

FORMA

IVLIO, SOL
in Leone.

A Bsinthij pontici radix.

Aron, apud Siros Lupa,
Germanis hien Matterwurz/
folia emittit dracunculi, sed
longiora & paucioribus di-
stincta maculis, radix.

Anchusæ species, Germ:
wildt Ochsenzungen / effodi-
untur omnes ætate.

Angelicæ sativæ radix
eruitur tertio anno à sa-
mense Iulio & Augusto.

Angelicæ sylvestris radix.

Androseni radix.

Bryonia siue vitis alba,
weiß stickwurz / ea si in vm-
bra sicatur per annum du-
rat.

Diuisa
firma &
lignosa.
Candida
& fibro-
sa.

Crassitu-
dine di-
gitali, bi-
fida.

Crassa ni-
gra & ra-
mosa, gu-
stu acris
& odori
rata.

Pollicis
crassitu-
dine &
saepe mai-
ore.

Pyrri mo-
do extu-
berat &
fibrosa.

Radix
crassa ma-
gna siue
prægran-
dis &
candida.

Bugloss

QVO TEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA.	IULIO, SOL in Leone.	FORMA.	IULIO, SOL in Leone.
Albam teneram pollicari crassitudine. Radix in rubro pallida, radiculis referta.	Buglossum magnum siue Borago, radicem ostendit.	Candida & amara.	Dictamni albi, radix aestate & autumnno, Dioscoride autore, effoditur, Germani Diptam vocant, officinae vero Diptamno (ut deprauata voce scribunt) carent. vtuntur Pseudodictamni radice, quae est inutilis, hoc est, non adeo efficax ad ea, ut vera dictamni radix.
Crassa grauis, solida tripedatis radix.	Centaurij maioris, Germani non sine errore Rhaponticum vocant, radix est succo praegnans, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris & rubescens.	Crassa radix & bifida.	Dipsaci siue Labri veneris syluestris Germ: wild weber farten/ officinis, virga pastoris nominatur.
Radix rotunda, aliquantulum bulbosa, aro non ab simili, tenui obducta cortice.	Dracunculi minoris, radix messis tempore effoditur, lotaq; frustratim conciditur, & lino traiecto siccatur in umbra, & ita reconditur, Germani vocant Blatterwurz.	Magna subalbida.	Elenij radix, Germ: Altmurz/ aestate effoditur, particulatim dissecta siccatur.
Radix grandis candida rotunda, tenui vestitur cortice inferius fibrosa, instar cepae.	Dracunculi maioris radix, Germ: groß Blatterwurz/ messis tempore colligenda, siccanda in umbra.	Candida, crassa & numerosis capillamentis, carnosa & friabilis.	Elleborus albus, latinis veratrum album, Germani weiß niefwurz/ radix messis tempore colligenda.
		Numero sa cum longis fibris.	Ellebori nigri, cum floribus purpureis.
		Crassa cum numerosis & longis fibris.	Elleboris nigri, cum floribus candidis, estq; potius consiliginis species.
			Ellebo-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.	FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.
Palmarilongitudine, cū numero sis capillametis.	Ellebori nigri, cum floribus herbaceis, radices omnes messis tempore colligendæ, quoniam halitu caput aggrauant, qua propter ad id arcendum fossuri, alliu præsumere & vinum bibere iubent.	Radix brevis, folio Lactucæ amara, cōstat, ied scabriori cādidiōriq;.	Libanotidis seu Rorismarini sterilis radix colligitur per messem tritici, de qua Theoph. lib. 9. cap. 12. Radix hæc partim superius, partim inferius purgat, quod enim germen verius consistit, superius purgat, quod terram altius descendit, inferius.
Radice longa, & capillosa.	Eleoselinum, Germani Epffich / latini Apium palustre & rusticum.	Longæ flexiles & lentæ.	Maluæ sylvestris, Germani Bess pappeln wurzel.
Radix alba, gustu amarissima.	Gentiana minor, alio nomine Cruciata, Germani Creutzwurtz / eo quod pluribus locis ab utroq; latere crucis instar perforata est.	Radix ruffa.	Meliloti, Germani vnser frawen schulein.
Radix longa foris nigra, intus lutea, Plinius lib. 22. cap. 9 carpit radice Vergiliarum occasu.	Glyzericæ radices, Germani Süßholz / nusquam maiori copia plantari vidi, quam in agro Bambergensi, vbi sedes est Episcopalis.	Radix candida & lignosa.	Ononis græcæ, Restæ bouis latinæ, Germanis Stalfraut.
Rad: syluestris, Myrto similis, maiore molliore et odorata.	Laurus Alexandrina, ab Hippoglossio diuersa, ut ex Dioscoride apparet, fructum fert rubrum ciceris magnitudine inter folia, non autem in medijs folijs, ut Hippoglossum & Ruscus.	Radix nigra, crassa, graui odore succosa.	Personata, græcis ἀρκεσιν, officinis lappa maior, Germani groß fletten wurzel.
		Radix multifida.	Peucedanum, quod alij fœniculum porcinum vocant, gignitur in montibus opacis, nos vidimus & in pratis humidis magna copia florere, non procul à Rottenburg iuxta Tubarim, quo itur versus winshemiam oppidum imperij.
			Portulaca hortenensis, Græcis Αρσάχην, Germani Burszel fraut.
			T Portu-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.	FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.
Radix multifi- da, cras- sior q̄ in dome- stica.	Portulaca sylvestris, fo- lia gerit priori similia, sed multo minora, & oblongio- ra, cetera consimilia sunt.	Digit. crassitu- dine ex obliquo villosa gravi o- dore.	Phu magnum, officinis Valeriana, Germ: Baldrian. Phu paruum.
Radices crassę ob longę, & subru- brę.	Pimpenellę maioris. Pimpenellę minoris.	Parma albicās.	Phu minimum radix.
Extrin- secus pur purea, in trinsecus alba.	Potentilla, agrimonie nō dissimilis, nisi quod folia hirsutiora habet, supernē vi- rentia, infernē albicantia	Palmar longitu- dine, & digit crassitu- dine, cā- didā.	Petroselinum hortense, si- ue Apium, Germani Petersil- ig wurzel/ quo crebro in iu- sculis vtimur.
Radices tenerę, hirsutę, candidę, digitali crassitu- dine.	Radix. Plantago maior. Plantago minor. Plantago longa.	Radix palmar longitu- dine & digit crassitu- dine.	Petroselinum Macedoni- cum, latini idem quod gręci vocant folijs apio Aquatico simile, sed minoribus, caule crasso, ramoso, floribus al- bis, semine hortensi, petrose- lino non absimile.
Digit crassitu- dine lon- gę, albę.	Pastinaca sylvestris, gręcē σαφύλιν & ἀγρία, Germanicē pastinachen / licet radix pasti- nacę, satius multo efficacior sit, inutilior tamen cibo est.	Radices habet py- ri figura, ternas aut qua- ternas, ni- gra exte- rius cutē, alba int ^o pulpa.	Pseudapios siue Rapha- nus sylvestris, Germani Erd- nuß oder Erd mandel / radix cū nulla vi purgatoria, præ- dita sit, pro Apio verò Dio- scoridis, non habenda erit.
Longa pollicari crassitu- dine gu- stu fer- uentissi- mo & i- gneo.	Pyrethrum, quidam sali- uarem vocant, radix offic- inis omnibus nota, Germani Bertram.	Nigra & crassa. Magna crassa & candida.	Papaueris corniculati, ra- dix per summa cespitum.
			Rosmarini fructiferi. Seseli

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.	FORMA.	AVGVTSO, Solin Virgine.
Radices sunt longæ & odorata, hoc est, iucundi odoris. Supina, q̄ & sacra herba dicitur, cum floribus purpureis radice constat longa & tenui. Recta, q̄ <i>περιστερη</i> dicitur, radice constat sola. Gravior, longior, robustior, durior, et laetio succo referta quam Tragopon, prius mum luteis floribus.	Seseli, Arabibus <i>fiselios</i> , officinis Siler montanum dicitur, ex Diosco: multiplex est, Massiliense, Creticum & Æthiopicum. Seseli Germani <i>seffel</i> & <i>Stainbrech</i> vocant. Verbenaca, græce <i>περιστερη</i> dicitur, diuiditur in Rectam & Supinam, & marem & foeminam, quæ inter se confunduntur. Fuchsius mari tribuit luteos flores, foeminæ purpureos, Plinius lib. 25. cap. 9. foliosam foeminam, marem rarioribus folijs contare scribit. Tragopogi, alteris quod purpureis floribus constat, radix potius Iulio effodienda, radice nititur adstringente & amara, præterea radix est.	Radices numero- sas tes- nues & odoratas Lenta in- tus alba. Candida fibrosa. Radices bulbus tenuis ve- latur me- branis, mox plu- ribus co- agmen- tatur, nu- cleis & ijs sepa- ratim ve- litis, in cuius ver- tice com- plures fi- bræ cir- corum ex- emplo crispant- tur, radi- oso ha- bitu & a- spero sa- pore.	A Sclepias, Germani <i>Schwalbenwurz</i> . Altheæ siue Ibisci radix. Ammi, Germani: <i>Ammeys</i> , cuius genituo ammeos vtuntur officinæ, ex Dioscori de lib. 3. cap. 59. Æthiopicum cuminum appellant. Allium vulgaris notitiæ, Germani <i>Knoblauch</i> vocant. Est verò unum hortense, de quo meminit Theophrastus lib. 7. cap. 4. histo. plant. Allium ante solstitia feritur, aut paulo post nucleatim diuisum. Discrimen eorum quod aliud præcox, aliud serotinum: est enim genus quoddam eiusmodi, ut sexaginta diebus perfici possit. Differunt præterea magnitudine singulari. Cyprium vocatum maxime tale est, quod non decoquunt, sed in myrtotis vtuntur: & cum tunditur, mirum quam spuma increseat. Quin & illud differentiam facit, quod quædam non nucleis coagmentatur. Dulcedo autem & odor, & crassitudo, eorumque causa tempore, cultuque pene videtur contingere, ut etiam aliorum, perfici T 2 etiam

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.

AVGVSTO,

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Sol in Virgine.

etiam semine potest, sed tardo: primo enim anno caput accipit porri, sequenti discerni in nucleos incipit, tertio redditur perfectum, nequicquam deterius, sed etiam quidam vel deposito melius id existimant. Radicis autem allij, aut cepæ, haud similis ortus fieri solet, de quibus idem autor scribit.

Radix bulbosa & capitata nucleis, spicatum capitulum, intumescente, summo vertice capillamentis fibrato. Radix longa & fibrosa. Radix longa & fibrosa. Foris atram, intus candidam.

Alterum est sylvestre Allium, quod graeci ἀσκόρυον, latini anguinum allium appellant, satiuo longè minus, sed odore & sapore persimile: Germani wilder knoblauch. Est & allium sylvestre, quod nos Germani feldknoblauch vocamus, longè distans ab allio vrsino, Germani Waldknoblauch.

Cichorium satiuum, folio est lato.

Cichorium sylvestre, Germani Wegwarten wurzel volio est angustiore.

Fragariae, Germ: Erdbeerradicem habet.

Radicibus albis graminis modo serpentibus.

Radix folida nodosa, foliis ex nigro rubescens, colore intus herbaceo, ut pistaceum, sapore dulci, austerum tandem subamaro non nihil aromatico.

Vnicam radicem habet, superuacua ex qua fruticat.

Lepidium, quod aliqui gingidium vocant, ab Iberide Diosc. in calce primi libri diuersum, quod Aëtius Tetrab. 4. serm. 2. cap. 133. describit, olus esse in Syria, folia habens seridis angustifolia, foliolis oblongis, & crenatis flore lacteo, & chamamelum æmulo, minore tamen: Et si Matthiolus secus sentiat.

Polypodium, siue filicula ob similitudinem foliorum cum filice, quibusdam etiam glyzerica sylvestris dicitur, ex Mesue præstantius est, quod arboribus præsertim glandiferis innascitur.

Peplus latinis, officinis & vulgo.

Esula rotunda, frutex est albo liquore plena, folijs paruis ut rutæ, latioribus tamen rotunda coma, ferè dodrantali humi respersa, radix colligitur mensibus, siccatur in umbra & continuè versatur.

Pityusa

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.	FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.
Radix crassa, cā dida, suc co refer- ta rustico rum pur gatoriū, cortice denso & gravi, hæc ra- dix ma- gna im- postura per turpe to vendi tatur, quæ ad- modum & Tapſie radices.	Pityusa Dioscoridis, idem est, quod Scebra Serapionis, officinis Esula, ut etiam ti- thymalorum omne genus indifferenter usurpatur, her- ba est lactaria & hortensis hirsuta, à Cyparissia differt, folijs piceæ, acutis, exilibus flore paruo ueluti, purpureo semine instar lenticulæ, lato, quæ omnia conueniunt de- scriptioni Mesues in Esula maiore.	Radix lō ga, sub- ruffa, di- gitali crassitu- dine. Radices raphani varia, a- liæ lon- gæ, aliæ breues, aliæ cras- sæ, aliæ fragiles.	Symphytum petricum, na- scitur in petris, ramis tenui- bus paruis, origano simili- bus, capitulis & folijs thymi.
Radix ex ignis, cortice te- nui, par- ua hæc præstior est priori.	Esulam minorem describit idem Mesues: quæ maiori sit præstantior, præsertim corti- ce, & eo quidem tenuiore, le- uiore, fractu facili, cassiæ mo- do subrubente, senis nodum mensibus transactis collecto, nam recens quo mense legi- tur mala est, uti & nigra, or- ta aliquo loco propè ther- mas.	Radix dura, lō- ga, crassa acris. Hortēsis radix te- nuis ru- bra, cas- pilloſa seu fibro- sa. Sylue- stris lōga bifida & capilloſa	Raphanus, radix latinis dicitur, cuius genera multa notauit, Theoph. 7. de histo- ria plant. cap. 4. vulgo no- stro duplex, alter satius, Germani Reddich vocant.
Radix mollis lō- ta, & vi- scoſa int- erius nigra ra- mofa.	Symphylum maius, siue consolida maior, Germani groß walwurz / quod aliqui pecton vocant, cuius est v- sus.	Radix lō- ga, geni- culata ruffa.	Raphanus syluestris, Ger- mani Bren vocant, quo uti- mur ad carniū intinctus, vere ineunte, ceu altero hie- me potissimum. Rubia tinctorum officinis, Græcè Erithrodanum, ex Dios. lib. 3. cap. 137. radix rubra est, quæ tinguntur la- næ. vna est hortensis, altera syluestris. Germani serber- rōt vocant.
			Spatula fœtida, Germanis Wandtleuß, Græcis Xyris.
			T 3 Succisa

FORMA.	AUGUSTO, Sol in Virgine.	FORMA.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.
Multifidas habet radices nigricantes, succilias & circūfolias.	Succisa, quā vulgò Morsum Diaboli vocamus, nomen superstitiosum a radice inuenit.	Radix bifida, crassa, fibrosa.	A Brotani maris planta, vulgaris notitia.
Fœminæ radix longæ gustu aspera, situm de di- stis.	Verbascum vulgò Tapsus barbatus ex Diosc. lib. 4. cap. 9. differentias summas duas habet, hoc nigrum, illud album, in quo mas & fœmina. Mas nigrum, fœmina candidum intelligitur.	Crassa longæ & fibrosa.	Abrotani fœminæ, planta arboris specie fruticat, quā alij Cypressum, alij Santolinam vulgo appellant.
Radix fo- tis nigra, intus bu- xeo colo- reniter.	Vitis nigra, quā aliqui nigram Bryoniam vocant, græce ἀμπέλου μύλανα.	Radice fibrosa.	Brassica satiuæ, Græcis καμύκη ex Theophrasto multa genera recensentur, id quod & horti nostri in germania attestantur, nempe
Radix p- summa ce- spitū ni- gra, oblō- ga, filices multas fundēs.	Filix mas, folia sine fructu & flore, Germani waldt- faren.	Radice capillōsa	Brassica lauis folijs grandibus latisq.
Radiceb ⁹ lōgis plu- rib ⁹ obli- quis, q̄ ex nigro in luteū fla- uescunt.	Filix fœmina, folijs est filicis furculosis altioribusque, & quæ non singulari, ut illa pediculo fulciuntur.	Radix ramosa & fibrosa.	Brassica crispa.
		Graminis modo serpit & fibrosa.	Brassica capitata.
		Radix superius crassa, inferius ramosa.	Brassica Marina radix.
		Radix bifida.	Beta alba Germanicè weis- ser mangolt.
		Radices oblongæ et rotundæ.	Beta nigra.
			Beta rubra, quæ non modo folijs, sed etiam radice colore rubeo nitet, Germani vocāt rost ruben / hanc infusilibus uasis, preparant cū aceto

72
QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	SEPTEMBRI,	FORMA.	SEPTEMBRI,
	Sol in Libra.		Sol in Libra.
	aceto, feminibus anisi, fœniculi, coriandro, & raphano rusticano, ad esum.		re, quo fructum gerūt, quod Septembri mente fit, sine omni periculo vitæ.
Radice nigra, & aliquantulu lata ut rapū videri possit.	Cyclaminus, vulgò panis porcinus, Germani Schweinbror / Erdtappfel / planta vulgaris notitiæ radix, scilla modo concisa reponitur.	Radix bulbosa, intus alba, rotunda.	Narcissum, quidam liliū, uel liriū appellant, Germani zeylosen & Homungsblumen.
Radice candida magna.	Cucumis sylvestris, siue cucumis auguinus, Germani wilder Cucumer / fructu solo distat, à satiuo cucumere, quē longē minorem parit.	Radices nigre, scabrae, clauæ similes.	Nymphaea, vtraq; tam alba quā lutea Seplaharijs nomine Mauritano Nenuphar appellatur, ex Dioscoride, autumno radices secandæ sunt.
Fœmina radicib; inhæret benè magnis, binis ternis inter se cōuolutis, nigris foris, intus albis, crassocortice vestitis caulem non fert.	Mandragora, aliqui antimelum, alij circæum vocant, quoniam videtur radix ad amatoria conducere. Duo eius sunt genera, vnum nigrum, quod fœmina existimatur, tridatias appellatum.	Radice alba, scabra.	Nymphaea parua, cuius flos blephara dicitur, flore luteo nitente, rosæ simili.
Radix crassa magna bifida orbiculata, seu rotunda.	Alterum candidum, quod mas dicitur, nonnullis morion vocitatur, radix alterius similis maior & candidior, effodiendæ radices eo tempo	Radix ruffa.	Pastinacæ satiuæ, Germanicè pastiney & pastinachen / radix in ciborum usum recipitur, vnde nomen à pascendo inuenit. Est vero duplex pastinaca satiuæ, vnam vulgò carotas, Germanicè zamrotuben / vocamus, à radice Betæ rubæ distans, feritur & in horto Decani Coburgensis, vbi & alix multæ plantæ singulari cultura fouentur.
		Radix flaua, crassa et oblonga.	alteram pastinacam, Germanicè Gelb ruben appellamus.
		Crassa capillosa odorata.	Rhodiæ radix, Germani Rosenwurz / quam sapissimè cultam vidi in horto domini Fuchsj pij defuncti.
			Viscum

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA. **SEPTEMBRI,** FORMA. **OCTOBRI, SOL**

Sol in Libra.

Viscum cum acinis etsi in robore, malo, pyro, & plerisque alijs arboribus reperitur, attamen quod in radicibus quercinis, aliarumq; arborum glandiferarum nascitur, ceteris longè magis excellit, autumnii initio cum suis acinis decerpitur.

in Scorpione.

Napus in raporum genere recensetur, cuius duo genera tantum, nouimus hoc tempore albū & flauum. Flauī tametsi albas crassitudine superent, magisq; colore placeāt, sunt tamen inspidiores, ob id gustui minus grati, Germani Gelb vnd weiß steckruben vocant.

Rotundū Rapum satium, vulgo notissimum, Germani weißruben / **O**ctobri mense, cum ad summum extuberauerit, radix è terra eruitur. Est verò triplici genere,

Longū.

Sesile.

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA. DECEMBER, FORMA. IANVARIO,

Sol in Capricorno.

Eryngij, radix quibusdam Decembri mense legitur, locis præsertim meridionalibus, vbi clementior aer est.

DE

74
QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

FEBRVARIO,

FORMA.

MARTIO,

Colore
ruffo, pu-
rum pel-
lucidum
tenue o-
dore exi-
guo, sed
grato sa-
pore, dul-
ci & sub-
acri.

Oleum commodissime
circa 6. Idus Februarij
ex oliuis exprimitur:
non enim statim postquam
Nouembri aut Decembri
collectæ fuerint, exprimen-
dum erit, nisi in pauimentis
& tabulatis, donec rugosæ
fiant prius seruentur, & non
nisi priusquam sudent præ-
mendi, postea affusa feruen-
ti, aqua torculari supposita,
præmuntur ut oleum sequa-
tur.

Salicis succus, triplex, Pli-
nio lib. 24. cap. 9. autore,
primum succum arbor
spontè exudat. Secundus ma-
nat in plaga, cum floret exci-
so cortice trium digitorum
magnitudine. Tertius appa-
ret detruncatione ramorum,
autumni tempore destillans
à falce. Est & albicans spu-
ma, quæ in Salice reperitur
statim post delapsos flores,
quæ spuma è ramusculis vix
modo dependet, donec veni-
tis abrepta, huc & illuc plu-
ma modo impellitur. Dio-
scorides vnius tantum succi
meminit, qui manat mense
Martio cum florent salices,
qui ad purganda quæ ob-
stant, oculis vim suam præ-
bet.

V 2

Vio-

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

MARTIO.

FORMA.

APRILI.

Violarum succus, vere adueniente è floribus purpureis, per infusionem aquæ elicitur, infunditur & aceto, quod violatum acetum appellatur.

Câdidus est succus dum recens est: dū aruit colore foris croceo, aut subflauo intus. câdido, odore graui, sapore amaris-
simus, lenis pinguis friabilis tener, facile in aqua lique-
scens, niger imp-
batur ac mollis.
Adultera-
tur Am-
moniaco
aut cera.

Pentaphylli siue quinq; folij succus, ex radice tenera exprimitur, contra locinocis pulmonisq; vitia, item aduersum venena.

Panacis succus, græcis Opopanax, liquor è panacis Heraclij radice incisa, recenti adhuc caulium pullatu effluit, folijs excuato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule mensibus inciso, profluentem succum eximunt.

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

APRILI.

FORMA.

M A I O.

Recens
succus
croceus,
& ama-
rus adeo
est, ut vix
degusta-
ri possit.

Rhabarbari succus, ex ra-
dicibus ineunte vere, in ipsa
prima foliorum germina-
tione elicitur, aut infusione,
aut stillatione; vbi radices re-
centes particulatim dissec-
ta fuerint, aut verò expres-
sione, succo enim madent
copioso, tum croceo, tum
purpureo, qui suo colore fa-
cile manus implicat, & colo-
res inficit, dum radices re-
purgantur et secantur in par-
tes, vbi verò Æstate erutæ fue-
rint radices, foliosa exstante
planta, tanquam euanida
croceo illo succo carent, quo
fit ut viribus infirmiores ha-
beantur.

Vitis alba siue Bryonia,
succum vere ex radicibus
Dioscorides lib. 4. cap. 276.
exprimit, qui trahit pituita,
cum aqua mulsâ potus. Ad
pforas et lepras semen effica-
citer illinitur. Succus è con-
trita radice expressus, multis
morbis mirifice prodest, de
quibus cōsule Matthiolum.

A Nagallidis, tam maris
quam fœminæ, succus
veris tēpore, quo flo-
rent, ex tota planta exprimē-
dus, mirifice enim caput, pur-
gat si cum eo gargarisetur, &
dolores dentium lenit nari-
bus infusus: quæ Diosc. lib.
2. cap. 174.

Cyclaminis, siue panis por-
cini, succus vere & autumnō
ex radice tusa, & ad mellis
crassitudinem decocta, collis-
gitur, Diosc. lib. 2. cap. 158.

Chelidonij minoris, ex ra-
dicibus folijs, & caule ex-
pressus, succus ad purgandū
caput confert.

Eupatorij Dioscoridis, si-
ue Agrimonie succus, ex ra-
dicibus tenerioribus, expri-
mendus, vere desinente, con-
tra affectus iocinoris splenis,
aliarumq; partium obstru-
ctiones.

Dentis Leonis, siue Mona-
chi, Plinio Cichoriui appel-
latur, succus lacteus, expres-
sus & propinatus ijs, quibus
genitura effluit. Diosc.

Apij succus ex radice, quæ
veris tempore legitur, du-
plex est, in superiore radice
parte abundat, succus qui
confert ad purgandum cor-
pus per vomitum, in inferiori
autem parte, per aluum, de

V 3 qua

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

MAIO.

FORMA.

MAIO.

qua Theophrastus lib. 9. cap. 10. hiltoria plant. Tusa radice in fistili mergitur, & agitata aqua, quod super natat penna selectum exiccatur. Dosis eius sit sesquiobulus.

Ireos sativæ siue Domestice, succus ex radicibus medio vere, aut æstatis principio exprimitur, qui bilem flavam, pituitam & aquam inter cutem mirifice pellit, hæmoroidasq; fotu elicit, conficitur & electuarium ex succo radicum, quo maxime iuvantur, hi qui aqua intercute laborant.

Præfertur succus è Sardinia colore ruffo, odore graui feruens gustu.

Peucedani succum, Diosc. lib. 3. cap. 77. ex tenera radice cultello concisa colligit, qui cū profluat è plaga succus umbræ mandatur, in sole siquidem confestim evanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusus, ne capitis dolor premat, & vertigo sentiatur. Assatione radix inutilis est. Tam lac q̃ succus, radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora, verum inefficacior succo lachrymæ habetur, & velotius expirat, interdum etiā concreta inuenitur, lachryma thuris similitudine, caulibus radicibusq; adhærens.

Pentaphylli succus ex tenera radice exprimitur contra lecoris pulmoniumq; vitia, item aduersum venena.

76
QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

IVNIO.

FORMA.

IVNIO.

CHelidonij maioris succus, ex radice folijs & caule exprimitur in eunte æstate, et siccat in vmbra digeritur in pastillos, Diosc. lib. 2. cap. 176.

Gentianæ maioris, succus extrahitur hoc modo. Contusa radice, quinq; diebus aqua maceratur, postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices, & ubi refrixit aqua, linteo excolatur, mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, fistiliq; reconditur.

Myrti succus, ex virentibus baccis exprimitur, contra Phalangiorum morsum, & scorpionis ictus in mero sumptus. Diosc. lib. 1. cap. 128.

Scordium, verum nostris montibus nõ procul ab Hala Suauorum reperitur, ex quo succum exprimimus, æstatis initio.

Rosarum, è puniceis rosis optimus elicitur succus, similiter ex subrubescens, verum infirmior facultas. Albicantes rosæ non alium in medicina vsum sibi vendicant, quàm ut ex his aqua destilletur exceptis Dama-

scenis, quæ & deiectionem habent facultatem. Exprimitur autem recentibus folijs, de sectis forfice vnguib; (sic appellantur candidæ foliorum partes) reliquũ in pila premi & teri debet, in vmbra donec cogatur, & ita ad oculorum circum litio- nes recondi.

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

I V L I O.

FORMA.

I V L I O.

Succi p-
batio est,
ut sit re-
cēs, vali-
di odoris
sincerus,
nō ad a-
corē ver-
gens, di-
lui faci-
lis, levis
adstrin-
gens, ac
modicē
mordēs
gust. hęc
Diosco-
rides.

Balsamum arbor, alba
violæ Litij, siue pyxa-
canthe magnitudine cō-
spicitur, folium rutæ, proxi-
mum longē candidius per-
petuo virens. in Iudæa solum
quadam valle nascitur. Æsti-
uis sub ortu canis ardoribus,
arbor vnguibus ferreis inci-
ditur, manatq; ē plaga li-
quor, quem opopalsamum
vocant, sed tam exiguo stil-
latu, ut annis singulis, ne
plures quidem quam seni,
septeniūe congi cogantur,
quæpendent, 14. libras mē-
surales, & 28. vntias. Congi-
us enim sextarios, sex Roma-
nas continet, sextarius verò
sexta pars congi dictus, cap-
it heminas duas id est, octo
vntias, viginti mensurales,
non ponderatas. hic liquor
duplo rependitur argento:
officinæ vero opobalsamo
cum carent, factitium com-
parant.

Buglosi succus, Iulio mē-
se ex caule folijs & floribus
exprimitur.

Centaurij maioris succus
exprimitur, ex radice conci-
sa aut tusa, torculari uel ma-
nibus expressus. hoc succo
quidam vtuntur, non incō-
modē pro Lycij succo, qđ
testatur & Galenus libro 7.

simpl. medica. vbi de Cen-
taurij viribus disserit.

Dracunculi maioris, mes-
sis tempore radix colligitur,
vnā cum fructu & folijs, ex
quibus succus exprimitur,
siccaturq; in ymbra.

Dracunculi minoris, suc-
cus ex radice Iulio & Augu-
sto mense.

Ellebori albi.

Ellebori nigri, radices
meseis, tempore colligendæ,
ex quibus succus exprimi-
tur.

Eupatorij, Dioscoridis
succus, ex folijs floribus cau-
le & radice exprimitur, cuius
vsus maximus est in pastillis
de Rhabarbaro.

Fœniculi succus ex caule
& folijs exprimitur, & in so-
le siccatus, extrahitur & suc-
cus etiam semine viridi, ras-
mulisq; & radicibus, prima
germinatione incilis.

Dulciss.

mollis

purus te-

nax, & q

cōfract^o

nigerri-

m^o, & q

linguæ

subdir^o,

totus eli-

quescit.

Glyzericæ succus, Iulio
mense extrahitur ex radici-
bus, hoc modo, Rami cum ra-
diculis tusi, & ante per mul-
tos dies macerati coquuntur,
tum abiectis lignis iti-
dem liquor, coquitur donec
mellis crassitudo fiat, qđ dein-
de in pastillos cogitur, & so-
le siccatur.

Hyo-

QVO TEMPORE SVCCISINT COLLIGENDI.

FORMA.

IVLIO.

FORMA.

IVLIO.

Hyosciami ex semine recenti, caulibus folijsq; tulis succus in sole exprimitur, & oxycrato humore usque ad annum usque prorogatur: nā facile corruptionem sentit, extrahitur etiam ex sicco semine separatim, in aqua calida tuso & expresso.

Maiozan succus, ex herba recenti exprimitur, pro incipientibus hydropicis, & ijs, quos vrinae difficultas, aut tormina excruciant, Dioscorides lib. 3. cap. 40.

Morum nigrorum sylvestrium, quae Germanice Bromber vocant, succus exprimitur, antequam perfectam maturitatem acceperint.

Opopanacis succus, ex herba siue planta panace, à nonnullis Heraclia dicta, colligitur messis tempore, inciso caule profluentem succum eximunt, similiter ex radice incisa recenti caulium pullulatu, ea candidum succum emittit, qui siccatus in summa cute croceum colorem contrahit.

Pimpenellae maioris, minoris succus expressus est radicibus, & cum vino haustus contra deleteria medicamenta, & venenosorum animalium morsus confert.

gravi odore, Nigri impabatur, ac mollis Adulteratur Ammoniaco aut cera.

Laudatur scammoniū leuenitidū, rarum & colore q̄ similiturino glutini, fungosū tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiae deporratur, linguæ tactu albescat non solum verum et exurat.

Ribes ex baccis rubescens, dulcacidis Iulio potissimum mense exprimitur, decoquitur ad mellis spissitudinem.

Rutae hortensis, succus ex herba recenti expressus, contra hebetudinem oculorum efficax, Diosc. lib. 3. cap. 45.

Scammoniae succus, legitur hoc modo, capite radices exempto, radix in testudinis speciem cultro excavatur: quo fit, ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobe in terra concamerato sinum fodiunt, in quos subiectis iuglandium, folijs profundunt, succum, siccatumq; extrahunt, adulteratur hodie lacte thyrsalli. Ceterum hoc admoneadum, cum hic succus basis ferè sit omnibus purgantibus medicamentis, ut pharmaceuti diligenter inspiciant, an sincerum aut ad ulterium Scammonium habeant.

Taphiae succus, extrahendi ratio haec est, facta in ambitu scrobe cortices inciduntur, aut radix in fornicis speciem in se excavata, cooperitur, quo merus succus confluat, oportet illuc sequenti die se

X con-

Succus
pbatur q̄
amarissimus, in
terne albus, aut
subfulvus,
foris ad
croci colorē in
clinans,
lævis pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquesces,

conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus fictili vase insolatur: aliqui folium vna terunt, sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui e radice manauit grauius olet, & humidior permanet. e folijs autem extractus exiccatur, atq; teredini iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus vento, aut potius cum dies apricus est, & a flatu silet, quoniam ob halitus, acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulae. ob id prius liquido cerato & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Hæc Dios. lib. 4. cap. 151.

A Bsinthij succus exprimitur, herba semine pragnans, maceratur diebus quinque aqua, decoquatur postea donec supereminet aqua, mox ubi refrixit linteolo exprimitur, & eiecta herba iterum decoquitur usq; ad mellis crassitudinem.

Artemisia succus, ex herba & floribus simul exprimitur, contra suppresos mentes si cum Myrrha excipiat. Dios. cond. lib. 3. cap. 110.

Anguria, quam Dullaha appellat Serapio, nos Germani Gurken/ fructum profert mirum in modum extuberantem, ponderosum subrotundumq; carne intus humida aquosa, in quibusdam prædulci, in nonnullis autem subacida, insipidaue sitiq; extinguenda per quam idonea. Decerpitur fructus, ex quo succus exprimitur, qui si decoctus fuerit, potus erit aptissimus febrientibus, & ijs qui temperamento sunt macri & exangues. alium præterea ducit, sed non fortiter.

Anchusa, quam aliqui Alcibiadion aut Onochiles appellant, ex radice huius mensis tem-

QVO TEMPORE SVCCISINT COLLIGENDI

FORMA.

AVGVSTO,

FORMA.

AVGVSTO,

sis tempore sanguineus succus funditur, qui contra vitilignes & lepras, similiter qui à viperis, aut serpentibus morfi sunt, confert.

Brassicæ sativæ, succus aluo idoneus est, si cum nitro & iri haultus fuerit, exprimitur ex caule folijs & florib⁹: cum vino quoq; epotus, viperarum morfib⁹ auxiliatur, de quibus consule Dios. lib. 2. cap. 113.

Cucumerum satiuorum, succus ex pulpa fructuum exprimitur, eo potissimum tempore, cum ultimam senserint maturitatem, quod fit Augusto mense, & ex his, qui ceteris odoratiores habentur, quibusq; crassior fuerit pediculus, quinetiam ponderositas præstantiæ argumentum est. De facultatibus cucumerum lege Gal. lib. 2. alimet. facul.

Cornorum, præsertim maris succus, æstatis tempore ex baccis rubescentibus exprimitur: ad eadem valet vti rob de agresta.

Ebuli succus è radicibus elicitor, soleq; subinde inspissatur, quem deinde in pastillos digerunt, ac pro vsu seruant.

Halicacabi vesicarij, alio nomine physalida, à Diosco-

ride lib. 4. cap. 67. appellatur, succus extrahitur ex herba, qui siccatus in vmbra reconditur, ad eadem valens, quæ ipsa planta.

Limoniorum succus, sicut citriorum fit, ad restinguendū bilis feruorem non inutilis, expetitur etiam à mulieribus pro fuco ad faciem expoliendam.

Mori arboris succus, ex radice circiter messem colligitur, radice nempe incisa, tacto in ambitu scrobe succum emittit, q postridie concretus inueniri solet. is in dolore dentiū efficax est, tubercula discutit, & aluum purgat.

Opij succus, ex incilis papauerū capitib⁹ manat. Iulio et principio Augusti. cuius ratio faciundi hæc est. Cū ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, nè penit⁹ adigatur, ex obliquo in rectū summam cutim incidere oportet lachrymā exeuntem digito in cōchā extergere, nec multo post redire, ut cōcreta inueniatur, etenim q tū, aut postero die etiā offenditur, in veteri pile teri debet, & in pastillos cogi, cū tamen inciditur retrocedendum est, ne vestib⁹ succus deradatur. Hæc Diosc. lib. 4. cap. 60.

X 2

Oci-

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDAE.

FORMA. AVGVSTO, FORMA. AVGVSTO,

Ocimi succus odoratissimus, exprimitur è folijs, floribus, caule pro abstergenda caligine oculorum, & destillatione exiccanda: Diosc. lib. 2. cap. 135.

Omphacinum succum, ex omni immaturarum vuarum genere parat, hoc mense Italia.

Parietariae, ex herba cum floribus succus exprimitur, Diosc. lib. 4. cap. 81.

Pyrorum succus in Medicina non aspernandus, praeterim quae habent vim adstringendi, aut quae pyra sunt dulcia vel acida, & horum mixtione composita, praeterea quae odora ut Apiana, Moschatula, siue Moschata vel Chia, expressus succus ad consilientiam mellis decoquitur.

Prunorum, maxime Damascenorum succus, expressus & decoctus, sicuti pyrorum aut pomorum inflammationem extinguit, sitim sedat, ventremque subducit.

Rhois succus, officinis Rob. de Sumach. fit ex bacis seu seminibus recentibus Coriarij fruticis, quae maturitati iam propinqua sunt: & paratur licuti rob de Ribes, huius usus est in Dysen-

tericis, coeliacis & alijs quam plurimis morbis, qui opus habent adstrictione.

Sambuci succus ex baccis recentibus, à cremore purgatis, cum melle optimo coquitur ad zupapij spissitudinem, qui dolores aurium tollit, ticalidus imponatur: ex quo succo etiam vnguentum praestantissimum paratur, contra ambulationem ignis, & erysipelata, uti nos experti sumus.

Solani somniferi succus, ex folijs caule & fructibus, exprimitur, qui in pastillis & medicamentis locum habet, quae doloris leuamentum praebent, potui data. ex Radice vero succus, cum melle illitus oculorum hebetudines tollit.

Succus est mucosus.

Scilla succus Galeno, messis tempore, quo praecipue vigeat, colligitur, lib. 1. de antid: cap. 9. & exprimitur ex laminis crudis in pila terrea, ligneo pistillo tritis. Bras-sauolus coquit, nec se appositè explicat, quum in Galeni linctu, ex scilla cruda exprimitur.

Acaciae

FORMA. SEPTEMBRI, FORMA. SEPTEMBRI,

Niger ex
maturo
semine,
subrufus
ex viridi
eligatur
modice
rutilus &
odoratus.

Acatia succus quibusdam, ex folijs & semine simul exprimitur, quibusdam ex semine in folliculis tantum, succus expressus siccat in umbra. fit & ex folijs, verum minus efficax. Succus est recentis semine expressus, ac postea longa insolatione concretus, græcis nomine suæ arboris Acatia nuncupatur.

Berberorum succus, quem Sepplarij sic vocant, græcis Oxyacantha, Germanis Erbsei exprimitur ex bacis rubentibus & maturis.

Betæ candidæ & nigre succus ex radicibus colligitur, qui cum uterque nitrosus & noxius sit, cum melle comparandi erunt.

Centaurij minoris, cuius extrahendi succi ratio hæc est, Legitur herba semine prægnans, & diebus quinque madefacta decoquitur, donec superemineat aqua: mox ubi refrigit linteolo exprimitur, & eiecta herba iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat: Nonnulli herbam recentem gravidamque contundunt, atque succum fidei non picato exprimunt, & in sole lignea rude assidue

moventes inspissant, quod moventes inspissant, quod si concretum, quid faucibus vasis adhærescat, deradunt, reliquoque humori permiscunt, noctu diligenter operiunt, namque ros nocturnus, liquores coalescere non sinunt.

Cyclaminis succus, tussa radice exprimitur, ad mellis crassitudinem decoquitur. Succus is valenter purgat excrementa alui, si cum vellere sedi subiiciatur illito umbilico, & imo ventre coarum tenuis.

Cydoneorum, ex fructibus succus exprimitur, & ad mellis spissitudinem decoquitur.

Citriorum acidorum succus, coquitur lento igne ad tertie partis consumptionem, cola postea, & sublidere per mitte, donec clarescat, clarum deinde igne clementi in vase vitreo percoquito, aut insolato ad iustam crassitudinem, qua servari possit.

Cucurbitarum succus est ramentis tussis, & cum rosaceo aurium doloribus infusus auxiliatur. adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuuat.

X 3 Elate-

FORMA.

SEPTEMBRI,

FORMA.

SEPTEMBRI,

Elateriū
optimū
esse con-
stat, laue
non pon-
derolum
cū cando
re leniter
humectū
gultu a
marissi-
mū qdq;
lucerna
rum lu-
minibus,
obiectū
facile fla-
gren. Por-
raceum
tamē sca-
brumq;
si turbi-
dum spe-
ctetur, at-
que erui
cinerisq;
plenū sit,
grauē &
viciosum
esse solet.
nec de-
sunt qui
cucūeris
succo a-
mylum

Elaterium, succus ex fru-
ctibus cucumeris asinini syl-
uestris, autumnō cum iam
incipiunt pallefcere, expri-
mitur, Plinio lib. 20. cap. 1.
attestante. paratur verō in
hunc modum: Decerpti cu-
cumeres qui tactu protinus
exiliunt, seruantur nocte v-
na, post die imposito supra
crateram rariore cribro, vtri-
usque manibus prehensi si-
gillatim supino cultro, sur-
sum versus aciem habente,
finduntur, atq; per cribrum
humor in subiectum vas ex-
primitur, simulq; carnosum,
quod hæsīt cribro, quo faci-
lius excidat, eliditur, quod
ita pressum relidere sinitur,
atq; in vicinam peluim de-
mittitur. Coaceruata autem
in cribro, segmina dulci a-
qua perfunduntur, dumq;
steterit, tota supernatans a-
qua cum humore concreto,
effunditur. Hoc verō identi-
dem fieri solet, donec existēs,
aqua liquescat: qua stillatim
exhausta, sedimentum mor-
tario excipitur, & conteren-
do cogitur in pastillos. Sunt
qui ad hauriendam protinus
succī abundantiam, cribra-
tos cineres humi inspargant,

immisce-
ant, ut cā-
dorem i-
psū & le-
uitatē i-
miten-
tur. A bi-
matu ad
decen-
niū deie-
ctionib;
utile est.

& medium cauantes, tripli-
catum linteum obtendant,
per quod elaterium, cum
sua humiditate diffundunt.
siccaturq; in pila, ut dictum
est conterunt. aliqui pro dul-
ci aqua marina perfunden-
tes, ita eluunt.

Alij in nouissima lotio-
ne mulsam aquam resper-
gunt, hæc Dioscorides lib. 4.
cap. 149.

Lathyrus siue cataputiz
maioris succus, cum vinde-
mia incipit, ex ramulis dis-
sectis, & vase conclusis ex-
primitur, expressus in pastil-
los digeritur, cum farina e-
rui, hi pastilli magnitudinem
erui implent, alij in aridas
ficos ternas, quaternasq; gut-
tas instillant, ut cum his in-
arescant, quas ad vsus re-
condunt.

Morus nigra Celsi, arbor
nota est, ex fructibus illius
hodie parant succum, qui si
in areo vase decoquitur, atq;
insolatus adstringentior red-
ditur. Ex folijs succus ex-
primitur, contra phalangio-
rum morsus.

Malo

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA. SEPTEMBRI, FORMA. SEPTEMBRI,

Malorum vel pomorum, succus fit eodem modo, ut Rob de Ribes, aut rob berberorum, cor & stomachum roborant, syncopemq; sanant, prout ex præstantioribus pomis, exprimitur, ut sunt Aurantiarum, citrinorum & simulum.

Mandragoræ succus fit è cortice recentis radiceis tussio, & prælis subiecto: qui insolatus ubi concreuerit fictili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquando ignauior.

Nucum succus, Græcis *Aluanaçvç* dicitur, finita æstate ex corticibus recentibus exprimitur, coquitur vno feruore cum melle usq; ad mellis compagem, contra tenuium humorum, defluxionem à capite.

Omphacium succus est, officinis rob de agresta. ex uuis immaturis, hoc mense plerumq; in Germania exprimitur, lentoq; igne ad tertiarum partis consumptionem coquitur, coletur deinde & subsidere permittatur, donec clarescat, clarum deinde igne

Eligendum est Omphacinum, flauum, friabile, vehementer adstringens & linguam mordens.

clementi in vase vitreo percoquitur, aut insolatur ad iustam crassitiem, qua seruari possit. Dioscorides lib. 5. cap. 4. ante Canis ortum, media æstate è Thasia vite, aut Amynea succum ex uuis nondum maturefcentibus colligit, expressam melligenam in rubro are linteo cooperto insolare solet, vsque dum cogatur, semperq; quod ceruici vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscuit, noctuq; à subdialibus locis, in lectum referre, quandoquidem nocturni rores concrefcere non sinunt.

Tithymalorum succus, colligitur incipiente pomorum illorum lanugine, quod fit autumno, appetente vindemiarum tempore. Congestis ramulis mox dissectis, & vase conclusis excipitur: aliqui adijciunt farinam erui & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant, alij in aridas ficos ternas, quaternasq; guttas instillant, ut cum his in arefcant, quas ad vsus recondunt, per se etiam tusus in pila & in pastillos coactus reponitur, porro

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,

FORMA.

SEPTEMBRI,

porro cum extrahitur lac,
neque quo ventus aspiret,
stare quenquam, neque ma-
nus oculis admovere conue-
nit, sed antequam colligas,
corpus, præsertim faciem,
collum scrotum quæ genita-
lis, adipe aut oleo cum vino
perungere. Hæc Dioscorides
lib. 4. cap. 159.

81
QVOTEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

OCTOBRI.

RFOMA.

OCTOBRI.

GRanatorum succus, ex fructibus qui coriaceo leguntur cortice, exterius ruiescente, interius flavescente, exprimitur hoc modo. Acini diligenter à corijs & membranjs purgati, prælo committuntur, ac exprimuntur. mox vinum saccis ad id accommodatis percolatur, & in vasculis reponitur, affuso desuper oleo, ne corrumpatur vel acescat.

Prunorum sylvestrium succus, quo officinæ hodie pro Acacia vti, haud infelicitè solent, exprimitur ex baccis immaturis, vna cum ipsorum pulpæ portionibus, ex qua deinde placentulæ formantur, quæ liccatæ, pro acacia venduntur. quidam in vase aqua pauca, aliquot diebus macerant baccas, tessellatim cōsectas, postea lento igne coquunt, colant, ac recoquunt, donec is succus crassescat, quem deinde servant.

Vini succus olim non prius quàm coctis & benè maturis vuis exprimebatur, sed hodie rapi ex immaturis vuis cernimus, quod nimium homines vexat auari-

tia. Triplex porro succus fuit ab uuis. primus est liquidus & aquosus. Secundus dulcis & calidus, ex musto austero, & dulcis vim mediam obtinet, qui habet vim mittigandi. Tertius à græcis *Διαγλυκκός* appellatur, austerus est, ideoq; vim habet reprimendi. Calcari multa, cum Luna est sub terra, optimum est.

Y

OCTO

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA

OCTOBRI.

FORMA

NOVEMBRI.

Sit odoratum, mollius expressus sapore acerbū.

Omphacinum oleum. ex olivarum cuiusque generis baccis immaturis exprimitur, ob id omnes tribus, id est acerbum viride, & crudum appellatur.

82

FORMA.

HA VV 111

1. *Deus* 2. *Deus* 3. *Deus* 4. *Deus* 5. *Deus* 6. *Deus* 7. *Deus* 8. *Deus* 9. *Deus* 10. *Deus* 11. *Deus* 12. *Deus* 13. *Deus* 14. *Deus* 15. *Deus* 16. *Deus* 17. *Deus* 18. *Deus* 19. *Deus* 20. *Deus* 21. *Deus* 22. *Deus* 23. *Deus* 24. *Deus* 25. *Deus* 26. *Deus* 27. *Deus* 28. *Deus* 29. *Deus* 30. *Deus* 31. *Deus* 32. *Deus* 33. *Deus* 34. *Deus* 35. *Deus* 36. *Deus* 37. *Deus* 38. *Deus* 39. *Deus* 40. *Deus* 41. *Deus* 42. *Deus* 43. *Deus* 44. *Deus* 45. *Deus* 46. *Deus* 47. *Deus* 48. *Deus* 49. *Deus* 50. *Deus* 51. *Deus* 52. *Deus* 53. *Deus* 54. *Deus* 55. *Deus* 56. *Deus* 57. *Deus* 58. *Deus* 59. *Deus* 60. *Deus* 61. *Deus* 62. *Deus* 63. *Deus* 64. *Deus* 65. *Deus* 66. *Deus* 67. *Deus* 68. *Deus* 69. *Deus* 70. *Deus* 71. *Deus* 72. *Deus* 73. *Deus* 74. *Deus* 75. *Deus* 76. *Deus* 77. *Deus* 78. *Deus* 79. *Deus* 80. *Deus* 81. *Deus* 82. *Deus* 83. *Deus* 84. *Deus* 85. *Deus* 86. *Deus* 87. *Deus* 88. *Deus* 89. *Deus* 90. *Deus* 91. *Deus* 92. *Deus* 93. *Deus* 94. *Deus* 95. *Deus* 96. *Deus* 97. *Deus* 98. *Deus* 99. *Deus* 100. *Deus*

Y 2 IANV

Cochleæ, terrestres præsertim pomatiæ, stomacho utiles sunt, & non facile corrumpuntur. Pomatiæ, id est, operculares cochleæ, plurimæ reperiuntur in nostris montibus, iuxta Halam Sueuorû, vicinisq; alijs locis. Eruuntur autem è terra hyeme in sepibus & frutetis, vncis quibusdam ferreis, propè fruticum radices terra circumfossa, concluduntur hæ contra frigoris iniuriam, quodam albo operimento duro gypsi speciem referente, sicq; contextæ terra se condunt. pro cochleæ ad varia corporis incommoda.

FEBRVARIO.

Y 3

MAR 2

MARTIO,

APRILI.

VIpera serpentium genus à recentioribus Tyrus, Græcis *ἐχιδνα* appellatur, Dipsas etiam, hoc est, faciens sitim. Eligendæ sunt ex Galeno in libro de Theri: ad pisonem cap. 13. potissimum circa veris initia. at. 2. de Antid. cap. 18. ut 1. de Antid. 8. vere quidem finiente, uti 1. simpl. med: ubi subdit, à ratione alienum illis adimere caudam, fulvæ parumper, & ad motum valdè pronæ, quæ collum præcipuè attollunt, & oculos aliquantulum rubros habent, & quæ audacter, ac torue conspiciunt, quæq; capite lato, ventre pro penso, ac toto corpore sinuosa, meatum excrementis destinatum magis ad extremam caudam declivè gerūt, quam non convolutam, sed modice flexam potius esse convenit, gressu denique incedat quieto, hac ratione mas à femina discrepare debet.

APRIL.

Senecta anguinium, græcè
 ῥῆσας οφῖς, nullis non co-
 gnita, Germ: vocant Schlang-
 en balck / hæc in campestri-
 bus inter saxa & stirpes in-
 ueniatur. de qua Aristoteles
 scribit lib. 8. de historia ani-
 malium cap. 17. Serpentes
 senectam exuunt, tum vere
 cum egrediuntur, tum etiam
 autumno. Vipera etiam ex-
 uit tam vere quàm autum-
 no. Cum serpens exuere in-
 cipit, ab oculis primùm de-
 trahi aiunt, ita ut obsecari
 videatur ijs, qui rem non in-
 telligunt. colligitur senecta
 anguinium Martio, vel circa
 principium Aprilis.

[The page contains faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side.]

CAntharides probantur in frumento inuentæ, versicolores, & quæ luteas in alis transuersas, habent lineas corpore longo, crasso, præpingues. Sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris. Capiantur vere, & phiala feruentur, necentur autem ut Diosc. lib. 2. cap. 25. præcipit nempe super phialam rarum linteolum expansum, obligato ore & deorsum conuerso, suspenduntur super aceti feruentis quam acerrimi halitum, donec astu exanimentur, postea lino transfixæ reponuntur.

Oesypus, id est, succidarum lanarum pinguitudo, ex ouibus integris non scabiosis paratur. Hyslopus humida ineptè vulgo dicitur. paratur autem hoc modo: Succidæ lanæ molles è collo foeminarum, radícula non curatæ calida, aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis aqua infunditur, magnoq; impetu ligula, vti respumet agitur, aut lignea rude validiuscule conturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergi-

tur, & confidente pingui, quod super natabat, collectoq; in altero fictili vase, denovo aqua in labellum fusa agitur, spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur, hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguedine nihil prorsus spumæ extet. Collectum æsipum manibus emollitur, & si qua insedit spurcicia confestim demitur: exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus miscetur, donec admotum linguae æsypum adstringat leniter, nec mordeat, atq; pingue candidumq; spectetur: um in fictili vase conditur, verum omnia feruido sole fiant. Hæc Diosc. lib. 2. cap. 67.

IVNIO.

Z IVLIO

IULIO, SOL

in Leone.

Cancros fluuiales rabi-
entium, gratia venari
solebat Aëschion em-
piricus, quando Sol in Leo-
nem transisset, non nisi Lu-
na decima octaua à quo qui-
dem instituto Calenus libro
11. simpl. med: non videtur
abesse. vrebatur enim eos Aë-
schion in patella aris rubri
donec in cinerem redigeren-
tur, ut facile in leuorem re-
digi possent.

Fel latinis, *χολα* græcis,
Gall Germanis dicitur, suc-
cus est animalis calidissimus
qui cum æstate media cali-
dior et acrior fit, rectè hoc tẽ-
pore colligitur, præsertim ab
animali defatigato & vexa-
to, minimè autem quod in
pace & otio degerit.

Vnguis siue Onyx, con-
chylij tegumentum est, ei si-
mile, quo purpura integitur,
quod in India nardiferis pa-
ludibus inuenitur. Colligi-
tur æstate, tunc quando stan-
gnantes aquæ æstiuis squa-
loribus inaruerunt. Lauda-
tissimus qui à mari rubro
defertur, candicans, pinguis.

AVGVSTO.

AVGVSTO.

Sanguis hirci quadrimi,
bene habiti, aliquandiu
nutriti vino albo, & her-
bis calculum frangentibus,
ut fœniculo sēseli lauro, Au-
gusto mēse iugulari debet,
hoc modo. Cum vva matu-
rescere inceperit, olla recen-
ti aquam inijcito, eamq; de-
coquito, ut quod terrestre est
abijciat: ac hirco iugulato,
sauginis eius medium olla
excipito, ita ut neq; eum qui
primus effluxit neq; postre-
mum accipiat, ac vbi coale-
scere permiseris, minutim in
olla solum incidito, reticu-
lo autem tenui, aut raro lin-
teo contextum sub dio expo-
nito, ut à sole & luna illumi-
netur, ac siccescat, cura da-
hibita ne madesiat, leuiga-
tum diligenter in pyxide ad-
servato: Hæc Alexand: Trall.
lib 9. cap. 4.

SEPTEMBRI,

Medula, ut Adeps sumatur à fine æstatis ad hyemis initium; ex-florente animali, & reponatur loco sicco, & edito & septentrionem spectantè: reponatur cum folijs laurij ficcis ne putrescat, aut situm durcat. Recens etiam tenerorum animalium vsurpatur. Dioscor. lib. 2. cap. 70.

Cerebella passerum, autumno & vere captorum reponuntur, cum vitello oui, melle, vel sole, aut cinere siccata.

Vulpes animal vāfrum, nulli cedens sagacitate & astu, capitur & probatur autumno cum eo tempore vuarum esu pinguescat, eius pulmonem recentem eximunt, extracta arteria magna, diligenter mundant, postea reliqua eius arterias ac venas secant, lauant sexties hora interposita, vino albo odoro tepido, lotum pulmonem vrnæ imponunt, siccant furno temperate calente, siccatum loco sicco reponunt, prius absinthio, & nardi spica inuolutum ad diuturniorem tutelam. Sunt qui

SEPTEMBRI,

aqua ardente lauent, post saccharo aspersum siccant.

Echinus terrestris, Germanis Zgel aut Bechel dicitur, nocturno tempore à venatoribus plerumq; capiuntur, per ætatem & autumnum, vbi vvas, siue vineas petunt.

SEPTEMBRI,

OCTOBRI.

L Ac vacca, Capra, Asinus, iuuenis, aliquandiu post partum exercita, & bene pascit praesertim idoneis sibi pascuis. Vnum largius, sed humidius. Autumnale parcius, siccus, & butyro seruando aptius.

Adeps ex animali florente autumno lectus, reponitur vel incuratus, lotus, siccatus in umbra, vel exemptis pelliculis fusus sole vel igni in vase duplici. Alij tosto in veru animali cadentem excipiunt.

QVO TEMPORE ANIMALIA ET EORVM

OCTOBRI.

NOVEMBRI.

In animalibus cadentem ex-
 vale duplici Aljto in ve-
 licalis fuit tole velignu
 in vmbra, vel exenit pel-
 vel incantat fozat, incantat
 teatunqz locat, reponit
 Aljto ex anit, fozat
 cernit, dicitur
 parit, incit, et puzo
 led humit, Autunato
 lli pelat, Venit, fozat,
 ne parit, parit, idonei
 parit, exic, et pel
 inuenit, Aljto in parit
 Aljto ex, Aljto Aljto

DECEMBRI.

A Prina caro, hyeme magis conuenit, vsui tum presenti, tum futuro.


Medulla optima semper ceruina, ad indurata & scirrhosa corpora emollienda, mox vitulina, post hanc taurina, dein caprina & ouilla. Diosc. lib. 2. cap. 70. colligit æstatis exitu, cum appetit autumnus: quippe alijs anni temporibus concrementum sanguinis & veluti caro friabilis in ossibus inuenitur: nec facile cognosci potest, nisi quis eam ossibus extrahat & recondat. Galenus libro 1. 1. simpl. med. facul. hyeme primum capit veluti ad adipem, deinde in ædibus siccis, atque æditis, planè humori exsertibus cum folijs lauri siccis reponit.

FINIS.

2 1-6-467

A Pius caro hyemera
his conuenit ym
pudenti tunc furore
Methila opima loquax
ceruina, ad iudicis & ior
thola corpora emollientia
m ex vultu, post hanc ran
ma deim capina & oulla
Dio. lib. 2. cap. 70. colligit
fatis enim cum agerant
munt, quippe ante ahu
e nocturno conuenientia
languinis & velut caro ma
pilis in obsequio iumentum
nec fatis cognosce potest, in
quis eam olibus extraxit
recondit. Galeni lib. 1. 1.
lib. 1. meth. facit hyeme
m caput velut ad adigem
deinde in vultu fectis, ad
edulis, plane humori ex
vultu cum fatis, tunc hoc
cis repone

11713



005644066

16